

HISTOIRE  
DE  
L'ACADÉMIE ROYALE  
DES  
SCIENCES  
ET  
BELLES-LETTRES.

ANNEE MDCCLXV




A-BERLIN.

CHEZ HAUDE ET SPENER,

Libraires de la Cour et de l'Académie Royale.

MDCCLXVII.

Inprimé  
*par ordre de l'Académie.*



# T A B L E.

## C L A S S E

### DE PHILOSOPHIE EXPERIMENTALE.

|                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>C</b> onsidérations <i>sur le Globe.</i> Troisième Mémoire. <i>Sur le Continent Antarctique,</i> par M. le Comte DE REDERN.                                                                                                        | pag. 3 |
| — — Quatrième Mémoire. <i>Sur les Isles de Salomon.</i>                                                                                                                                                                               | 14     |
| — — Cinquième Mémoire. <i>Sur le Continent Austral ou Méridional.</i>                                                                                                                                                                 | 17     |
| Sur les <i>préservatifs les plus efficaces contre la petite vérole,</i> par M. COTHÉNIUS.                                                                                                                                             | 25     |
| Nouvelles Expériences physiques <i>sur l'accroissement &amp; la diminution du mouvement extérieur par lequel les plantes s'écartent de leur direction perpendiculaire, suivant la diverse température de l'air,</i> par M. GLÉDITSCH. | 52     |
| Observations anatomiques <i>sur la glande pinéale, sur la cloison transparente, &amp; sur l'origine du nerf de la septième paire,</i> par M. MECKEL.                                                                                  | 91     |
| Mémoire <i>sur la résistance des fluides avec la solution du problème balistique,</i> par M. LAMBERT.                                                                                                                                 | 102    |

## C L A S S E DE MATHÉMATIQUE.

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sur la probabilité des séquences dans la Lotterie de Genes, par<br>M. EULER.                                                 | 191 |
| Sur les suites ou séquences dans la Lotterie de Genes, par<br>M. BEGUELIN. Premier Mémoire.                                  | 231 |
| — — Second Mémoire.                                                                                                          | 257 |
| Mémoire sur les vibrations des cordes d'une épaisseur inégale,<br>par M. DANIEL BERNOULLI.                                   | 281 |
| Sur le mouvement d'une corde qui au commencement n'a été ébran-<br>lée que dans une partie, par M. EULER.                    | 307 |
| Eclaircissémens plus détaillés sur la génération & la propagation<br>du son & sur la formation de l'Echo, par M. EULER.      | 335 |
| Sur les Courbes Tautochrones, par M. DE LA GRANGE.                                                                           | 364 |
| Sur les Tautochrones, par M. D'ALEMBERT.                                                                                     | 381 |
| Recherches des forces dont les corps célestes sont sollicités en-<br>tant qu'ils ne sont pas sphériques, par M. J. A. EULER. | 414 |

## C L A S S E DE PHILOSOPHIE SPÉCULATIVE.

Discours sur ces Questions:

*Quel est le degré de certitude dont sont susceptibles  
les preuves tirées de la considération de cet Univers pour  
démontrer l'existence d'une Divinité?*

*Et quelle est la meilleure manière de faire usage de  
ces Argumens a posteriori, pour établir cette importan-  
te vérité?*

Par M. FORMEY.

435  
Discours



|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Discours <i>sur la Métaphysique</i> , par M. MERIAN.                  | 450 |
| De <i>l'énergie dans les ouvrages des Beaux-Arts</i> , par M. SULZER. | 475 |

## C L A S S E D E B E L L E S - L E T T R E S.

|                                                                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Des <i>inductions qu'on peut tirer du langage d'une Nation par rapport à sa culture &amp; à ses mœurs</i> , par M. TOUSSAINT.          | 495 |
| Discours de réception par M. LAMBERT.                                                                                                  | 506 |
| Discours de réception, où l'on traite des principaux avantages que les Académies offrent à ceux qui en sont Membres, par M. THIEBAULT. | 515 |
| Eloge de M. DE PRÉMONTVAL.                                                                                                             | 526 |
| Eloge de M. le Baron DE DANCKELMANN.                                                                                                   | 541 |



# ERRATA.

page 138. lin. 15. au lieu de *chacune* lisez *l'une de l'autre*.

p. 169. lin. 10. après *termes intégrables* ajoutez *moins compliqués que ceux que nous venons de trouver pour x.*

p. 179. lin. 14. au lieu de  $+\frac{27\delta\epsilon}{\gamma\gamma} \dots -\frac{90\mu\delta}{\gamma\gamma} \dots$  lisez  
 $-\frac{27\delta\epsilon}{\gamma\gamma} -\frac{60\mu\delta}{\gamma\gamma} \dots$

ibid. lin. 17. au lieu de  $\frac{81\delta^4}{\gamma^4}$  lisez  $\frac{81\delta^4}{2\gamma^4}$ .

p. 180. lin. 4. au lieu de  $+\frac{6\gamma\delta^2\delta}{a^3a}$  lisez  $-\frac{6\gamma\delta^2\delta}{a^3a}$ .

p. 182. lin. penult. au lieu de  $\frac{2.\sin\omega m^2\xi^4}{2.3.4.5}$  lisez  $\frac{4.\sin\omega m^2\xi^5}{2.3.4.5}$ .

p. 183. lin. 9. lin. 15. & pag. 185. lin. 23. même correction à faire.

p. 184. lin. 8. au lieu de  $\frac{1}{35}m\sin\omega.\xi^2$  lisez  $\frac{1}{15}m\sin\omega.\xi^2$ .

p. 188. lin. 9. au lieu de  $\frac{m\sin\omega.\xi^4}{96}$  lisez  $\frac{5m\sin\omega.\xi^4}{96}$ .

p. 455. lin. 8. au lieu de *de Physique* lisez *de la Physique*.

p. 456. lin. dern. au lieu de *n'opere pas par des projections* lisez *n'opere que par des projections*.

p. 465. lin. 14. au lieu de *conjectures* lisez *conjonctures*.

p. 466. lin. 22. au lieu de *vues, compasse* lisez *vues, & compasse*.

p. 467. lin. 7. au lieu de *paroissent* lisez *paroissoient*.

p. 470. lin. 13. au lieu de *elle-même* lisez *en elle même*.


p. 473. lin. 13. après *tous ces* lisez *spéculateurs aimables & de tous ces*.


M É M O I R E S  
D E  
L'ACADÉMIE ROYALE  
D E S  
S C I E N C E S  
E T  
B E L L E S - L E T T R E S.

---

*C L A S S E D E P H I L O S O P H I E  
E X P É R I M E N T A L E.*

\* \* \*





CONSIDÉRATIONS  
 SUR  
 LE GLOBE \*)  
 TROISIEME MÉMOIRE  
 SUR  
 LE CONTINENT ANTARCTIQUE  
 PAR M. LE COMTE DE REDERN.

---



Quand *Colomb* proposa à sa Patrie & aux Princes les plus puissants de l'Europe d'étendre leurs Empires dans des nouveaux Mondes, il fut renvoyé avec dédain; la proposition fondée sur des Conjectures & des probabilités géographiques, & physiques, au dessus de la portée du commun des hommes, occupés de

A. 2

tom-

\*) Lues dans les séances de l'Académie de 1758.

toutes les petites misères de la vie, dans les grandes places du gouvernement qu'ils remplissent, fut traitée de chimere.

S'il revenoit aujourd'hui renouveler la proposition, appuyée sur des faits incontestables qui donnent une entière certitude; il auroit peut-être le même sort à la honte du siècle éclairé dans lequel nous vivons.

J'exposerai dans ce Mémoire les témoignages des Navigateurs que j'ai cités dans deux Mémoires précédents, insérés dans ceux de l'Académie; je tâcherai de suivre, de comparer, & de combiner avec attention toutes leurs découvertes, & leurs observations; & j'y joindrai quelques navigations nouvelles qui n'ont pas été imprimées, & que j'ai eu le bonheur de rassembler.

L'étendue du premier continent, dont je hazarde de fixer la position, & marquer le gissement des côtes par les différentes parties qui en ont été apperçues, paroît être d'une étendue très considérable; & comme il est isolé, & séparé par des vastes mers de tous les autres continents, s'étendant dans des climats très variés depuis les Tropiques jusqu'aux Poles, on doit s'attendre à y trouver des singularités qu'on ne peut pas prévoir, & des productions peut-être très différentes de tout ce que nous connoissons.

J'en ferai le tour de l'Est à l'Ouest en commençant par ses côtes dans l'Océan entre l'Amérique & l'Afrique.

Elles paroissent retirées dans ces mers à une latitude très élevée, à peu de distance ou peut-être même au delà du Pole, & toutes les terres qu'on a apperçues jusqu'à présent à l'Est de la Terre des Etats, ne sont selon toutes les apparences que des Isles qui le bordent. Elles sont la preuve de son existence, mais la conséquence qu'on a voulu tirer du peu d'éloignement des côtes de ce continent, dans ces parages, ne me paroît pas fondée de même. Améric Vespnce pénétra le premier dans ces mers en 1502; il découvrit à 52 degrés de latit. le premier Avril, qui répond à la saison de notre Octobre, une terre qu'il courut l'espace de 20 lieues sans appercevoir d'habitans; les Géographes la placent sous la longitude du premier méridien; je croi-

croirois ne pas me tromper en lui attribuant la vue ou la découverte des Isles Malouines; toutes les circonstances de sa navigation, son abord aux côtes de l'Amérique sous la latitude environ de la rivière de la Plata qui fut le lieu de sa partance, pour se porter au-sud, les vents de sud-ouest qui regnent dans ces parages, avec lesquels il navigea, le froid extrême qu'il éprouva sans qu'il fasse mention de glaces, fondent cette conjecture. Le célèbre Halley poussa de même sa navigation jusqu'au 52 degré de latitude entre les 340 & 350 degrés de longitude; il y trouva des glaces, sans appercevoir des terres.

D'autres navigateurs, la Roche & Brauer, qui traversèrent ces mers pour passer dans la Mer du Sud, ont apperçu des terres, mais peu curieux de les connoître, leurs relations n'en parlent que de la manière la plus vague. C'est à la France à qui les sciences ont tant d'obligation, que nous devons la connoissance la plus exacte que nous ayons jusqu'à présent de ces mers.

Les recherches que la Compagnie des Indes a fait faire dans ces mers en 1738, nous donnent une entière certitude de l'existence de terres fort étendues dans ces parages. Les Capitaines Lozier & Hay qui les cotoierent de l'ouest à l'est entre les 50, & les 54 degrés de latitude, par une longitude de plus de 20 degrés, ou de 3 à 400 lieues, virent des marques continuelles du voisinage des terres, & furent à la vue du Cap de la Circoncision, pendant plusieurs jours sans pouvoir y attérer. Les brumes & les glaces les en empêchèrent; ils vinrent deux mois trop tôt.

Le vaisseau le Lyon revenant en 1756. de la Mer du Sud découvrit à la hauteur de 55 degrés 17 min. de lat. à 19 degrés à l'Est de la Terre des Etats, des terres très étendues & fort élevées, & les apperçut à environ 30 lieues de distance, & deux montagnes qui devoient être d'une élévation considérable à 60 lieues; il les rangea en faisant route à l'Est de ces terres. Cette navigation ne laisse pas de douter que toutes les terres apperçues à l'est de la Terre des Etats jusqu'au Cap de la Circoncision, & peut-être d'autres plus à l'Est, ne  
soient

soient des Isles situées à peu près sous le même parallèle qui bordent le continent, retiré comme j'ai déjà dit peut être au delà du Pole.

Vis à vis de la Terre des Etats & du Cap Horn, ce continent se retire de même extrêmement vers le Pole. Il n'a été aperçu par des glaces & d'autres marques que par des navigateurs qui, en doublant la Terre du feu, ont poussé leur navigation au delà de 60 degrés, en avançant déjà à l'ouest dans la Mer du Sud; sous le méridien du Cap Horn, la mer paroît plutôt ouverte à cette hauteur. Le fameux Drack le découvrit, & y atterra à une latitude fort élevée. Une tempête le jeta dans une baie presque sous le cercle polaire, à 10 degrés environ à l'ouest du Cap Horn; où, selon toutes les apparences, ses côtes prennent déjà une direction du sud au nord-ouest du Pole vers le Tropicque.

Il paroît remonter de là dans la Mer du Sud à la distance de 4 à 500 lieues de l'Amérique, sous les 280 degrés ou environ de longit. en faisant face à la côte occidentale des Paragons & du Chili, & à la hauteur de quelques 30 degrés de lat. il paroît se replier vers l'ouest, en remontant vers l'équateur, peut-être au delà du Tropicque.

Gallego, en retournant en 1567. des Isles de Salomon par le sud-ouest au Chili, rangea une suite de terres depuis le Tropicque jusqu'à la hauteur de la pointe méridionale de l'Amérique, faisant face au Chili.

Plusieurs vaisseaux Malouins, qui firent le commerce de la Mer du Sud pendant la guerre de succession, poussés à l'ouest du Chili à 4 ou 500 lieues, virent à des différentes hauteurs des marques de terres voisines; mais le marchand poursuivit son commerce sans se mettre en peine de faire des découvertes.

L'année 1714, un Brigantin Espagnol fut jeté sur des Terres à cette distance du Chili sous le 37 degré de lat. Il les jugea par beaucoup de feu qu'il vit la nuit, fort habitées, la foiblesse de son équipage l'empêcha d'y aborder.

David's



Dauids, un Flibustier Anglois, voulant repasser en 1689 du Pérou par le Cap Horn, vit des terres fort hautes & fort étendues, sous les 27 degrés de lat. à cette même distance du Chili. Il paroit par les routes de Magellan & des trois vaisseaux envoyés en 1721 par la Compagnie des Indes occidentales de Hollande, que c'est une Isle.

Les trois vaisseaux envoyés en 1721 par la Compagnie des Indes occidentales de Hollande, virent depuis les 260 degrés de longitude jusqu'à leur arrivée à l'Isle de Pâques sous les 28 degrés de latit. & les 239 degrés de longit. des marques continuelles de terres prochaines au sud. Ils remonterent de là vers l'équateur, & les perdirent.

Zviros après avoir traversé la Mer du Sud avec Mendagna en 1595 pour la recherche des Isles de Salomon, voulut reconnoître cette mer par une route différente. Il partit en 1605 le 21 Decembre de Callao, & dirigea sa route sud-ouest. Après 36 jours de navigation il découvrit une Isle sous les 25 degrés de lat. & les 250 de longit. Il continua sa navigation nord-ouest jusqu'aux 230 degrés de longit. & fit de belles découvertes. Il s'arreta dans une Isle nommée Trumaco 10 jours; le roi de l'Isle nommé Tamai, homme de belle figure, & intelligent, le reçut avec beaucoup d'amitié, & lui fit comprendre, qu'il connoissoit plus de 60 Isles, & un grand continent, qu'il nomma Manicalo à quelque distance de son Isle. Zviros vérifia & visita plusieurs de ces Isles, qu'il nomme l'Incarnation, St. Jean Baptiste, St. Guillaume, les 4 Couronnes, St. Michel, la Conversion de St. Paul, la Dixieme, le Chasseur, la Fugitive, Notre Dame de Secours, Monterey, St. Marc, la Verge, les larmes de St. Pierre, Porto belo, Pilate, Saragossa, Remond, les Isles de St. Marie. Le lendemain de son départ, il vit le pais de Manicolo dont le gissement étoit sud-est & nord-ouest. C'est peut-être l'extrémité septentrionale de ce Continent. Il en courut les côtes par une étendue de 60 lieues, & apperçut plusieurs ports & rivières. Il paroissoit très peuplé, & les habitans de l'Isle de Taumaco lui avoient exalté sa fertilité, ses richesses,



ses, & particulièrement la grande abondance des Perles qu'on y trouvoit. Il emmena quatre Indiens de l'Isle, dont trois lui échapperent; le quatrième qui lui resta se disoit né dans une Isle nommée Chicagnara, à quatre journées de Taumaco, peuplée d'habitans noirs & blancs, fertile, & fort abondante en perles, qu'on trouvoit en trois sortes de Moules, nommées Totoses, Canoses, & Taquila. Il ajouta qu'à deux journées de son Isle il y avoit une autre Isle appelée Gvairapo, dont les habitans étoient blancs comme les Espagnols, & les femmes fort belles, portant un babir de soye, descendant de la tête aux pieds. Il en nomma d'autres, Tonefono, Tucopio, Pilen, Poupan &c. peu éloignées de son Isle, & fort abondantes en perles dont les Moules étoient à si peu de profondeur qu'on les prenoit de la main. Il raconta beaucoup d'un grand païs qu'il nomma Puro, qu'il n'avoit pas vû; mais dont plusieurs de ses compatriotes habiles navigateurs qui y avoient été, lui avoient parlé, que les habitans, en étoient très belliqueux & qu'il avoit vû de leurs flèches, dont les pointes étoient d'argent.

Cet Indien mourut au Mexique à l'âge de 25 ans. Zviros s'approcha ensuite de l'Equateur, & continua sa route à l'ouest entre les 10 & 12 degrés. Après 90 jours de navigation, il arriva sans avoir rencontré aucune Isle à la terre du St. Esprit, côte orientale, & partie du second continent, dont j'ai rapporté la relation avantageuse, & circonstanciée qu'il nous en donne, dans le second Mémoire des Considérations sur le Globe.

Abel Tasman, après avoir fait le tour du second continent, y aborda par l'est à sa partie occidentale, qu'il appella la nouvelle Zéelande. Cette côte court du nord au sud sous les 180 degrés de longit. & il paroît qu'elle se retire vers le Pole Antarctique, pour courir entre les 50 & 60 degrés de latit. de l'est à l'ouest vis à vis du Cap Diemen, du Cap de Bonne Espérance, vers le Cap de la Circoncision, dans la direction peut-être des côtes par lesquelles nous avons commencé dans l'Océan entre l'Amérique & l'Afrique.

Il la cotoïa par une étendue de 450 lieues depuis les 42 jusqu'aux 32 degrés de latit. C'est une terre élevée & montueuse, mais fertile & bien située. Les habitans ressemblent aux Japonnois, sont de haute taille, farouches, & ont le milieu du corps couvert de toïle de cotton, ce qui suppose quelque industrie. Il quitta cette côte sans y aborder, & sans pénétrer dans le païs, pour aller à la découverte des Isles de Salomon, qu'il manqua.

Voici ce que j'ai pû trouver touchant le premier continent. Ce n'est pas pour prendre une idée parfaite de sa qualité, de ses productions, de ses habitans, & de leurs mœurs; mais c'est suffisant pour fixer & assurer les vues qu'on peut se proposer dans sa découverte.

Cette vaste Mer du Sud, qui occupe presque la moitié de notre Globe, n'est encore gueres connue.

Les Espagnols en possession de toutes les côtes de l'Amérique dans cette mer, n'ont que trop de païs, dans lesquels ils ont de la peine à se maintenir contre les habitans, & malgré la jalousie des autres nations de l'Europe; trop indolens sous les successeurs de Philippe se cond pour faire de nouvelles découvertes, & trop foibles pour faire de nouveaux établissemens, ils n'ont eu d'autres soins que d'éloigner les Puissances de l'Europe par des Traités de la navigation de cette Mer. Les Navigateurs des autres nations de l'Europe, qui y sont allés jusqu'à présent n'y ont été que pour piller, ou pour faire le commerce lucratif du Chili & du Perou: & la navigation se dirige aussitôt qu'on a doublé le Cap Horn au Nord, pour courir le long des côtes de l'Amérique. Ceux qui y sont allés dans le dessein de faire des découvertes, ont dirigé leur route à peu près de même, & ont traversé cette vaste mer entre l'Equateur & le Tropique pour profiter des vents alisés, & pour reconnoître cette partie de la mer, dans laquelle on savoit que Mendagna, Gallego & Zviros avoient fait des découvertes, que l'appas de richesses rendit intéressantes; mais dont la connoissance trop vague, & trop imparfaite, par les soins avec lesquels les Espagnols



nois en cachoient les relations, & les routiers; le peu de progrès qu'avoient fait le Géographie; mais principalement la cabale, & la jalousie empêcherent de profiter.

Ce continent paroît tenir par la continuité & l'enchaînement des montagnes élevées sur la surface de la terre & continuer dans le bassin de la mer, aux continents de l'Amérique, de l'Afrique, & à celui que je nomme le continent méridional, en attendant la destinée glorieuse de la Puissance de l'Europe qui lui imposera le sien, par trois points de liaison, premierement aux Cordelières de l'Amérique, par la terre, ou au Port de Drack.

Les Andes, après avoir prolongé la continuité de leur chaîne gigantesque, qui descend du Pole Arctique au Cap Horn, dans le bassin de la mer Antarctique, reparoissent selon toutes les apparences ici, en continuant, par une chaîne de montagnes, dont la direction est à peu près celle de la côte du continent Antarctique dans l'Océan pacifique en ne s'éloignant pas extrêmement de la mer comme les Cordelières. La relation de Quiros, qui fait mention des richesses & de l'abondance de l'argent de ces côtes, sur le témoignage des habitants des Isles auxquelles il abordoit, qui lui donnoient connoissance du voisinage de la terre ferme de ce continent, fortifie cette conjecture.

Cette chaîne de montagnes, en continuant son cours jusqu'à la nouvelle Zélande, lie, par un second point de réunion, le continent Antarctique au Cap de Diemen, pointe la plus méridionale du continent méridional découverte par Tasman en 1642 sous le 45 degré de latit. sud.

Le troisième point de réunion avec l'Afrique par le Cap de Bonne Espérance, n'a pas le même degré de probabilité, par le gissement peu certain des côtes à déterminer dans la Mer Atlantique & dans celles des Indes. Il paroît que cette chaîne, si elle existe, en commençant au Port de Drack, formeroit un arc reconrbé, peut-être au delà du Pole, qui remonteroit en demi-cercle au nord, vers le Cap de la Circoncision.

J'ai



J'ai fait remarquer l'obligation dont nous sommes redevables à la France par les navigations de Mrs. Bouvet & Hay. Les Géographes françois paroissent lui attribuer la gloire de la premiere découverte de ce continent, par la navigation de Gonneville faite en 1503.

Le vaisseau dont il fut le commandant, équipé par des marchands à Honfleur, pour les Indes orientales, essuya, après avoir doublé le Cap de Bonne-Espérance une tempête, qui lui fit perdre la route & aborder dans une terre qu'on a prétendu faire partie de ce continent, & qu'on qualifie, dans l'extrait de la déclaration qu'il fit à son retour & rendu public en 1663, du nom des Indes méridionales. On a placé d'abord cette terre entre l'Afrique & l'Amérique vers le 42 degré de lat. & ensuite au sud-est du Cap de Bonne-Espérance sous le nom de Gonneville & des Peroquets, parce que la relation dir que ces Oiseaux abondoient dans la terre où il avoit abordé.

La supposition imaginaire d'une terre qui mérite ce nom, par son étendue entre l'Amérique & l'Afrique à 42 degrés de latitude, est un fait avéré par tous les navigateurs, qui ont traversé ces mers, & tout récemment par Mrs. Bouvet & Hay; il est également certain, que les terres de l'existence desquelles on s'est assuré, sont situées entre les 50 & 60 degrés de hauteur. Les climats les plus rigoureux de ces terres, dont les glaces & les frimats s'accordent très mal avec la beauté, les productions abondantes & la maniere de vivre des habitans des Indes méridionales de Gonneville, & font du séjour des Peroquets au Cap de la Circoncision une conte fait à plaisir, me dispensent d'insister, pour réfuter absolument cette supposition, sur l'apparence très fondée que ces terres ne sont que des Isles qui ne font pas partie du continent Antarctique.

Il me paroît assez vraisemblable que Gonneville a abordé dans l'Isle de Madagascar, à laquelle sa description vague & transmise par tradition, jusqu'à la publication de l'extrait faite 150 ans après, seule peut convenir; & si l'amour de la vérité m'a imposé comme un devoir de débrouiller le vrai d'un événement, dans lequel l'amour natio-





nal a facilité l'illusion, je ne dois pas craindre le reproche de vouloir déroger à la gloire de la France trop belle pour recevoir de l'accroissement d'une découverte faite sans dessein prémédité & due au hazard, si elle étoit vraie même & bien constatée.

La certitude obtenue par routes les navigations faites à l'est de la Terre des Etats, que les terres apperçues dans ces parages sont des Isles; la mer ouverte vis à vis du Cap Horn à la hauteur de 60 degrés & au delà, & les masses immenses de glaces flottantes de 2 à 300 pieds de haut & de 2 à 3 lieues de tour trouvées au mois de Juin à la hauteur de 52 degrés de latitude par Mrs. Bouvet & Hay depuis le 7 au 53 degré de longitude, & par l'illustre Halley, Davids & Scharp vers les 350 degrés, fondent la conjecture d'une mer ouverte sous le Pole Antarctique, dans laquelle se forment ces glaces énormes, portées par les vents de sud-ouest & les courants dans les parages de la Mer Atlantique à l'est de la longitude de 340 degrés qui rendent les Isles, ou terres qui s'y trouvent, inabordables.

Et s'il est vrai, que les glaces sous le bassin du Pole Arctique sont dues principalement aux rivières de la Sibérie & de la grande Tartarie, il faudroit supposer le concours des mêmes circonstances, des rivières nombreuses d'un cours proportionné, pour produire cette quantité immense de glaces, qu'il faudroit faire descendre de l'intérieur du Continent Antarctique, de la chaîne des montagnes, qui fait le continent des cordelières, jusqu'à la nouvelle Zélande.

Mais la cause de l'existence des glaces dans la Mer Antarctique qu'on prétend attribuer absolument aux rivières de la Sibérie, me paroît très peu fondée. L'eau salée gele aussi bien que l'eau douce, sur quoi il n'est pas en place ici de rapporter les expériences que j'ai faites: & si la mer est plus libre du côté de l'Amérique que vers les côtes de la Sibérie, les courants & la température très différente dans les mêmes latitudes, peuvent être les causes des glaces du côté de la nouvelle Zemble.



Le froid outre cela beaucoup plus vif dans l'hémisphère méridional n'est que trop suffisant pour produire ces glaces énormes & abondantes sans le secours d'aucune circonstance étrangère; & leur conservation jusqu'aux mois d'été les plus chauds, sous une latitude dont la température, dans toutes les mers de l'Hémisphère septentrional, est fort douce & exemte de glaces absolument, en fait une preuve, qui me paroît très convaincante. Ce qui m'a déterminé à ne marquer dans la Carte de l'Hémisphère méridional, faite & remise à l'Académie en 1742 pour l'éclaircissement de ces Mémoires, que le glissement général de ces côtes, suivant les navigations qui en fondent l'existence, sans vouloir en fixer une position sur des suppositions & des conjectures, que le tems doit nous faire connoître. L'Isle de Pepis & les Isles Malouines ou d'Anican présentent des lieux de relâche ou d'établissement admirables lorsqu'on voudroit entreprendre la découverte de ce continent, tant dans la Mer Atlantique, que dans la Mer du Sud.



# CONSIDÉRATIONS

SUR

## LE GLOBE.

### QUATRIÈME MÉMOIRE

SUR

### LES ISLES DE SALOMON.

**A**vant de détailler les découvertes qu'on a faites du second continent austral, je tâcherai de faire connoître les Isles de Salomon, qui de tout tems ont excité l'attention & la curiosité des navigateurs, qui se sont attachés aux découvertes. C'est un Archipel considérable par le nombre & l'étendue des Isles qui le composent, auquel les Espagnols ont donné le nom des Isles de Salomon, sur l'idée de richesses qu'ils ont d'elles. La navigation de Savedra, & un vaisseau qui allant du Mexique aux Philippines avoit rencontré des terres, où il avoit trouvé de l'or, donna l'occasion à la recherche de ces Isles. Le Marquis de Mendoza en reçut l'ordre de la Cour d'Espagne. Il chargea Alvaro de Mendagna son cousin de l'expédition, qui partit de Callao en 1567, & eut pour premier Pilote Gallego. Après avoir fait 16 à 1700 lieues valant 95 à 100 degrés de longit. il arrêta au nord de l'Isle de St. Elisabeth, dont la partie septentrionale doit être par les 6 degrés 30 min. de latit. sud. Il mouilla ensuite dans un Port, qu'il trouva, en suivant les côtes vers le sud-ouest par les 7 degrés 30 min. & nomma le Port de l'Etoile, d'où il l'envoya reconnoître jusqu'à l'extrémité méridionale, qu'on appella le Cap Prito sous les 9 degrés 30 min. On estima sa longueur 95 lieues. Il découvrit plusieurs autres Isles, entre autres une très grande, qu'il nomma Guadalcanar, dont





dont il ne vit que la partie voisine de St. Elisabeth, avec un Volcan par la latit. sud de 9 degrés 45 min. La foiblesse de l'équipage que des maladies avoient diminué beaucoup, força Mendagna de s'en retourner sans faire un établissement.

La crainte du fameux Drack, qui le premier troubla la profonde tranquillité dont les Espagnols jouissoient dans la Mer du Sud, fit remettre des établissemens qu'on projetta d'abord; & des changemens fréquens de Viceroy du Pérou, des troubles au Pérou, & les révoltes des Chiliens firent perdre enfin tout à fait de vue les Isles de Salomon. Ce ne fut que 28 ans après 1595, que Mendagna obtint des vaisseaux sur lesquels il embarqua des femmes, & tout ce qu'il croioit nécessaire pour établir une colonie: il eut Zviros pour premier Pilote. Après avoir fait depuis Lima 1794 lieues de chemin, par les 10 à 11 degrés de latit. sud, il aborda à l'Isle de Guadalcanar ou Ste. Croix, qu'il trouva être environ de 60 lieues de longueur. Il y mourut, ou se perdit, avec le vaisseau Amiral après s'y être arrêté 2 mois 8 jours. Sa mort rendit le second voyage aussi infructueux que le premier; & depuis ce tems la Monarchie Espagnole tomba dans un état de langueur, qui ne lui permit pas de penser à de nouvelles découvertes & à de nouveaux établissemens. La description de ces Isles & de leurs habitans n'a jamais été rendue publique en entier. On envie aux autres un bien dont on ne peut pas jouir; & la foiblesse a toujours mis sa plus grande sûreté dans le secret. On fait en général qu'elles ont l'air tempéré, qu'elles sont très fertiles & excellentes pour y faire des établissemens, abondantes en épiceries, bétail & toutes les sortes de fruits. Le volcan qu'on y a trouvé prouve qu'elles sont élevées & montueuses, & qu'on doit y trouver toutes les choses précieuses que la nature produit dans les climats sous lequel elles sont situées, & qui répondroient au nom fastueux que les Espagnols leur ont donné.

Les habitans de ces Isles doivent être blancs, noirs, roux & blonds, fort doux & fort dociles. Je remarquerai à cette occasion, qu'en général les habitans des terres de la Mer du Sud sont très différens



rens. On en trouve de toutes les couleurs ; de fort doux & traitables, & d'autres plus sauvages & farouches. Il paroît que cela dépend des colonies de différentes nations de Chinois, de Japonnois, de Molucquois, de Nègres de la nouvelle Guinée, &c. dont le hazard les a peuplé. Tous ces peuples vivent encore dans l'état de la première nature, & sans défense, n'ayant d'autres armes, que les bâtons & la première pierre qu'ils ramassent. Voici leurs noms tirés d'Herrera & de Daviti, & ils sont au nombre de 18.

1. Ste. Isabelle ou Elifabeth de 300 lieues de tour.
2. Guadalcanar ou Ste. Croix, un peu moins grande au sud-ouest de la première.
3. 4. St. Marc & St. Nicolas de 10 lieues de tour au sud-est de St. Elifabeth.
5. Arracise de la même grandeur au sud-est de St. Elifabeth.
6. St. Jerome à l'est de St. Elifabeth de la même grandeur.
7. 8. 9. Buena Vista, St. Diemar & Floride de 20 lieues chacune de tour.
10. Ramos de 200 lieues de tour à l'ouest de St. Elifabeth.
11. 12. 13. Malaita, Atregrada & les trois Maries n'en sont pas loin.
14. St. Jaques de 200 lieues de tour au sud de Malaita.
15. St. Christophe au sud-est de la précédente de la même grandeur.
16. 17. 18. Ste. Anne, Ste. Catherine & Nombre de Dios petites au nord, & éloignées des autres.





# CONSIDÉRATIONS

SUR

LE GLOBE

CINQUIÈME MÉMOIRE,

SUR

LE CONTINENT AUSTRAL OU MÉRIDIONAL.

---

**L**e second continent méridional un peu mieux connu que le premier est situé dans les plus beaux climats depuis la ligne jusqu'au 45 degré latit. sud : sa découverte & sa possession feroient obtenir assurément les plus grand avantages par lui-même & par la communication facile avec les possessions Européennes en Afrique & aux Indes orientales. On trouveroit dans les Régistres de la Compagnie des Indes orientales de Hollande des Relations de leurs Gouverneurs de Batavia qui ont fait visiter une partie des côtes de ce continent, qui donneroient de grandes lumieres. Mais, comme il n'est pas de son intérêt, & au dessus de ses forces, d'y faire des établissemens, elle aime mieux qu'il reste inconnu aux autres puissances de l'Europe, qui y trouveroient les denrées précieuses qu'elle leur fournit à présent. Une compagnie marchande, obligée de faire des fraix immenses, d'entretenir des forces considérables de mer & de terre, pour se maintenir dans la possession de pais très vastes, & de places en grand nombre très dispersées, qui l'auroient renversé depuis longtems, si le commerce exclusif des épiceries ne la soutenoit pas, ne peut pas étendre ses possessions & faire de nouveaux établissemens, à moins qu'elle n'y trouve l'or & l'argent à prendre sans la moindre dépense. Pour se maintenir dans la possession exclusive de son commerce, elle a fait



comme les Espagnols & les Portugais, qui se firent partager notre Globe par le Pape. Elle a obtenu deux méridiens de démarcation par lesquels elle jouit du commerce exclusif & de la possession de tous les païs découverts ou non découverts, des établissemens faits & à faire depuis les 50 jusqu'aux 200 degrés de longit. Sa jalousie s'est avancée si fort dans la Mer du Sud pour empêcher la découverte des Isles de Salomon, & de la nouvelle Zélande, qu'ils défendent à la Compagnie occidentale & à tout Hollandois, de ne pas commercer, faire d'établissement ou de découverte dans cette immensité des mers & des terres.

Elle est déjà obligée de détruire plus d'aromates qu'elle ne peut employer & débiter; & elle n'a d'autre intérêt que d'empêcher que d'autres ne lui enlèvent une partie de ses possessions, & de son commerce, ou de dérober la connoissance de découvertes, & d'établissements, qui, en procurant les mêmes productions, lui feroient les mêmes torts, & auxquels elle ne pourroit ni n'oseroit s'opposer à force ouverte.

Je ne m'étendrai pas sur l'extrémité méridionale de ce continent découverte en 1642 par Tasman, sur les différentes parties de sa côte occidentale, la Terre de Nuits découverte en 1627, la Terre de la Lionne en 1622, la Terre de la Concorde découverte en 1616, reconnue en 1696 par des vaisseaux de la Compagnie des Indes orientales de Hollande, & visitée en 1699 par Dampiere, la Terre de With, découverte en 1628, & visitée en 1688 & 1699 par Dampiere, les Terres de Diemen, d'Arnheim & Carpenterie, noms qu'elles ont reçues en partie des Gouverneurs de Batavia qui les ont fait reconnoître. Le résultat de ces découvertes est qu'une partie de ces côtes est basse, & inondée jusqu'à une certaine distance dans les terres, que ses habitans comme ceux de toutes les nouvelles terres, sont d'un caractère sauvage, que ses productions ne promettent pas de grands avantages, & que ce n'est qu'en pénétrant dans l'intérieur du païs qu'on pourroit espérer d'en trouver. La connoissance la plus intéressante est celle que donne la Relation de Quiros d'une partie de sa côte  
orien-



orientale, Terre heureuse, dont il nous donne la connoissance la plus exacte & la plus circonstanciée. J'ai déjà dit, qu'il avoit fait en 1595, avec Mendagna un voyage en qualité de premier Pilote pour la découverte des Isles de Salomon, qui n'eut pas beaucoup de succès. Il obtint en 1605 deux vaisseaux, & eut sous lui le Capitaine Louis Perez de Torres. Il partit de Callao le 21 Decembre 1605, dirigea sa route sud-ouest, & fit après 36 jours de navigation les belles découvertes, entre les 25 & 18 degrés de lat. qui regardent le premier continent dont j'ai déjà parlé. Il continua de là sa route entre les 10 & 11 degrés de lat. sud, & après 90 jours de navigation il arriva sans avoir rencontré aucune Isle aux côtes orientales de ce continent, qu'il parcourut par une étendue de 80 lieues, & qu'il nomma la Terre de St. Esprit. Il retourna de cette côte, faisant route par le nord-est au Mexique, en la dirigeant autant qu'il pouvoit, & que les vents alisés le permettoient à l'est pour toucher aux Isles de Salomon. Il les manqua, soit qu'il ne les crut pas si fort à l'est qu'elles le sont à l'égard des Terres dont il partit, ou qu'il ne lui fut pas possible de diriger assez à l'est sa route. Il alla du Mexique en Espagne, & demanda avec les plus grandes instances à Philippe III. d'y faire des établissemens. Il sollicita vainement plusieurs années, & mourut en Espagne avec le chagrin d'avoir adressé ses belles vues à un roi indolent, qui se consola de la perte des plus belles provinces parce qu'une riviere ne s'aggrandit qu'en perdant de ses bords, & qui n'avoit aucun des talens nécessaires pour réparer les fautes de son pere, & arrêter ou appaiser la haine & la jalousie de toute l'Europe qu'il lui avoit laissé pour héritage. La politique vague superstitieuse, cruelle, & intrigante de Philippe II. uniquement occupé à troubler l'Europe & à opprimer ses peuples, avoit commencé la chute de cette vaste & superbe Monarchie, fondée par le bonheur & le génie de Ferdinand, d'Isabelle, & de Charles-quin, qui embrassoit l'ancien & le nouveau monde, & n'avoit de bornes que celles de notre globe. Il ne comprit jamais que la politique des rois ne peut ni ne doit avoir d'autre but que le bonheur des peuples qu'ils gouvernent; il crut que c'étoit l'art de les tyranniser





& de faire du mal aux autres. Il prépara la perte de la Hollande, des Indes orientales, & du Brésil, & ne fit une guerre continuelle, que pour dissiper les Trésors des deux Indes, & pour épuiser l'Espagne dont il fit un désert par la persécution & l'expulsion des Maures.

Voici la relation qui est la huitieme requête que j'ai tirée, & traduite des Mémoires qui se trouvent dans les Recueils des freres Bøy.

„Votre Majesté me permettra de l'informer que c'est la huitieme supplique, que moi Ferdinand de Zviros ai l'honneur de lui adresser, dans lesquelles, je l'ai prié avec autant d'instance que l'importance de la chose le mérite, de faire des établissemens dans les pays méridionaux inconnus jusqu'ici, mais découverts par moi. Au lieu de la résolution la plus favorable, à laquelle je devois m'attendre, je n'ai point eu de réponse pendant un séjour de 14 mois, que j'ai fait à la Cour de V. M. J'ai employé mon bien & mes peines pendant 14 ans pour ces découvertes, j'ai parcouru des mers immenses, & n'ayant essuyé jusqu'ici que des dangers, & des travaux infinis, je crois pouvoir demander à V. M. d'être employé dans l'entreprise que je propose avec les vaisseaux & les secours nécessaires pour la faire réussir; récompense unique que je demande pour les peines que je me suis données. Il est sûr que l'étendue de ce pays, (suivant ce que j'ai vu moi-même, j'en appelle au témoignage du Capitaine Louis Perez de Torres & de tout mon équipage,) surpasse l'Europe, l'Asie mineure, & les Isles qui y appartiennent en grandeur. V. M. peut en faire facilement la conquête sans avoir à craindre comme aux Indes orientales, le voisinage des Turcs, Maures & autres. Il s'étend de la ligne dans la zone tempérée, & il faut remarquer que, comme la plupart des pays découverts jusqu'ici sous les 15 degrés de lat. surpassent l'Espagne en fertilité, celui-ci à cette hauteur est un vrai paradis terrestre. Nous serons les Antipodes d'une partie de l'Europe, de l'Asie & de l'Afrique si nous y faisons des établissemens. Le pays est élevé, & entremêlé de montagnes & de plaines. Il est peuplé d'habitans blancs, noirs & jaunes. Les uns ont les cheveux longs & noirs, d'autres jaunes, luisans, frisés ou en touffes. *La couleur des cheveux marque la différence*



*rence des nations.* Ils ignorent l'art de bâtir des villes, vivent sans loix ni magistrats, sous l'autorité des peres de familles, & observent des coutumes très simples. Ils ont des endroits particuliers pour enterrer les morts & pour faire la priere. Leurs armes sont des piques de bois, & des arcs & des flèches, qu'ils n'empoisonnent pas, comme plusieurs Indiens de l'Amérique. Ils se servent de canots pour la pêche, & ceux des Isles sont bien bâris. Ils sont habillés depuis le nombril jusqu'à la moitié de la jambe, ils vivent longtems, sont bien-faits, vifs, agiles, gais, doux, traitables, de bon caractère, & extrêmement reconnoissans. Ce qui me fait espérer qu'on en viendra à bout en les traitant avec douceur. Leurs maisons sont couvertes de feuilles & de branches d'arbres. Ils ont toutes sortes de poterie, des couteaux, scies & autres instrumens tranchans, de nacre, avec lesquels ils travaillent, & font des cuilleres & d'autres outils de bois. Ils ont des flûtes, tambours, & autres sortes d'instrumens de musique. Leurs jardins & terres labourables sont bien distribuées & entourées de Cocotiers, & de hayes vives. Nous leur avons appris à châtrer des cochons & des coqs. Ils font du pain qui est admirable de trois sortes de racines. La terre est noire, grasse & extrêmement fertile. Elle produit en général tout ce que nous avons en Europe en grande abondance, toutes sortes de légumes, des fruits, des raisins admirables, Citrons, Oranges, Canes de Sucre, Cocos & d'autres fruits que nous ne connoissons pas. Il y a trois sortes de plantes dont on fait l'usage de notre lin. La campagne est entremêlée de Forêts de haute futaie, d'Ebeniers, de Cedres &c. propres pour la marine & toutes sortes de bâtimens: le goudron dont on se sert pour les bateaux, est fait d'huile de Cocos, mais il y en a encore une autre espèce. Tout le país fourmille de bestiaux, de moutons, de cochons, & de toutes sortes de Volailles. Les rivières abondent autant en poissons d'eau douce que la mer des côtes en poissons qui lui sont propres, & en huîtres, moules & coquilles. Nous n'avons vû sur toute la côte aucun animal dangereux, ni terrestre ni aquatique, même peu ou point de mouches & de coulins. Le vent d'est continuel qui





vient de la mer, nettoie & rafraichit la côte, comme le même vent, fait le même effet sur celle du Brésil, avec la différence que la Mer du Sud étant trois fois plus étendue que l'Océan entre l'Afrique & l'Amérique, cette côte doit être beaucoup plus fraîche & agréable que celle du Brésil. Mais ce qui par dessus la beauté & la fertilité du pays fait le point le plus important, nous y avons trouvé toutes les choses précieuses. Mon Capitaine est entré dans le pays, & a trouvé beaucoup d'or; j'ai vû du minéral d'argent, des diamants & d'autres pierres précieuses. Il y a des huîtres perlières en abondance dans la mer qui baigne les côtes. Nous avons trouvé de la soye, de l'ivoire, des fleurs & des noix de muscade, du gingembre, & selon toutes les apparences, il doit s'y trouver de la canelle & des cloux de girofle. Toute la côte est saine & sûre. Le port que nous avons nommé Vera Crux peut contenir plus de 1000 vaisseaux à l'abri de tous les vents. Il est à l'embouchure de deux rivières, dont l'une ressemble au Guadalquivir, d'un côté elle est bordée par une belle forêt, & de l'autre côté par une vaste plaine. A quelque distance de la côte, il y a 7 grandes Isles de plus de 200 lieues d'étendue, dont une qui n'est qu'à 10 lieues du port, peut avoir 50 lieues de tour. Quand V. M. sera le maître de ce pays, il fera l'entrepôt de tout le commerce du Chili, du Pérou, du Mexique, de toutes les terres de la Mer pacifique, des Isles Philippines, du Japon, de la Chine, des Isles Moluques, de leurs aromates, & de toutes les Indes orientales. J'ai érigé une croix, bâti une eglise à la Ste. Vierge de Lorette, & fait dire 20 Messes, auxquelles tout mon équipage a assisté pour avoir des indulgences pour la Pentecôte. J'ai fait une procession le jour du Corps de notre Seigneur, & j'ai attaché en trois différens endroits les armes & les titres de V. M. Cette découverte ne peut qu'augmenter & étendre sa gloire en faisant connoître son nom glorieux dans des pays immenses, & vous pouvez ajouter, Sire, de ce moment à vos titres celui de la Terre australe de St. Esprit.

Il me paroît inutile, après cette rélation si circonstanciée de détailler ce qui se trouve dans Dampierre qui a visité cette côte orientale depuis



depuis la ligne jusqu'au 6 degré de lat. (*& a découvert que la Nouvelle Bretagne est une Isle séparée de la Terre ferme,*) ni de rapporter ce qui se trouve dans la relation des trois vaisseaux envoyés en 1721. par la Compagnie des Indes occidentales de Hollande à la découverte des Terres Australes, dans Tasman, le Maire & Herrera. Ils s'accordent parfaitement avec la Relation de Zviros. C'est une terre fertile & délicieuse, où l'on trouveroit les aromates, & toutes les choses précieuses. Texeira & Argensola nous apprennent que les rois de Ternate, quand ils étoient les maîtres des Moluques, & des terres voisines, tiroient beaucoup d'or de la Terre des Papous, qui est une partie, peut-être séparée par un canal du continent même.

Les côtes occidentales de ce continent dans la Mer des Indes annoncent des Terres basses; mais celles de la partie orientale dans l'Océan pacifique sont très élevées; il paroît qu'une chaîne de Montagnes, qui par le Cap Diemen tient au Sud à la Nouvelle Zélande remonte du Nord vers la ligne, en ne s'éloignant gueres des côtes de la Mer du Sud, & les partage en deux parties inégales en grandeur.

Ne m'étant proposé dans ces Mémoires, que la discussion Géographique des Parties inconnues du Globe, je réserve celle qui regarde les habitants & les productions de ces deux continents & des Isles des vastes mers qui les environnent, pour un Mémoire séparé.

Ceux du continent Antarctique paroissent tirer leur origine de la Chine & du Japon; comme ceux de la côte ou partie orientale du second, avec un mélange déjà d'autres races. Les Negres de la Terre de Papous & de la partie occidentale, désignée dans les cartes par le nom de la Nouvelle Hollande, sont selon toute apparence des peuplades sorties du continent de l'Afrique.

J'ai proposé la découverte de ces deux continents, qui par leur situation promettent les avantages les plus grands pour le commerce; & de faire en même tems la chose la plus belle & la plus intéressante pour tous les hommes; de leur donner une connoissance parfaite du Globe qu'ils habitent.

Ma proposition n'est pas fondée, comme celle de la découverte de l'Amérique par Colomb le fut, sur des conjectures géographiques &



& physiques, dont le philosophe & l'homme instruit savent apprécier le mérite, mais qui ne sauroient toucher & mettre en mouvement la politique ordinaire, bornée, petite & intéressée ; elle est appuyée sur des faits incontestables, qui donnent une certitude absolue, sur le témoignage d'un nombre considérable de témoins véridiques, de Navigateurs dont j'ai suivi, comparé & combiné avec attention, les routes, les observations & les découvertes.

L'existence présente de l'Europe, si glorieuse & si belle a tant d'égards, est dépendante absolument de son commerce & de ses colonies, dans les autres parties de notre globe ; qu'on la réduise un moment à elle-même, une révolution étrange dans les arts, les manufactures, la manière de vivre, la nourriture, les mœurs, la population & l'intérêt politique en feroit la suite.

Chaque peuple s'en est approprié une partie, & la portion qui fait son partage décide, suivant la sagesse avec laquelle il fait la ménager, du degré de sa puissance, de ses ressources & de son opulence ; l'intérêt du commerce porté au degré de la plus grande extension est celui qui subordonne tous les autres, & la jalousie qui regne à cet égard entre les puissances maritimes, est le germe de ces guerres funestes qui désolent l'Europe aujourd'hui, qu'une trêve forcée & dictée par la nécessité & l'épuisement terminera, & qui s'embrasera avec plus de force, après le court intervalle d'une paix qui dans le fond n'est qu'une guerre continuée de chicanes sans hostilité, pendant lequel le gouvernement prépare les prétextes pour l'éclat, & pourvoit à de nouveaux moyens pour écraser le peuple.

Un regard jetté sur le globe fait voir le délire de ces égaremens ambitieux ; il présente une source intarissable de bonheur & de richesses, dans laquelle par la communication heureuse & paisible avec des peuples immenses, qu'une ignorance stupide néglige, la sagesse puiseroit sans cesse ces avantages solides & réels, ces biens précieux, qui échappent à la politique fondée sur la vanité, la destruction & le carnage.





S U R  
LES PRÉSERVATIFS  
LES PLUS EFFICACES  
CONTRE LA PETITE VÉROLE.  
PAR M. COTHENIUS.

*Traduit du Latin.*

**J**e rougis assurément, MESSIEURS, d'être depuis si longtems \*) Membre de votre Illustre Corps, & d'y avoir été aggrégé avec des témoignages si flatteurs de votre affection, sans vous avoir encore donné des marques publiques de ma reconnoissance; il semble que j'aye trompé votre attente, & j'ai besoin de toute votre indulgence pour excuser un aussi long retardement.

Je ne me le pardonnerois pas à moi-même, ce retardement, si c'étoit un pur effet de ma négligence; mais vous savez tous quelles sont les occupations nombreuses & indispensables, auxquelles je suis continuellement obligé de vaquer: c'est sur elles que je fonde l'espérance de trouver grace auprès de vous.

Comment en effet des hommes tels que vous, MESSIEURS, qui connoissez tout le prix de l'humanité, toute l'importance des services dont la Patrie est l'objet, feroient-ils surpris que je croye devoir & que je consacre en effet tout mon tems & toutes mes forces à l'exercice de fonctions dans lesquelles il ne s'agit pas moins que de veiller à la conservation de la précieuse santé de notre grand Monarque,

\*) Ce Discours a été lu à l'Académie le 31 Janvier 1765.

que, & de l'Auguste Maison Royale, sans refuser pour cela mes soins aux Citoyens renfermés dans les villes, aux habitans des campagnes, & à ces Orphelins entretenus par l'Etat qui me sont particulièrement confiés.

Je pourrois ajouter à cela une foule d'affaires publiques dont j'ai l'administration dans cette Capitale, & qui emportent une portion considérable de mon tems.

Et combien les motifs que je Vous allegue ici, n'ont-ils pas eu de force, à quel point ne se sont-ils pas accrus, pendant le cours de cette redoutable guerre, où, au milieu des dangers, au sein des combats, j'étois appelé à me dévouer au service de ces généreux défenseurs de la Patrie, de ces braves Soldats, dont les uns étoient aux prises avec les maladies, les autres couverts de blessures.

C'est dans cet intervalle de tems-là même, où je bravois avec joye la mort en respirant l'air empesté des Hopitaux militaires, qui m'a infecté moi-même à quatre reprises de sa contagion, que vous avez cru, MESSIEURS, devoir encourager mes efforts, & récompenser mes travaux, de la maniere la plus agréable & la plus honorable pour moi, en associant mon nom à la gloire des vôtres.

Permettez donc, Illustres Académiciens, que je dévoile ici le fond de mon coeur, & que je vous le montre comblé, inondé, pénétré du sentiment de vos bienfaits.

Recevez, je vous en conjure, favorablement avec mes actions de grace le vœu que je renouvelle & que je confirme solennellement, de ne me proposer jamais d'autre but que le bien du genre humain.

Que le secours de vos lumieres me rende de plus en plus capable d'accomplir ce vœu! que le prix de votre amitié m'y encourage puissamment & m'en récompense abondamment!

Quand je ne vous serois connu, MESSIEURS, par aucun endroit, quand je n'aurois pas contracté avec vous les douces relations d'Asso-





d'Associé & de Confrere, je n'aurois pas laissé de courir la même carrière que vous à un égard, j'aurois osé vous disputer la palme dans un genre; je veux parler du zele inviolable & de tous les sentimens d'admiration, de respect & d'amour, dûs à ce grand Roi, qui tient incontestablement le premier rang parmi les vrais Héros.

C'est lui qui, assis sur le Char de la Victoire, rassure l'Univers allarmé, soulage ses peuples gémissans sous le poids des catastrophes inséparables de la Guerre, assure leur repos & leur bonheur par cette paix glorieuse tant désirée, & rend aux Muses le loisir & la tranquillité dont elles ont besoin.

C'est lui, qui, après avoir été la terreur des ennemis, dépose cet aspect formidable, pour contracter & ferrer avec eux les liens d'une douce amitié; pour se dévouer surtout au bien de ses peuples, pour être le tendre Perc de la Patrie.

L'exalter, entreprendre son éloge! Quel projet plus téméraire! Non, il vaut mieux l'admirer en silence, le vénérer dans l'intérieur de son ame, que de déployer les voiles d'une éloquence qui ne pourroit se préserver du naufrage. C'est ici le cas de ces grandes choses où il suffit d'avoir voulu.

Considérons-le avec complaisance comme notre Bienfaiteur, mais ne prenons pas un vol trop élevé pour aller l'envisager dans ce faite de gloire où ses exploits l'ont placé.

Vivre sous les ailes d'un tel Roi, voilà notre gloire & notre sûreté; reconnoître & sentir ce bonheur, voilà notre devoir le plus sacré.

Fasse le Maitre du Monde, l'Arbitre des Destinées, je l'en supplie avec ardeur, que les jours glorieux de ce bon Roi, de ce sage Pere de la Patrie, de ce digne Protecteur de l'Académie, coulent avec la plus grande lenteur, & soyent comblés de prospérités! Que celui dont tous les soins tendent à nous rendre heureux à l'avenir, jouisse le premier du bonheur le plus pur! Que toute l'Auguste Maison Royale fleurisse d'âge en âge & de siecle en siecle, tant que le Monde subsistera!



A' présent, Messieurs mes très honorés & très chers Confreres, accordez-moi quelques momens d'une d'attention favorable; je tâcherai de la mériter en traitant un sujet très intéressant, dont je sou-mets la décision à vos lumieres. Je vais exposer les meilleurs moyens de prévenir les ravages de la petite vérole, les préservatifs les plus assurés contre cette redoutable contagion.

Je ne crois pas qu'il y ait actuellement personne, non seulement dans une Assemblée de Savans telle que celle-ci, mais parmi tous les citoyens de quelque ordre qu'ils soyent, aux oreilles de qui le nom de l'Inoculation ne soit parvenu, & qui n'ait quelque idée de cette pratique.

Il n'y a point non plus d'ame assez insensible, de coeur assez dur, pour ne pas déplorer la perte continuelle de tant de sujets enlevés à leurs familles & à l'Etat par le terrible fléau de la petite vérole, qui rend si souvent tout l'art de la médecine inutile & infructueux.

On ne sauroit s'empêcher de mettre en ligne de compte les gémissemens du beau sexe, à qui cette cruelle maladie ôte souvent son droit à ce titre, en le défigurant au point de lui arracher des vœux impies, de lui faire préférer la perte de la vie à celle de ces charmes dont l'éclat étoit la source de tant de douceurs.

Il s'est écoulé un demi-siècle, depuis que la nouvelle méthode de préserver les hommes de ce mal qui les fait périr ou les rend difformés, s'est introduite par *Emanuel Timon*, Médecin de Constantinople, qui avoit fait ses études à Oxford & à Padoue. C'étoit une pratique usitée depuis longtems chez les Georgiens, les Circassiens & les Arméniens; de qui elle avoit passé aux Grecs de Constantinople. *Jaques Pylarin* de Céphalonie, premier Médecin de PIERRE LE GRAND, Empereur de Russie, qui fut depuis chargé des affaires de la République de Venise à Constantinople, y avoit aussi inoculé; & ce fut à l'exemple de ce dernier que *Maillard* commença d'en faire autant à Londres, avec tant de succès que les Anglois ne balancerent pas à adopter cette pratique, & à la répandre dans tous les Etats soumis à leur domination, en particulier dans leurs Provinces d'Amérique.

Le





Le bruit s'en répandit bientôt par toute l'Europe, où le plus grand nombre reçut cette nouveauté comme un bienfait insigne de la Providence, & lui donna les éloges les plus magnifiques. D'autres pourtant cherchèrent à la rendre suspecte, ou même la décririent fortement. Il y eut des tems, où en Angleterre même, & surtout dans la nouvelle, il s'excita des murmures si forts à ce sujet parmi le peuple, que cet usage demeura suspendu & parut aboli. Reprenant ensuite de nouvelles forces, l'inoculation trouva les défenseurs les plus ardens, non seulement en Angleterre, mais en France, en Allemagne & ailleurs.

Je me souviens cependant d'avoir vu des gens de bon sens & de probité s'élever avec force contre elle, prétendant qu'il y avoit de la témérité à une personne en parfaite santé de se procurer une maladie artificielle, qui la met en danger de mourir, l'événement de l'inoculation n'étant jamais infailible, ni toujours heureux, mais souvent douteux, & quelquefois mortel; ce dont ils alléguoient des preuves de fait.

Les Théologiens & les Prédicateurs tournèrent leurs vues sur cet objet, les uns prétendant que les raisons les plus fortes ne permettoient pas qu'on tentât ainsi la Providence; & les autres jugeant au contraire qu'on ne pouvoit trop recommander & étendre l'usage d'une pratique aussi salutaire.

Ainsi dans certains endroits on trouva les plus grandes facilités; tandis qu'ailleurs l'attachement aux anciens usages, ou des motifs de conscience, inspirèrent la plus grande répugnance pour une tentative équivoque & périlleuse.

L'importance du sujet, l'honneur de l'art & l'intérêt public m'ont engagé à faire tous mes efforts pour approfondir un sujet aussi épineux; j'ai apporté à cet examen la plus entière impartialité; & je n'ai d'autre but que d'assigner son juste prix à la vérité déjà découverte, ou encore à découvrir.

On m'excusera sans doute, si, avant que d'entrer dans le fond même de la discussion, je fais précéder cette Question: Si la petite



vérole est une maladie qui naît avec nous, dont personne à quelque âge qu'il soit parvenu ne peut se croire à couvert; en sorte que, suivant l'hypothèse d'un Médecin de Silésie qui a eu de la réputation, c'est un développement parfait, nécessaire dans le corps humain pour que la santé acquière sa consistance décidée; ou bien, si c'est une maladie nouvelle, née sous un Ciel étranger, & dont les hommes pourroient demeurer exempts, sans que leur constitution & leur santé en souffrissent la moindre atteinte.

En recourant soigneusement aux monumens de l'Antiquité, on ne trouve aucune preuve qui mette en droit d'affirmer que les maladies dont le genre humain est aujourd'hui affligé, aient régné dans tous les tems. Des Savans distingués ont même démontré que la petite vérole a été pleinement inconnue aux Grecs; quoique quelques autres aient prétendu que les *anthraxes*, en Latin *carbunculi*, dont Hippocrate & d'autres Médecins Grecs font mention, doivent être pris pour la petite vérole.

Il y a eu, & il existe encore, des gens qui nient positivement la naissance d'aucune nouvelle maladie; mais ils semblent manquer de précision, & confondre la disposition à contracter toutes sortes de maladies avec les maladies mêmes.

Et l'on ne peut pas dire même que cette disposition existe dans tout corps animal, chaque individu, suivant la structure & l'économie de son corps, étant plus disposé à recevoir ou à engendrer telle ou telle maladie, plutôt que telle ou telle autre.

La maladie des bœufs, aussi bien que toutes les autres contagions propres aux animaux, ne peuvent exercer aucun empire sur le corps humain, quoiqu'elles consistent en exhalaisons malignes, & que l'haleine seule suffise pour la communiquer aux bœufs.

On sait généralement que le mal vénérien tire son origine, de l'Amérique, & que le pourpre des accouchées est propre à l'Allemagne.

C'est



C'est de l'air que nous respirons, des coutumes qu'on nous fait contracter dès notre tendre enfance, des influences du soleil, des qualités de nos alimens solides & liquides, du genre de vie auquel nous sommes dévoués, qu'on peut & doit déduire les raisons de toutes les maladies dont les habitans des diverses contrées de la Terre sont affectés & affligés en tant de manieres différentes.

Quand donc il arrive des changemens dans le genre de vie & dans l'espece de la nourriture, il est incontestable qu'il en naît de nouvelles maladies, ou qu'il peut en survenir du dehors, apportées & introduites par des étrangers: l'expérience ne laisse absolument aucun doute à cet égard.

Quelcun parmi les Grecs ou dans toute autre Nation a-t-il jamais connu cette vilaine & funeste maladie, si commune en Guinée, où elle porte le nom de *Jaws*, par lequel, graces à Dieu, elle nous est aussi uniquement connue jusqu'ici, quoique j'aye lu dans quelque relation, qu'une femme Angloise, qui avoit été attaquée de ce mal en Amérique, & qui avoit passé en Angleterre, y mourut bientôt après, peut-être par un très grand bonheur, ayant que d'avoir pu répandre la semence du mal. Il est en effet contagieux, ce mal, qui se manifeste d'abord par des pustules à la peau de la grandeur d'une pointe d'aiguille, qui deviennent ensuite des ulceres, dont la suppuration ronge entierement la peau, gâte la masse entiere des humeurs; & après avoir dévoré tous les solides, quand il ne lui reste plus d'autre aliment, détruit les os mêmes par la carie.

Je ne dirai rien de la *Vena Medina*, fléau particulier à une Nation Arabe, qui cause les plus cruels tourmens, que la mort seule peut terminer, à moins que par une prompte opération on ne sache tirer un animal vivant, long ver, caché sous la peau, ou à une plus grande profondeur sous les muscles.

Jamais on ne voit les savans plus embarrassés que quand, dans la discussion de questions pleines d'ambiguité, il s'agit de rendre à l'antiquité ce qui lui appartient. C'est en particulier le cas des Médecins



cins par rapport à Hippocrate, le pere de tous ceux qui exercent cet art d'une maniere raisonnable.

Ce n'est pas que je veuille contester le mérite de ceux qui, feuilletant & Livres & Manuscrits, donnent leur tems à la lecture des Auteurs Grecs, & maintiennent les droits de la vénérable Antiquité.

De là une controverse célèbre entre les Médecins du premier ordre, au sujet de la petite vérole : savoir, si elle a été connue d'Hippocrate, & des autres Grecs, dans le tems où leur Ecole étoit florissante ?

Quoiqu'au premier coup d'oeil il semble qu'on pût reléguer cette Question dans la foule de tant d'autres qui sont vaines & frivoles, je la crois pourtant de quelque importance dès qu'il s'agit de porter un jugement assuré sur une autre Controverse, c'est celle de l'inoculation.

En effet, si la petite vérole étoit une maladie étrangere & récemment introduite, pourquoi renoncer d'abord à l'espérance d'en délivrer entierement des Nations dont le climat ou les mœurs ne seroient pas propres à la favoriser ?

Quant au respectable Vieillard de Cos, il n'en coûtera rien à sa gloire, quand même il n'auroit jamais oui parler de la petite vérole. Plût à Dieu que nous fussions assez heureux pour jouir de la même ignorance ! Mais par malheur instruits à nos dépens, nous voyons tous les jours ce funeste mal porter la désolation dans les familles, faire couler des torrens de larmes sur les victimes chéries qu'il enleve à de tendres parens.

Permettez, *Messieurs*, que sortant ici pour un moment de la route dans laquelle j'étois enuré, je vous prie d'être attentifs aux preuves que je veux tirer d'Hippocrate même, pour faire voir que ce qu'il désigne par le nom d'*Anthrax*, quoiqu'on ait voulu le confondre avec la petite vérole, en differe totalement, non seulement parce que c'est une maladie symptomatique, mais encore par sa nature, par la manie-



re dont il est produit, par sa grandeur, sa situation, sa forme, son type & sa cure.

L'*anthrax* des Grecs, dit *carbunculus* en Latin, a été désigné chez les Médecins Arabes par les noms de feu, de charbon, ou de rouille; & l'on trouve là dessus dans Avicenne un passage qui semble mettre la question agitée hors de tout doute, en bannir toute ambiguïté. Cet Auteur dit, „que, si la rouille se mêle au sang, il s'élève parmi les „ulceres varioleux des tumeurs, dans lesquelles cette rouille est semblable aux pustules que cause la brûlure: c'est ce qu'on appelle *feu sacré*; & la petite vérole au milieu de laquelle on voit se former ces „tumeurs est de la plus mauvaise espèce.“ Le même illustre Arabe, dans son Traité des fièvres, en parlant de l'*anthrax* & du *carbunculus*, les met dans la classe des apoltemes, & prescrit une cure différente de celle de la petite vérole.

Ajoutez à cela que les Arabes qui ne se font point honte de reconnoître qu'ils ont puisé l'art de la Médecine chez les Grecs, n'auroient jamais, dans leurs descriptions de la petite vérole, manqué d'alléguer les passages des Auteurs Grecs qui pouvoient s'y rapporter, pour illustrer par là & rendre plus parfaite une doctrine qu'ils n'ont traitée que d'une manière obscure & défectueuse; & ils auroient aussi indiqué en quoi leur méthode de guérir cette maladie différoit de celle des Grecs.

Un argument négatif bien fort encore me paroît pouvoir être tiré du silence d'*Aquarius*, le dernier des Médecins Grecs, qui n'a pas fait la moindre mention de la petite vérole.

Or notre petite vérole d'aujourd'hui, si l'on considère les symptômes qui la précédent & la suivent, leur ordre & cette différence qui, tantôt la donne si bénigne qu'à peine paroît-elle une maladie, tantôt si maligne qu'elle ne diffère point des fièvres pestilentiellles, rend l'événement douteux, ou menace même formellement de la catastrophe; cette petite vérole, dis-je, mérite tant d'attention, que personne ne pourra jamais se persuader, que les Grecs, & surtout Hippocrate, cet incomparable Observateur de toutes les maladies qui ont existé en Grece de son tems, aient passé sous silence celle que nous





nommons aujourd'hui la petite vérole, tandis qu'ils en ont indiqué d'autres qui étoient d'une bien moindre conséquence.

Nous avons ici pour garans des Auteurs qui ont une grande réputation, & qui ont écrit des Histoires de la Médecine, non dans le goût des compilations, mais avec un esprit de discussion qui leur a fait peser exactement chaque objet, & lui donner son juste prix. Tels sont particulièrement Mrs. *Freind* & *Le Clerc*.

S'il est donc à présent plus clair que le jour, que la petite vérole a été inconnue aux Grecs, l'Histoire ne dépose pas moins certainement, qu'on a commencé à l'observer en Egypte, du tems d'Omar, Successeur de Mahomet.

Une chose remarquable ici, c'est celle que Mr. *Jean Reiske* a tirée d'un vieux Manuscrit Arabe de la Bibliothèque de Leyde, & qu'il rapporte en ces termes: „C'est cette année que la petite vérole „& la rougeole ont paru pour la première fois dans les contrées des „Arabes.” Or cette année étoit la 502 de N. S. & celle dans laquelle Mahomet est venu au monde.

Autant que je puis m'en souvenir, il n'y a point de país en Europe qui ait fourni la naissance & la première origine à des maladies assez contagieuses & funestes pour que la seule communication du souffle fût pour convertir toute la masse du sang en une pourriture complète, & en reproduisant aussitôt des semences semblables à elle, passer avec une rapidité incroyable d'un corps à un autre; comme on sait que cela est arrivé en Afrique & en Amérique.

En effet il est constant par l'Histoire que l'Amérique a été le berceau du mal vénérien, & l'Afrique celui de la peste.

La chose ne sera pas difficile à concevoir, si d'abord on fait attention qu'il n'y a point de venin plus puissant que celui qui s'engendre dans le corps animal. J'en puis, hélas! produire une preuve dont les exemples ne sont que trop frappans, c'est celle que fournit la rage, ce mal dont les symptômes pénètrent tout coeur sensible de la plus vive compassion: qui est-ce qui ignore qu'il prend sa source dans les humeurs du chien? & l'on ne sauroit assez s'é-

tonner





tonner à quel point ce venin est communicable, & ne manque jamais d'en produire un qui lui ressemble parfaitement.

A' présent considérons le nombre innombrable des especes différentes d'insectes qui fourmillent dans les contrées où tout favorise leur propagation, le Ciel & ses vives ardeurs, la terre & sa brûlante sécheresse, les lacs, les marais, les étangs, d'épaisses forêts qui empêchent le passage d'un air rafraîchissant, d'un vent propre à disperser les petits oeufs qui voltigent dans l'air, à les froisser & à les rendre stériles.

On a peine à croire ce que Leuwenhoek rapporte; qu'au microscope il a vu dans une seule goutte d'eau des animalcules par milliers, par dizaines & centaines de milliers.

A' quoi l'on peut ajouter l'observation de Lancisius, suivant laquelle ce peuple immense d'animalcules dépose tant d'ordures dans l'eau qu'ils habitent, que cette eau, mise exprès à part dans une bouteille pour faire l'expérience, en est rendue toute trouble.

Needham & Backer, qui sont venus depuis, confirment les mêmes faits; & l'observation leur a appris que, plus les animalcules sont petits, plus la quantité de leurs excréments est copieuse.

Les animalcules dont la postérité est la plus abondante, sont ceux qui vivent le moins.

Que toutes les especes d'insectes renferment un sel acre & caustique, c'est ce que nous pouvons inférer non seulement de leur morsure, mais des effets de leur application à notre peau, qui fait suffisamment voir que toute leur substance est vénémeuse.

Concevons à présent une chose dont l'expérience commune & journaliere nous instruit, c'est que le Soleil exerce continuellement son action sur les cadavres, les dépouilles & les excréments de ces insectes, répandus à la surface des eaux marécageuses. Combien de différence n'y a-t-il pas entre toutes ces particules! Quelle action & quelle réaction! A' quel point ne sont pas divisées des matieres qui étoient auparavant réunies?

La Chimie enseigne de plus qu'au moyen du feu & d'une chaleur non interrompue les corps sont détruits & décomposés, de



maniere que par le conflit & par de nouvelles réunions des particules qui ont été dégagées & mises en liberté, il se compose de nouveaux corps, que l'acreté se renforce, & la volatilité s'exalte à un point qui ne permet plus de renfermer & de contenir dans aucun vase des particules aussi subtiles & aussi pénétrantes.

Il est à propos aussi de se rappeler que, sous un Ciel ardent naissent les racines, les herbes, les plantes, les arbrustes, les fleurs qui ont une force inflammatoire, purgative & perpétuellement stimulante.

Quand ces parties végétales vénimeuses viennent à se choquer avec les parties animales dont le venin est encore plus subtil, quand elles sont soumises ensemble aux loix de la putréfaction & de la fermentation, quelcun pourroit-il encore s'étonner qu'il s'engendre dans certaines contrées de la Terre de véritables poisons, & qu'ils soyent assez actifs pour nuire, non seulement par la voye de l'atouchement, mais aussi par celle du soufflé.

Vous paroitra-t-il après cela déraisonnable, MESSIEURS, de supposer que c'est par de semblables opérations de la Nature que le mal contagieux de la petite vérole a été produit autrefois dans quelque contrée de l'Afrique.

On ne sauroit former une objection valable contre cette these, en la tirant de ce qu'un mal si facile à communiquer, seroit demeuré caché & inconnu pendant tant de siècles. Il est assez connu qu'il n'y a point eu de commerce entre les nations qui joignoient à la grossiereté des moeurs la simplicité de la vie à l'égard de la nourriture & du vêtement, sans avoir aucune connoissance des choses de pur agrément, sans inventer les arts qui embellissent la société, & en se bornant à recueillir les fruits que la terre produit & qu'elle donne d'elle-même. Ces peuples ne se doutoient pas même qu'il existât d'autres biens. Point de soucis du lendemain. Point de provisions, de superflu, ni de disette. Point de disputes ni de combats pour le tien & le mien ; le voyageur à vuide peut y chanter impunément à la face du brigand ; rien n'excite & n'entretient l'avarice & la volupté ; & par conséquent les peuples voisins n'ont au-

cune



cune envie de pénétrer dans des lieux où rien ne les attire, & d'où il n'y a pas la moindre dépouille à remporter. Cet état d'ignorance & de stupidité vaut mieux que les plus fortes barrières & les remparts les plus élevés.

Mais, bon Dieu ! à quelles entreprises & à quels excès la soif exécrable de l'or n'a-t-elle pas poussé dans tous les tems les avides mortels ? À peine ceux qui, dans une extrême pauvreté, vivoient contents de leur sort, ont-ils acquis des richesses, que déjà ils craignent la pauvreté, & pour s'en garantir, tâchent d'envahir le bien d'autrui. Possédés de cette manie, ils parcourent les terres & les mers ; l'homme n'est plus en sûreté avec l'homme ; les vols, les meurtres, les incendies, deviennent non seulement communs, mais glorieux ; ce sont des exploits, & la guerre qui réunit toutes ces horreurs, ouvre la carrière de l'honneur, elle forme les Héros. On charge des vaisseaux du butin fait sur des peuples que la force des armes a contraint de subir le joug d'un vainqueur inhumain ; on détruit, on moissonne en un clin d'oeil tout ce que des siècles d'industrie & de commerce avoient accumulé.

Mais voyez au sein de ces victoires remportées, au milieu de ces trophées magnifiques, parmi ces trésors qu'on rapporte dans sa patrie, voyez-y les maladies les plus funestes, qui procureront bientôt à la mort d'autres victoires & d'autres triomphes. Je n'en impose point : les choses sont exactement ainsi.

C'est le commerce maritime qui, vers la fin du XV. Siècle, fit passer le mal vénérien d'Amérique en Espagne ; & l'on sait qu'il entra de là dans le Royaume de Naples en 1498. avec l'armée de l'Empereur Ferdinand, qui y faisoit alors la guerre aux François. Cette maladie n'a été connue en Russie que du tems de Pierre le Grand, parce que jusqu'alors la Nation Russe n'avoit eu aucun commerce, aucune liaison avec les étrangers.

Seroit-il donc surprenant que les Grecs des siècles reculés n'aient pas connu la petite vérole, dans un tems où plusieurs autres maladies propres à l'Afrique étoient pareillement ignorées. Mais,



après que le Nil eût été rendu plus propre à la navigation, & qu'on eût découvert de nouvelles nations, l'avidité des hommes fit qu'en rapportant des denrées & des marchandises étrangères dans leur patrie, ils lui firent présent d'une maladie nouvelle; & il est tout à fait vraisemblable que c'est ainsi que la petite vérole parvint à la connoissance des Egyptiens, fameux par leurs navigations sur le Nil. Rien de plus croyable que la conjecture de ceux qui pensent qu'en Ethiopie, vers l'embouchure du Nil, il existoit un peuple obscur chez qui la petite vérole étoit une maladie endémique.

L'analogie de cette vérité peut être expliquée par l'histoire du mal vénérien, au sujet duquel il est constant que, dans les Isles Antilles c'est une maladie propre & endémique, comme on peut le voir dans l'Ouvrage de *Prosper Borgiautius*, intitulé *Methodus de morbo gallico*. On peut aussi recourir à *Gabriel Fallope*, qui, dans son Traité sur le même mal, ne fait pas difficulté de s'exprimer de la manière suivante. „Colomb ramena des galeres infectées du mal „vénérien. Aux Indes ce mal est doux & à peu près comme la „gale; mais, transporté dans notre Continent, il y est devenu si fé- „roce, si furieux, qu'il attaque, corrompt, détruit la tête, les yeux, „le nez, le palais, la peau, la chair, les os, les ligamens, les viscères, „tout le corps en un mot.” C'est ce qui a été mis à l'abri de toute contestation par le célèbre Historien des Indes, *Gonsalve Fernandez d'Oviedo*, qui parle comme témoin oculaire, & qui, dans son Histoire naturelle & générale des Indes, rapporte que la maladie nommée par les Espagnols *de las Buns* étoit commune à tous les naturels du pays dans ces contrées, (il avoit été Officier en chef de l'Artillerie à Hispaniola, au service de Ferdinand, Roi d'Espagne, vers l'an 1530.) & qu'elle y étoit aussi fréquente que l'est ailleurs toute autre maladie ordinaire.

L'Auteur de l'Histoire générale des Isles de S. Christophle, de la Guadalupe, &c. qui a fait un long séjour dans les Antilles, s'exprime encore plus clairement. Il dit que cette maladie honteuse que les habitans nomment *Epiam*, & qui n'est autre chose que la vérole  
duement



duement qualifiée, leur est comme héréditaire, que non seulement ils la gagnent par l'acte vénérien, mais qu'elle leur vient d'elle-même, à cause du désordre de leur régime & des mauvais alimens dont ils se nourrissent.

On excusera cette digression. Je reviens à la petite vérole de laquelle j'ai dit ou du moins j'ai conjecturé, qu'elle étoit un mal endémique dans quelque pays du monde.

L'Histoire civile & l'Histoire de la médecine concourent à fortifier cette conjecture, & à y répandre du jour, puisqu'elles attestent que ce fut seulement dans le tems où Mahomet remplissoit l'Asie & l'Afrique des guerres les plus sanglantes, & y portoit partout l'effort de ses armes victorieuses, qu'on vit pour la première fois la petite vérole se manifester. Et c'est à quoi se rapporte ce passage de Rhafes; "qu'un certain Aaron, natif d'Alexandrie, sous le regne de „Mahomet, l'an de N. S. DCXXII. a donné la description de la petite vérole."

Telles sont donc les raisons qui expliquent comment cette contagion a passé dans les contrées les plus éloignées du lieu de son origine, & s'est répandue par tout l'Univers. On voit par là pourquoi il ne s'en trouve aucune mention dans un si grand nombre de siècles antérieurs, tandis qu'à présent elle a parcouru avec la plus grande rapidité toute l'Amérique, l'Asie & l'Europe. Cela vient de ce que, dans les tems reculés, les diverses voyes de communication entre les peuples étoient beaucoup plus rares, de ce que le défaut de personnes entendues dans la Marine rendoit les navigations beaucoup plus périlleuses; enfin, de ce que les étrangers qui venoient débarquer sur une côte étoient anciennement regardés comme des ennemis & des brigands, dont on se faisoit & qu'on réduisoit en servitude. Les choses ont demeuré sur ce pied jusqu'à ce qu'on ait enfin reconnu les avantages réciproques que les hommes peuvent retirer du commerce.

Encore cela ne regardoit-il que les habitans des côtes, qui trafiquoient avec les Nations étrangères: tous ceux qui, plus avancés  
dans





dans les terres, habitoient des contrées fort éloignées de la mer, demeurèrent longtems dépourvus de toute connoissance des peuples séparés d'eux par de grandes distances. C'est ce qui fait croire à Ludolf, Historien recommandable, que les Ethiopiens, à cause de la situation de leur país, ne firent pendant longtemps aucun commerce. Tout cela met en évidence, pourquoi la petite vérole est restée inconnue pendant tant de siècles, surtout après ce que nous avons prouvé, savoir qu'elle a eu pour patrie une des contrées les plus reculées. Le celebre Médecin Anglois Mead en tire avec beaucoup de raison la conséquence, que ce n'est qu'à proportion des progrès que le commerce a faits, ou des incursions causées par les guerres, que la contagion de la petite vérole s'est répandue au long & au large.

Ces détails historiques & pleinement constatés, sur lesquels nous avons cru devoir nous étendre, suffisent pour établir qu'on a été trop loin lors qu'on a prétendu que la petite vérole tenoit à la nature de l'homme, que depuis notre premier pere elle avoit été transmise héréditairement d'une génération à l'autre, ou même qu'elle est nécessaire pour procurer à la machine du corps humain son développement & sa perfection.

Le récit suivant, qui m'est fourni par M. Mead, répandra encore du jour sur ce sujet. Un vaisseau parti de la Hollande arriva au Cap de Bonne Espérance, & y débarqua des personnes attaquées de la petite vérole, maladie qui jusqu'alors avoit été inconnue aux Hottentots. Les bonnes gens qui avoient coutume de rendre toutes sortes de service aux Matelots à leur arrivée, laverent les linges de ceux qui avoient eu ce mal, qu'ils gagnèrent par ce moyen; & la plupart en périrent. Ceux qui demeurèrent en santé se retirèrent dans des lieux fortifiés d'où ils coururent sus aux malades, & percerent de traits quiconque d'entreux vouloit franchir les retranchemens.

Il n'y a donc rien d'héréditaire dans la petite vérole, mais sa patrie est étrangère, & le droit qu'elle a d'agir sur le corps humain n'est pas un droit universel & absolu; il faut que celui où elle se manifeste y ait été disposé, c'est à dire, que ses humeurs n'aient pas





pas été propres à émousser & à détruire la vertu spécifique du venin, ou que les parties solides, après l'introduction de ce venin, n'aient pas assez de vigueur pour l'écarter & le dissiper.

Me croyez-vous, Messieurs, capable de nier ce qui est fondé sur une expérience à peu près quotidienne, & qui ne souffre qu'un très petit nombre d'exceptions, savoir que quiconque a eu une fois la petite vérole & l'a surmontée, en demeure exempt pendant tout le reste de sa vie. La chose est d'une évidence qui ne permet pas de soutenir le contraire.

Mais n'y auroit-il point une semence de la petite vérole, un miasme qui naît avec nous, & qui soit mis en action par le miasme variolique?

Je n'ai rien à répondre à cela, mais je n'en demeure pas moins ferme à nier toute conséquence qui tend à dériver la matière de la petite vérole de notre premier père, de façon qu'il nous l'ait transmise: l'assertion est insoutenable, tant que les faits ci-dessus allégués conserveront leur authenticité; & ce qui les confirme de plus en plus, c'est que, de l'aveu de tout le monde, il existe encore aujourd'hui des Nations auxquelles la petite vérole est inconnue, parce qu'elles sont privées de tout commerce & de toute liaison avec les étrangers; bien plus, qu'on voit au milieu de nous des familles qui, de mémoire d'homme, ont été préservées des atteintes de cette maladie.

J'ai admis un miasme inné dans ceux qui, ayant eu une fois la petite vérole, en demeurent exempts le reste de leur vie. Je conclus de là que le virus variolique est d'une nature si singulière & si merveilleuse, qu'il ne sauroit presque jamais entièrement être chassé d'un corps où il a séjourné, mais il reste toujours quelque particule de levain, mêlée à la semence féconde du père, & qui passe à l'enfant engendré.

Tout cela posé, la question n'est plus embarrassée d'aucune difficulté: on voit comment il peut arriver que quelques personnes aient deux fois la petite vérole, & d'où vient la fréquence de ces fausses petites véroles, auxquelles je ne me rappelle pas qu'aucun des



Ecrivains qui ont traité cette controverse, ait fait une attention suffisante.

Tous ceux donc qui n'apportent pas ce miasme avec eux au monde, ou dont les parens, & le pere en particulier, n'ont pas eu la petite vérole, ne courent-ils aucun risque à son égard? C'est une conséquence qu'on n'est pas en droit de tirer de ce qui précède, puisque tant de Nations ont été autrefois exemptes de ce mal, & que cependant elles ont été infectées par la contagion que des étrangers leur ont apportée.

Mais ce que je crois qu'on peut inférer en toute sûreté des choses exposées jusqu'ici, c'est que d'une part la contagion n'a point de droit absolu, ni de l'autre les hommes d'exemption absolue, parce que les solides & les fluides du corps humain peuvent subir une infinité de changemens différens, & qu'ainsi l'homme peut acquérir la disposition à être infecté de ce venin; de façon cependant que le miasme trouve toujours un plus difficile accès dans les personnes parfaitement saines, en qui il faut absolument que cette intégrité de constitution s'altère pour que le virus variolique s'insinue dans leurs veines. Sans cela il me paroît impossible que ce venin, dans un corps où il est inné, puisse, en vertu d'un changement dans l'économie animale, être mis en action, & y causer premièrement une petite vérole, qui ensuite, par la disposition qu'elle a à se communiquer, étend ses ravages tout à l'entour, sans qu'il soit besoin d'aller aujourd'hui rechercher ce mal en Afrique; quoiqu'il y ait de continuelles occasions qui nous ramènent de Constantinople ce dangereux ennemi.

Ceux qui sont nés avec une disposition à la petite vérole, prennent-ils le parti le plus prudent, en excitant le plutôt qu'il est possible ce mal contagieux dans leur corps, & en le poussant au dehors, afin de n'avoir plus rien à en craindre pendant le cours de leur vie? Je doute qu'on puisse mettre sur le tapis une question plus intéressante.

Mais, si quelqu'un veut se mêler de la controverse de l'inoculation qu'on agit actuellement avec tant de chaleur, ne lui convient-il pas d'approfondir auparavant la question: Si le principe de la petite vérole,



vérole, préexistent dans l'embryon & né avec lui, ne pourroit pas être réprimé, de façon à rendre l'homme entierement exempt de ce mal ?

Rien n'étant plus propre que les exemples à répandre du jour sur les vérités obscures & difficiles à comprendre, j'en produirai un, qui paroît d'abord être simplement domestique, mais dont la Chimie physique revendique l'explication. On reconnoît qu'il y a dans le blé un esprit que l'art peut en tirer ; & nous savons que, si l'on boit cette liqueur spiritueuse, elle se port au cœur, accélère le pouls & étourdit le cerveau. Cependant le froment ne sauroit produire ces effets par lui-même, en quelque quantité que l'on en mange.

Or l'esprit de froment consiste en particules huileuses phlogistiques, qui sont dissoutes dans de l'eau. Tant que ces particules sont dispersées, & enveloppées par d'autres qui ont de la ténacité, elles n'ont aucune vertu active, ou du moins on ne l'apperçoit pas, & on les croiroit dans une parfaite inertie. Mais, dès que l'art a rompu les liens qui les retenoient, leur activité se déploie, chaque atome jouissant, pour ainsi dire, de sa liberté, se réunit à son semblable ; leur force qui dans l'état de dispersion ne pouvoit rien, ou presque rien, prend de tels accroissemens que son efficace sur le corps humain ne trouve point d'obstacle capable de lui résister ; en sorte que, si vous rassemblez & réunissez encore plus intimement ces particules, & que par de nouvelles opérations vous les réduisiez à un moindre espace, il en résulte un produit d'une force étonnante, & dont l'éguillon de la chaleur augmente encore beaucoup la vertu.

Il y a donc des corps, qui, après avoir été dégagés ou réunis, ont une très grande puissance, dont ils étoient entierement privés, tant qu'ils se trouvoient enchaînés ou dispersés ; ou même, qui, dans leur nouvel état, ne déploient leur action qu'après y avoir été excités.

Revenons donc à demander, si l'on agit avec plus de prudence & d'une manière plus salutaire aux hommes, en maintenant la tranquillité du levain contagieux de la petite vérole qui naît avec nous, & en préservant ceux qui craignent ce mal de toute insinuation dans le



corps de ce miasme propre à allumer l'étincelle cachée sous la cendre? Convient-il de dégager une matiere qui n'a aucune force tant qu'elle demeure liée, de lui permettre une dispersion qui la met en état de porter partout son action, & d'attaquer à force ouverte les solides & les fluides d'un corps qui n'est pas toujours propre à lui résister?

J'en appelle à votre équitable décision, Messieurs, & je vous prie de résoudre vous mêmes ce probleme.

Je proposerai ici l'exemple des Hottentots, n'en soyez pas surpris; j'approuverai le parti qu'ils prenoient de chasser à coups de traits ceux qui, étant attaqués de la petite vérole, s'approchoient des gens en santé.

Si l'on prenoit contre la petite vérole les mêmes précautions qui sont usitées contre la peste, pourquoi ne viendrait on pas à bout d'en rendre les Nations exemptes aujourd'hui, comme elles l'ont été autrefois?

C'est malgré moi, mais sans la moindre ombre de partialité, que je suis obligé de rejeter en bonne partie les efforts contagieux de la petite vérole, tant à l'égard de l'étendue que de la rapidité de sa propagation, sur les Médecins eux-mêmes, qui, allant comme ils le font de rue en rue & de maison en maison, remplissent leurs habits d'un venin qu'ils promènent avec eux, qui même touchent imprudemment des personnes qui n'ont pas encore eu la petite vérole avec des mains dont ils viennent de toucher le poulx ou les pustules de ceux qui en sont attaqués.

On ne sauroit donner trop d'éloges aux anciennes ordonnances des Magistrats qui établissoient des Médecins à part pour les maladies contagieuses de toute espece, comme on le fait encore aujourd'hui, mais dans le seul cas de la peste.

Que les partisans de l'inoculation me permettent de dire ici librement ma pensée; ils défendent l'utilité, la nécessité même de cette  
pra-



pratique; & moi, d'après toutes les raisons que je viens d'alléguer, je n'y vois qu'un moyen de rendre tout à fait domestique un mal étranger, & d'amener les choses au point qu'il n'y aura désormais aucun individu qui ne naisse avec le levain de la petite vérole.

Je vous ai exposé la patrie, la génération, la nature du miasme varioleux, qui a tous les caractères d'un vrai venin autant que toute autre contagion pestilentielle; en sorte que, subdivisé des milliers redoublés de fois, il demeure toujours nuisible, toujours prêt à embraser le sang, pour peu que l'occasion s'en présente.

Je me suis plus d'une fois extrêmement étonné, que de nos jours on ait entièrement perdu de vue les traces si sûres & marquées avec tant de sagacité de ces Médecins qui se sont anciennement rendus célèbres dans leur art; quoique ce soit à ces Médecins mêmes que nous sommes redevables des détails les plus complets & les plus lumineux sur l'histoire de la petite vérole.

Je n'ai pas pu comprendre comment il étoit possible que les Médecins des siècles postérieurs à Rhafes & Avicenne eussent poussé la négligence jusqu'à ne pas daigner feuilleter les Ouvrages où ils ont traité de la petite vérole, l'un de ces Auteurs l'ayant décrite de la manière la plus précise il y a onze siècles, en y joignant une méthode à laquelle il seroit bien difficile d'en substituer aujourd'hui une plus prudente; vu que, depuis le tems de ces illustres personnages, l'École des Médecins a débité comme vraies bien des choses obscures & confuses, tant à l'égard de la théorie que de la pratique.

J'ai lu avec un très grand plaisir ce qu'a écrit là dessus le Médecin Arabe que j'ai déjà nommé, Rhafes; & il me paroît surtout estimable en ce que, dès ce tems-là, il a déjà pensé aux moyens de préserver de la petite vérole, lorsqu'elle regne, ceux qui la craignent, ou dans le sang desquels le miasme s'est déjà introduit: & le succès justifioit pour l'ordinaire ses soins. Il se servoit principalement des acides végétaux, comme du jus d'orange, de citron, de ribette, d'épinevine, de mûre, de laitue, d'estragon, d'eau omphacine, qu'il rédui-





soit en syrop en y mêlant du sucre, & où il jettoit une petite portion de camphre, par où il réussissoit à rendre la petite vérole bénigne & peu abondante.

Les mêmes préservatifs ont été adoptés il y a environ quarante ans par les Médecins Waldschmid & Dolaeus, d'une maniere qui n'a pas été tout à fait infructueuse, quoique le succès n'ait pas répondu constamment à leur attente. Le célèbre Rosen a enseigné dans les Mémoires de l'Académie Royale de Suede, comment l'on peut prévenir la petite vérole confluente, soit en la détournant tout à fait, soit en la rendant tout au moins plus bénigne, par un remede composé de mercure doux, de résine de guayac, d'aloës & de camphre. Il assure que cette méthode lui a réussi, dans les cas où la petite vérole regnoit au voisinage, sans que l'on pût éviter le commerce avec ceux qui en étoient attaqués.

Je suis fermement dans l'idée que, si les Médecins s'étoient plus appliqués à combattre sans relâche les principes de ce mal, & qu'ils eussent pris des précautions plus prudentes dans l'administration des remedes, nous ne penserions pas aujourd'hui à traiter la question de l'inoculation, sur laquelle on a tant disputé que les argumens pour & contre paroissent être épuisés; de sorte que je ferois scrupule d'entrer dans de nouveaux détails à cet égard en présence d'Auditeurs aussi éclairés, à moins que je ne pûsse les entraîner dans mon sentiment par quelque raison qui n'ait pas encore été proposée.

Laisant donc à l'écart tout ce que pouvez avoir lu jusqu'à présent sur ce sujet dans les Ecrits des deux partis opposés, je crois seulement ne pouvoir me dispenser d'observer qu'il y a quelques points avoués & reconnus de part & d'autre: ce qui me paroît les mettre hors de toute contestation.

Le premier, c'est que l'inoculation ne met point à l'abri de la petite vérole confluente.

Le second, qu'on ne sauroit promettre certainement ni prévoir sûrement que les inoculés en réchaperont.

En





En troisieme lieu, que l'expérience dépose, sans qu'on puisse éluder son témoignage, qu'au bout de plusieurs années après l'inoculation on a vu quelquefois survenir une petite vérole naturelle & maligne, prise par voye de contagion, & funeste au malade, quoiqu'il eût été inoculé dans toutes les regles de l'art par quelqu'un de ceux qui y sont le plus versés.

Enfin, qu'assez souvent de mauvais ulceres se forment dans l'endroit du corps où s'est faite l'inoculation; & si vous voulez un garant de ce fait, je vous en citerai un des plus dignes de foi, & par son savoir, & parce qu'il est partisan de l'inoculation, M. Mead, déjà plus d'une fois nommé dans ce discours.

Je ne me rappelle pas que les principaux tenans de la dispute sur l'inoculation ayent assez soigneusement observé, que le danger de leur pratique regarde principalement les corps les plus robustes.

Je crois devoir rapporter ici, comme digne d'être remarqué, ce que nous apprend l'habile M. Mary; c'est qu'à Boston, en 1752, il y eut 1974 personnes en santé qui se résolurent volontairement à être inoculées, & qu'il n'en mourut que 24. Mais 1509 ne purent être persuadés à se soumettre à cette opération, pour laquelle leur répugnance étoit trop forte: ainsi, abandonnés au cours de la Nature, il en périt 452.

Dans toute expérience, & surtout là où il s'agit de la santé & de la vie des Citoyens, il faut une parfaite candeur, une entière impartialité. Je ne cherche point à faire naître des soupçons défavantageux; mais je me crois obligé d'avertir que les hommes naturellement timides appartiennent à la classe des corps foibles; & l'on sait combien les maladies contagieuses sont à craindre pour des personnes ainsi constituées, qui ne peuvent gueres, lorsqu'il regne quelque épidémie, pourvoir à leur salut, que par la fuite. Quand on hazarde des expériences sur de pareils corps, on ne peut s'en promettre qu'une issue tragique.

Lorsque la petite vérole survient naturellement à de telles personnes, la piété les soutient, leur ame est fortifiée par les idées de la sagesse



gesse & de la bonté du Créateur, qui nous imposent l'obligation de recevoir avec tranquillité les diverses épreuves dispensées par la Providence, & d'adorer jusqu'au dernier soupir l'Arbitre supreme de notre vie & de notre mort.

On répondra sans doute, qu'il n'y a qu'à ne pas inoculer les sujets délicats, cacochymes, infirmes, tous ceux enfin qui ne paroissent pas avoir les forces suffisantes du corps ou de l'esprit. Mais le nombre de ces sujets est beaucoup plus grand qu'on ne se l'imagine; il fait la plus grande partie des hommes, dont la crainte s'empare, dès qu'on les abandonne à eux-mêmes. Et pour les enfans, le plus grand nombre est aussi de ceux qui ont un corps foible.

Donc, en renversant la regle, c'est aux personnes en santé qu'il faut ici un Médecin. Or les gens sains n'ont pas besoin de Médecin; la nature est leur sauvegarde.

Je ne dois pas non plus passer sous silence ce que ceux qui pratiquent la Médecine reconnoîtront d'eux-mêmes, c'est que dans la petite vérole naturelle, à peine périt-il quelqu'un, à moins que ce ne soit par la faute ou par celle de son Médecin. Les malades sont souvent si capricieux qu'ils ne veulent rien faire qu'à leur tête, & négligent les directions qu'on leur présente, ou ne s'y soumettent que lorsqu'il est trop tard. Souvent aussi la Médecine est pratiquée par des Charlatans, qui sont de vrais assassins.

Mais ce qui est le plus fréquent, c'est que la petite vérole endémique se trouve accompagnée de quelque fièvre maligne, pétéchiale, pourprée. C'est à ceux qui dressent des registres mortuaires pour la postérité à saisir ces distinctions, & à ne pas jeter dans la masse de ceux que la petite vérole emporte les victimes de ces maladies où le venin domine, ou ceux qu'une toux convulsive suffoque.

L'Histoire confirme ce que dépose une expérience journalière, c'est que la petite vérole épidémique ne fait pas des ravages continuels, mais qu'il se passe quelquefois cinq, dix, & jusqu'à quinze lustres, sans qu'elle se manifeste, ou même qu'on ne la verroit jamais,



mais, si quelque étranger n'apportoit du dehors ce funeste présent. Dites-moi après cela, je vous en prie, si une Ville a beaucoup d'obligation à un de ses Citoyens, lorsque c'est lui-même qui fait venir d'ailleurs ce virus variolique, qui par son art l'introduit dans des corps sains, & qui excite par là l'épidémie? Les Inoculateurs ont-ils alors assez de tems pour exercer leur pratique sur tous les individus avec autant de vitesse qu'en a la petite vérole à gagner & à se communiquer de proche en proche par toute la Ville. Il me semble que de pareils Médecins sont trop officieux.

Une des raisons que les défenseurs de l'inoculation alleguent avec le plus de confiance, c'est qu'on a le tems de préparer le corps des inoculés avant qu'ils soutiennent le mal. Je veux bien accorder que cela réussit à l'égard de quelques uns, pourvu qu'ils suivent ponctuellement tout ce qu'on leur ordonne, & que le tems de la préparation ne soit pas trop court. Mais il s'en faut bien que le succès réponde toujours à l'attente: & il ne faut pas s'en étonner, puisque le mélange des humeurs répond à la structure des solides, & qu'il s'agit quelquefois de changer le tempérament au point de faire acquérir aux humeurs la disposition qui les rend propres à subjuguier le venin, après qu'il y a été introduit.

Que si l'affertion est vraie, qu'on peut ainsi changer le corps & préparer les humeurs, de façon que le venin soit peu nuisible, & que, vaincu par le chaogement arrivé dans le mélange des humeurs, il demeure sans force; il en résultera que ce dont j'ai fait mention ci-dessus s'accorde avec la Nature, savoir qu'en employant un régime & des remedes convenables, suivant la pratique des plus anciens Médecins, on peut prévenir la petite vérole, émousser la force de son venin, & même la détruire; méthode qui me paroît bien plus amie de la Nature & plus favorable au genre humain que l'inoculation, puisque c'est la seule voye ouverte pour écarter & à la fin extirper entierement cette maladie pestilentielle: au lieu qu'au contraire, tant qu'on ne cessera d'introduire le venin dans les corps,



ce fera l'art de rendre la maladie perpétuelle & universelle. Il y a pourtant encore de nos jours des familles sur qui la petite vérole n'a eu aucune prise.

J'ai nié ci-dessus l'existence de la petite vérole dans tous les âges du monde; mais en même tems j'ai reconnu que le miasme de ce mal est apporté au monde par ceux dont les parens en ont été atteints; de sorte qu'il arrive un développement proprement dit, lorsque la petite vérole n'étant pas communiquée par une contagion extérieure, vient de ce qu'on a excité le levain qui séjournoit dans le corps, & qu'on lui a prêté les forces nécessaires pour agir.

L'histoire de cette maladie enseigne, qu'on ne la prend pas toutes les fois qu'on a le commerce, même le plus intime, avec ceux qui l'ont, couchât-on avec eux dans un seul lit. Ce phénomène indique qu'il y a un certain espace de tems requis pour que les semences de la matiere varioluse parviennent à maturité.

Si cela est vrai, entreprendre de donner la petite vérole avant ce tems, c'est à mon avis heurter les loix de la Nature, qui nous défend de hâter les opérations pour la perfection desquelles il faut un certain période.


Je crains donc que si, dans l'inoculation, on sollicite la matiere varioluse renfermée dans le corps, lorsqu'elle est encore dans une inertie qui ne lui permet pas d'agir, ou qui ne le lui permet qu'imparfaitement, il n'en reste une partie en dépôt, qui, venant à mûrir tôt ou tard, produira quelque métastase des plus malheureuses, en se jetant sur quelque partie noble, ou en causant une foiblesse générale au système des nerfs, d'où naîtront des infirmités qui dureront autant que la vie. C'est du moins ce qui arrive aux plantes, quand on leur fait produire des fleurs & des fruits contre l'ordre de la nature, au milieu de l'hiver; les succès de cet art sont inmanquablement nuisibles à l'arbre, à la plante, ou à l'oignon, qui périssent plutôt.

Vous



Vous voyez, Messieurs, que je ne penche pas pour le parti de ceux qui croient l'inoculation utile & nécessaire. Mais d'un autre côté je ne crois leur faire aucun tort, puisque j'ai exactement suivi les routes tracées par la raison & par l'expérience, & que je me suis exprimé avec toute la sincérité qui convient à un honnête homme. C'est par un effet de cette sincérité que j'approuve & que je recommande l'inoculation dans les familles qui ont le malheur de voir presque tous ceux qui y naissent immolés aux fureurs de ce fléau. Qu'on inocule de pareils sujets, j'y consens, pourvu que d'habiles Médecins aient employé le tems nécessaire à corriger les humeurs, surtout en leur opposant les antidotes ci-dessus indiqués; peut-être aussi dans le cas où celui qui doit être inoculé a changé de climat en choisissant un plus tempéré.

Il ne me reste plus qu'à souhaiter que ceux qui sont entièrement décidés pour l'inoculation se souviennent que le bien de la Patrie & l'avantage du genre humain consistent ici à diminuer de plus en plus le nombre de ceux à qui la petite vérole artificielle coûte la vie.





# NOUVELLES EXPÉRIENCES PHYSIQUES

S U R

L'ACCROISSEMENT ET LA DIMINUTION DU  
MOUVEMENT EXTÉRIEUR, PAR LEQUEL LES PLANTES S'É-  
CARTENT DE LEUR DIRECTION PERPENDICULAIRE, SUI-  
VANT LA DIVERSE TEMPÉRATURE DE L'AIR.

PAR M. GLEDITSCH.

*Traduit de l'Allemand.*

**L**es Plantes appartiennent à la classe des corps vivans dans la Nature. Elles ont leur structure exactement régulière, tout comme les animaux, avec lesquels elles ont encore beaucoup de ressemblance par rapport à leur génération. Une des principales propriétés, celle que nous nommons l'irritabilité, leur est pareillement commune; mais pour l'autre, savoir la sensibilité, elle demeurera toujours propre aux animaux. Peut-être que l'irritabilité, qui probablement est beaucoup plus forte dans les plantes que dans les animaux, leur tient lieu de la sensibilité. Cette irritabilité paroît avoir été donnée aux plantes par le Maître supreme de la Nature, principalement & proprement afin qu'elle fût en eux le principe de tous les mouvemens qu'elles sont en état d'exécuter, & qu'elles exécutent par son moyen dans leur intérieur.

Les Plantes ont deux especes de mouvement, savoir un mouvement *intérieur*, qui entr'autres choses, outre la préparation & la séparation de divers sucs, est destiné à procurer l'accroissement; & un mouvement *extérieur*, par lequel elles poussent d'abord leur tige naissante





sante droit en haut, ou en général cherchent à jouir de l'air libre, vers lequel elles se portent constamment; mais, si on les détourne pendant un tems de cette direction, elles ne laissent pas de la reprendre infailliblement dès que les obstacles cessent. Toutes les circonstances qui viennent d'être indiquées, sont à la vérité en partie connues, & en partie suffisamment visibles; mais il se peut qu'on n'y fasse pas assez d'attention par cela même qu'on les voit trop souvent. Ainsi, quoiqu'elles puissent passer pour être assez manifestes par elles-mêmes, cependant les causes qui déterminent leur action n'ont pas encore été mises à l'abri de tout doute & de toute contestation. Il y a toute apparence que les mouvemens extérieurs sont dans une liaison très étroite avec les mouvemens intérieurs, en sorte que l'une de ces especes, exception faite des autres causes qui concourent, est la cause de ce qui arrive à l'autre, dans une relation réciproque.

Les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris contiennent divers morceaux intéressans sur le mouvement extérieur des Plantes, & sur la direction naturelle de leur tige. On peut lire avec fruit ce que M. Dodart a inséré là dessus dans les Mémoires de 1700, Mrs. Astruc & de la Hire dans ceux de 1708, & M. Parent dans ceux de 1710. Chacun de ces Académiciens a rendu raison des mouvemens extérieurs des Plantes d'après ses expériences & conformément à sa théorie. On peut joindre à ces Ecrits celui de M. le Docteur Bose, qui a paru à Leipsig en 1728, & qui traite *du mouvement des plantes qui ressemble au sentiment*.

Depuis ce tems-là j'ai eu occasion de faire des observations nombreuses & particulieres sur les mouvemens extérieurs des plantes, étant obligé de planter de ma propre main & de cultiver la plus grande partie de nos plantes connues, tant étrangères que du pays, qui existent depuis un tems considérable dans les Jardins de notre Patrie. Divers cas singuliers qui se sont offerts m'ont mis plus au fait de ce qui concerne particulièrement la direction de la tige, & les exceptions qu'elle



qu'elle souffre. On conçoit aisément que ces événemens ne pouvoient être rares dans de jeunes bois taillis & dans des buissons, aussi bien que dans diverses grandes serres, parce que dans ces lieux l'accès libre de l'air extérieur & sa pression sur les plantes par l'alternative des saisons & d'autres circonstances, sont souvent arrêtés ou troublés. Il étoit impossible que, parmi tout cela, il ne se présentât de tems en tems des phénomènes extraordinaires, propres à reveiller l'attention d'un Curieux de la Nature.

Je n'ai pas dessein de faire un récit circonstancié de tout cela, encore moins de répéter des choses qui ayent déjà été dites par d'autres: tout ce que je ferai entrer dans ce Mémoire consistera en *Observations nouvelles sur l'accroissement & la diminution du mouvement extérieur des plantes; & je proposerai ces observations d'une manière relative à la diverse température des saisons, qui fait varier leur direction naturellement perpendiculaire à l'horizon.* Ce que je dirai, sera fondé sur un petit nombre d'Expériences tout à fait simples.

Ce qui me fit naître l'idée de ces Expériences, fut un passage de la *Statique des Végétaux* du célèbre Hales que je lisois dans le même tems que je considérois souvent un jeune tilleul de notre Parc qui étoit dans son plein accroissement, & où je découvris en 1760 & 1761 un cas tout à fait agréable, quoiqu'il fût commun, & qui dans son espèce me parut suffisamment digne d'attention. Je visitai donc soigneusement ce tilleul, les deux années susdites, depuis le mois d'Avril jusqu'à la mi-Juillet; pour observer les variations successives qui eurent lieu dans la direction de son sommet.

Ce jeune arbre parfaitement disposé à croître avoit été placé, lorsqu'on l'avoit transplanté, sous une couple de sapins fort épais, dont les branches s'embrassoient. Dans ce tems-là on n'avoit pas fait attention à ce défaut de position, ni pensé à le redresser. Deux autres tilleuls, qui se trouvoient à ses côtés, ne croissoient que trop lentement par le défaut de leur sol, & celui du milieu étoit le seul qui parvint après quelques difficultés à son accomplissement. Car le libre accès



accès de l'air, de la rosée & des rayons du Soleil, au moins en grande partie, étoit intercepté après l'allongement de son sommet aussi bien que de celui des deux autres; & comme outre cela son jet étoit beaucoup plus long, plus fort, & plus droit que celui des autres, il ne tarda pas à s'élever bientôt sous les branches épaisses des sapins jusqu'au point où les branches de ces arbres pouvoient se communiquer réciproquement. C'étoit une suite nécessaire des inconvéniens causés par l'alternative des exhalaisons & résorptions des branches des tilleuls & des sapins, aussi bien que par quelques mouvemens dans ces deux sortes d'atmosphère.

Cette circonstance capitale produisit ici, à cause du défaut d'égalité dans la pression de l'air, son effet sur le sommet du jeune tilleul qui croissoit avec force, & qui avoit comme à l'ordinaire une direction perpendiculaire. Les tendres pointes pleines de suc, & particulièrement celles du milieu du jet qui s'élevoit fort au dessus du reste, commencerent à s'écarter peu à peu de leur direction naturelle droite, & à se pencher vers l'horizon. En peu de tems cette déclinaison fut si sensible que les pointes prirent une situation qui tenoit le milieu entre la ligne horizontale & la ligne perpendiculaire.

A la fin cette situation devint tout à fait horizontale, de sorte que, suivant la mesure prise avec l'Instrument dont je me servois dans ces expériences, elle faisoit avec la ligne perpendiculaire un angle d'environ 90 degrés. Cette inflexion causa dans la couronne du tilleul, qui étoit d'ailleurs bien formée, une irrégularité, que la multitude des rejettons qui poussèrent à côté augmenta considérablement. La situation contraire à la nature que ce sommet avoit prise ne souffrit plus de nouveaux changemens, parce que les branches avoient acquis trop de consistance & de roideur, pour qu'elles pussent se replier de nouveau; elles ne pouvoient que chercher à regagner l'air libre.

Enfin un vent violent de tempête qui fut de durée, brisa ces branches inférieures des sapins, qui avoient entreteenu jusqu'alors l'accroissement du tilleul contraire à la nature; & par là sa couronne  
ayant



ayant recouvré l'air tout à coup, put croître en liberté. Aussitôt toutes les branches qui avoient été courbées poussèrent leurs tendres rejets de côté, de façon qu'ils prirent leur direction vers le haut, comme avoient déjà fait toutes les autres pointes extérieures. Après le second jet, les jeunes branches reprirent leur direction perpendiculaire naturelle; & un nouveau sommet qui s'arrangea peu à peu, fit disparaître l'irrégularité du précédent.

Si les circonstances que je viens de rapporter paroissent trop connues & communes, & qu'on ne veuille les employer à aucun autre usage, on pourra sans doute m'objecter que tout cela s'en alloit sans dire, & qu'on devoit s'attendre à toute cette suite d'effets, sans se donner la peine d'y faire une attention particulière. Mais c'est ce que j'ai reconnu moi-même dès l'entrée, savoir qu'on rencontroit à tout moment les mêmes choses à observer dans les bois, dans les jardins, & spécialement dans toutes les hayes d'arbres ou de buissons, dans toutes les plantes sauvages ou cultivées, lorsqu'elles prenoient leur accroissement; tout cela, je le répète encore, ne sauroit être plus fréquent & plus connu: cependant il n'en résulte pas qu'on ne doive en faire aucun cas & regarder toutes ces choses comme parfaitement indifférentes: le contraire va être prouvé dans la suite, par l'exposé des avantages ou des dommages qui en naissent.

Que pour la plupart des hommes ces objets soyent indifférens, à la bonne heure: il s'en faut bien qu'ils ne paroissent tels à plusieurs autres. Qu'on fasse seulement réflexion, que par rapport aux choses qui sont simplement fondées sur l'expérience commune, tant dans l'oéconomie en général, qu'en particulier dans la manière d'entretenir des bois sauvages, aussi bien que dans ce qu'on nomme Jardins artificiels & de plaisance, il se présente certains cas dont personne ne sauroit contester l'importance, & dans lesquels on doit préserver les plantes d'une direction & d'un accroissement contraires à la Nature: & c'est pour cela qu'on prend en effet des arrangements tout particuliers. Une chose encore bien digne de remarque, c'est qu'il  
fur-



survient ensuite des cas qui sont directement opposés aux premiers, dans lesquels les déviations qui écartent les plantes de leur direction & de leur accroissement naturel, doivent être soigneusement entretenues, dans certaines vues, & à cause d'avantages particuliers & importans qui en résultent; savoir, lorsque de propos délibéré on cherche à élever des arbres auxquels on fait prendre diverses courbures: & l'on est pareillement accoutumé à certains arrangements relatifs à cet objet. Ceux donc à qui l'inspection au premier de ces égards & l'accomplissement au second sont confiés, donneront assurément tous leurs soins & toute leur attention à trouver les moyens de parvenir à leur but: & alors les circonstances que nous avons indiquées, ne leur paroîtront plus indifférentes.

Les mêmes circonstances peuvent aussi nous causer bien de la fatigue & du déplaisir par rapport à l'entretien des plantes étrangères dans les serres où elles passent l'hiver, surtout quand l'imprudence accoutumée de nos Jardiniers & leur négligence s'y joignent. Ces gens-là sont pour la plupart des mercenaires qui se croient à l'abri de tout reproche quand ils tiennent les choses sur le pied où elles leur ont été remises, sans se mettre en peine de voir & d'observer, comme ils devroient le faire. Dès-lors ils cessent d'être véritablement utiles, en contribuant aux progrès de la Physique & de l'Oeconomie, comme il leur seroit fort aisé.

Les plantes qu'on renferme dans des serres, y sont mises en général dans toutes sortes de vues. A l'égard de la plus grande partie on se propose seulement de les mettre à l'abri de la rigueur ordinaire de l'hiver dans nos contrées froides, sans avoir outre cela le dessein de les faire croître & fleurir dans quelque saison extraordinaire de l'année, différente de celle qui leur est naturelle dans leur patrie. Une autre partie des Plantes est destinée chez nous à être entretenue dans un accroissement constant, & à porter des fleurs & des fruits dans une saison qui lui est à la vérité naturelle dans son pays, mais qui ne lui permettroit pas de le faire ici dans le même tems en plein air, ou de moins ce ne seroit qu'avec





qu'avec peine & fort rarement. Ajoutez encore à cela une espece de plantes cultivées, qu'on nomme précoces, & qui entrent dans des serres particulieres, afin que leurs fleurs & leurs fruits s'y développent, un, deux, ou trois mois plutôt que cela n'arriveroit sans cela dans notre climat.

Mais la différence de ces plantes, comme on l'a remarqué, n'étant pas toujours bien connue & bien appliquée, il faut que l'ignorance & la négligence qui regnent dans nos Jardins causent bien des dommages qui ont coutume de se manifester avec un très grand désordre, surtout dans la plupart des Jardins Botaniques. Les mouvemens extérieurs sont sensibles dans les trois especes de plantes que nous avons indiquées, mais premierement & beaucoup plus promptement dans les deux dernières. Car se trouvant, lorsqu'elles sont dans les serres, renfermées les unes près des autres, dans un espace fort étroit, où l'air extérieur n'a pas un libre accès de toutes parts, & y continuant leur accroissement sans interruption, & par conséquent poussant sans cesse de jeunes rejettons, on peut les observer très exactement dans cet état; parce qu'elles cherchent toujours l'air libre, & que plusieurs d'entr'elles, ou plutôt toutes, se portent fort sensiblement vers le côté par lequel l'air pénètre le plus abondamment, de la même maniere que si elles étoient tirées dans cette direction.

Les variations alternatives de ce mouvement se manifestent dans leurs jeunes tiges, & dans leurs pointes, aussi longtems qu'elles sont molles & flexibles, & que leur accroissement dure. Cela se regle sur les degrés de froid & de chaud de l'air qui regne dans les serres, de même que sur la situation particuliere de chaque plante, & sur les changemens de position. On observe quelquefois que les tiges, le matin ou le soir, sont tantôt perpendiculaires, tantôt obliques, que quelquefois elles s'étendent horizontalement, ou même qu'elles se replient en un demi-cercle, ou encore plus profondément. Quelques unes perdent leur direction naturelle fort vite & le plus souvent; d'autres au contraire lentement & difficilement. Ces variations





tions se rapportent aux mouvemens des suc, & quelquefois on les observe au bout d'une, deux, trois ou quatre heures, tandis que dans d'autres tems il en faut douze, seize, vingt-quatre, ou quarante-huit; sans que d'ailleurs le reste de l'accroissement des plantes soit troublé en rien par là, mais il fait ses progrès à tous égards, & les tiges s'allongent en même tems qu'elles prennent leur direction. Mais lorsque, pendant cet accroissement, le mouvement se porte constamment vers un côté, sans aucune variation, & que les fibres de la tige viennent finalement à se roidir & à se durcir, ces parties ne recouvrent alors en général leur direction naturelle perpendiculaire, que fort lentement, fort difficilement, ou même à la fin point du tout: il n'y a plus que les pointes extérieures & les tendres rejettons qui soyent capables de prendre cette position, aussi longtems qu'ils peuvent céder, & suivre la direction des suc.

On voit encore les mêmes circonstances dans les jeunes plantes, & même dans leurs parties, lorsqu'on les a séparées de leurs racines, & qu'ensuite ou elles demeurent en plein air dans les lieux humides, ou bien on les met dans l'eau & leur fait passer quelques jours dans les chambres. Cela m'est arrivé plus souvent que cela n'auroit dû, à mon grand regret & dommage, lorsque, faute de tems, j'ai été obligé de garder dans l'eau pendant quelques jours des plantes étrangères toutes coupées, avant que de pouvoir les insérer dans mon *Herbarium* pour s'y dessécher. Je les tenois ordinairement dans des plats fort bas à la cave, ou dans le poêle, & j'observois souvent qu'au bout de 16, 20 à 30 heures, leur pointes s'étoient pour la plupart redressées, & avoient pris une situation perpendiculaire.

Un autre cas inopiné m'a conduit à un des phénomènes les plus agréables. Je devois envoyer à un ami deux oignons de *Cot-chicum* ordinaire, dans le tems où les queues des fleurs toutes nues commencent à paroître. Sans avoir dessein de faire aucune observation, je mis les oignons le soir sur le bord de ma table à écrire dans mon Cabinet, où, dans l'espace de douze heures, les queues susdites



des fleurs qui avoient déjà poussé de la longueur de quatre pouces, non seulement s'allongerent, mais se porterent perpendiculairement en haut. En y appliquant mon Transporteur dont les divisions sont faites pour ces sortes d'expériences, cette direction de la ligne horizontale vers la ligne perpendiculaire faisoit un angle de 80 degrés.

A' cause de cette courbure des queues des fleurs, je retournai les oignons de haut en bas, de façon qu'ils reçussent une direction entierement opposée à la précédente. Après quatorze heures je trouvai les queues horizontales & paralleles à la table; j'employai tout de suite le Transporteur, pour observer le tems & le degré, que je me proposois de remarquer par rapport au mouvement qui se portoit à présent vers la perpendiculaire. Après quinze heures, la queue s'étoit allongée d'un pouce & demi, les fleurs étoient ouvertes & se tenoient perpendiculairement. Je réitérai ce dont j'ai déjà fait mention, sans aucun changement; mais, comme il y avoit déjà trop longtems que les oignons se trouvoient hors de terre, & que l'extérieur s'étoit considérablement désséché, le mouvement des queues devint toujours plus lent, & à la fin presque insensible: les fleurs demeurèrent fermées, & les queues ne s'allongerent pas d'avantage. Mais, après que j'eus mis les oignons pendant quelques heures dans l'eau, ils poussèrent de nouvelles fleurs, & je pus répéter les expériences, qui se soutinrent avec beaucoup de vivacité, tant que les queues continuent à croître.

Le 27 Juin de cette année, j'eus une plante de *Sedum arborescens*, espece fort connue, tendre & pleine de suc, dont la tige prenoit son accroissement pour fleurir. Cette tige avoit déjà un empan de longueur lorsque je portai la plante dans mon poële; & le 30 de ce mois elle avoit crû de deux pouces. Au commencement elle étoit toute droite, & se tenoit perpendiculaire à la racine; ce fut dans cet état que je la posai sur une fenêtre, où cette tige, dans un espace de douze, seize à vingt-quatre heures, se courba pour la première fois; & le sommet tendre qui s'élevoit au dessus, se tourna comme de coutume



rume vers la fenêtre, mais aussi obliquement en haut en même tems. Je retournai cette tige de façon que son sommet fût à présent du côté où il s'élevoit à l'opposite de la fenêtre, & regardât par embas vers la terre; après quoi je réitérai toutes les vint-quatre heures ce changement alternatif. Pendant cet espace de tems, la tige qui étoit encore tendre & croissoit avec force, prenoit à chaque fois une situation directement opposée à la précédente, de sorte que le sommet recouvroit son ancienne position, mais en même tems devenoit à chaque fois un peu plus long.

Cet allongement avoit déjà été porté le 7 Juillet à deux pouces au delà d'un pied; depuis lequel tems la tige avec son sommet tendre & qui étoit au point de se former pleinement, s'éleva encore beaucoup davantage, & prit une direction qui étoit la plus voisine de la perpendiculaire; de façon qu'il n'y avoit que la moitié supérieure qui fut encore un peu oblique, tandis que la partie inférieure, à cause que ces fibres étoient devenues roides & coriaces, demeura dans une position horizontale.

Le 8 Juillet, à midi, je plaçai cette plante de manière qu'elle étoit obligée de se redresser tout à fait: cela n'arriva pas pourtant pleinement, mais seulement jusques vers les pointes extérieures, qui environ à un pouce de longueur conserverent la courbure par laquelle elles se replioient droit vers en haut. Dans cet état je liai un fil à la racine de la plante, afin de pouvoir la suspendre renversée. Cela se fit de façon que la tige avec toutes ses pointes étoit dirigée droit vers la terre, & elle pendoit à deux pieds & demi de profondeur dans le couvercle tout à fait libre, à une distance vers le midi de la fenêtre, qui pouvoit aller à un pied & demi. La pointe la plus éminente encore recourbée étoit pendant ce tems-là du côté du septentrion. Le 9 Juillet, à dix heures du soir, cette pointe s'étoit déjà portée un peu à l'Orient; le 10, cette inflexion étoit encore plus sensible. Le 11 vers midi, elle tenoit le milieu entre l'Orient & le Midi; & alors la tige suspendue s'étoit déjà détournée suivant toute la moitié de sa longueur

H 3



guent de la ligne perpendiculaire droit vers le midi, & tant soit peu courbée. Ce changement étoit accompagné d'une espèce de contournement qui pouvoit être observé d'une manière fort distincte.

Par rapport aux feuilles dont la tige est garnie, & qui y tiennent sans queue particulière, en forme d'écailles, dans les commencemens elles avoient presque toujours une direction conforme à celle de la tige, & l'embrassoient, pour ainsi dire, comme cela est connu; mais quand elles s'ouvrent avec l'accroissement de la tige, elles s'en écartent & prennent une situation qui est aussi suffisamment connue. Mais au contraire, lorsque la plante eût été retournée & suspendue perpendiculairement, les feuilles se sont insensiblement repliées en arrière ou vers le haut, de façon que leurs pointes, le 10 Juillet à midi, avoient remonté fort au dessus de leur base. Seulement les feuilles d'embas, devenues roides & coriaces, s'écartoient tellement de la tige, qu'elles faisoient avec elle un angle assez considérable, sans se recourber vers le haut; celles d'au dessus jusques vers la moitié se recourboient un peu; depuis la moitié de la tige au contraire, là où elle se contournoit avec le plus de force, la courbure des feuilles devenoit toujours plus sensible, jusqu'à ce que vers le sommet elle alloit en décroissant d'une manière conforme à celle que je viens d'indiquer par rapport à la partie inférieure de la tige.

Le 14 Juillet, je considérai fort attentivement la plante dans ces circonstances, & je vis que non seulement la tige s'étoit encore beaucoup plus tournée du côté du midi, mais en même tems les pointes des branches & les queues qui formoient le sommet, s'étoient beaucoup plus étendues & séparées les unes des autres, & leurs boutons de fleurs avoit la grosseur dans laquelle ils sont en état de s'ouvrir. La courbure des pointes extérieures les plus déliées vers le midi s'étoit allongée de deux pouces, & elles se dirigeoient droit vers la fenêtre qui étoit tant soit peu ouverte.

A la tige même les feuilles avoient changé leur position précédente, de façon que celles du milieu s'en écartoient encore beaucoup davantage; les supérieures au contraire étoient les seules dont la courbure



bure se portât encore vers le haut, parce qu'elles étoient encore en plein suc, & que les parties qui s'en évaporent, sont par conséquent propres à lui donner cette direction. En attendant la courbure de ces feuilles étoit toujours la plus forte du côté méridional de la tige, de sorte qu'il y en avoit entr'elles qui formoient des segmens de cercle. Les feuilles tout à fait inférieures de la tige, dont j'ai parlé d'abord au commencement, étoient tout à fait seches & épuisées, comme on le remarque d'ailleurs toutes les fois aux cotyledons des jeunes plantes croissantes; & par conséquent la direction qui vient de l'évaporation des suc doit cesser ici d'elle-même.

A la même heure précisément dont il a été fait mention ci-dessus, je retournai tout à la fois la plante entière, de façon qu'elle recouvra sa situation perpendiculaire, & je la plantai dans de la mousse récemment humectée. Je redressai les pointes pliées du sommet vis à vis des côtés qui s'élevoient au dessus, & dans l'espace de douze heures je parvins à rétablir ces pointes de façon qu'elles alloient toutes droit en haut.

Ces observations, & d'autres qui en dépendent, me firent naître l'idée de tenter encore des expériences régulières sur des plantes à part, pour observer le mouvement extérieur suivant lequel leur tige s'écartoit de la direction naturelle perpendiculaire, en se portant vers l'horizon, & de là se reressoit ensuite vers le haut. Je fis là dessus les arrangemens dont je crus avoir besoin, sans me mettre d'ailleurs en peine pour le présent de l'utilité & de l'application de ces recherches.

Je pris donc en même tems, le 16 Juin 1762, dans le dernier quartier où le Soleil étoit sur le point d'atteindre sa plus grande élévation, deux jeunes plantes venues de semence, tout à fait droites & se tenant perpendiculairement, de ces gros Tournesols communs, que les Botanistes nomment *Helianthus annuus*. Je les transportai de la couche dans des pots de jardin qui avoient été remplis de bonne terre, comme cela doit être quand on veut leur fournir pendant quel-

ques





ques mois une nourriture suffisante. Ces plantes qui se refirent bien-tôt, arriverent dans leur accroissement direct jusqu'à la hauteur de deux pieds & au delà; & cette hauteur étoit justement celle qui convenoit au but que je me propoisois alors & aux mesures que j'avois prises.

Je posai ensuite ces plantes, pendant un tems où régnoit une pluie forte & durable, sur une place tout à fait exposée dans le Jardin; elles s'y allongerent encore un peu; & le 1 Juillet, le bouton de leurs fleurs s'étoit déjà formé. A l'entrée de la nouvelle Lune, le tems devint fort chargé & orageux; le 8 l'air étoit extrêmement pesant, & le 9 il y eut un tonnerre. Dès le premier de ces jours, je mis une de ces plantes dans une caisse à part, & je la gouvernai de la manière dont je vais rendre compte.

La caisse dont la hauteur intérieure étoit d'un peu plus de deux pieds & demi, étoit un quarré oblong; elle avoit deux côtés larges vis à vis l'un de l'autre, & deux côtés étroits qui n'avoient que la moitié de la largeur, avec des fenêtres pareilles qu'on pouvoit pousser en montant. On peut presque dire, que tous les quatre côtés de la caisse consistoient principalement dans ces fenêtres. Elle n'avoit point de couvercle affermi, mais seulement un toit en voûte de minces lattes garnies de sindrap; & son fond étoit formé par une planche épaisse au milieu de laquelle il y avoit une grande ouverture ronde de la largeur de la main. Cette ouverture, suivant que la nature & la diversité des expériences le demandoit, avoit un couvercle de double carton d'une manière presque semblable à la couverture supérieure, qui, outre cela, à cause des fortes pluies & du froid de la nuit, étoit encore revêtue d'un papier très fort & d'une double natte. J'avois fait donner au pied de la caisse plus de trois pieds de hauteur, afin de pouvoir adapter à l'ouverture qui se trouvoit sous le fond des alembics, des retortes, des tuyaux, & y arranger commodément des pots de jardin & d'autres vases.

Je fis passer par cette ouverture dans la caisse toute la tige du Tournefol, en prenant bien soin qu'elle conservât exactement la même direction





direction naturelle, perpendiculaire qu'elle avoit eue auparavant en plein air. Le pot, dans lequel la terre avoit acquis pendant quelque tems l'humidité nécessaire, fut tellement affermi qu'il tenoit fort exactement au fond, & étoit enclavé dans son ouverture. La couverture fut alors tirée par dessus, de la maniere que j'ai déjà indiquée; & le bouchon de papier ne fut posé qu'en partie sur l'ouverture du fond.

La position que j'avois donnée à la caisse étoit la suivante: les deux fenêtres étroites regardoient l'Orient & l'Occident; les deux larges le Septentrion & le Midi. La fenêtre à l'Occident, qui est ce qu'on nomme le côté du temps, n'étoit pas seulement couverte par une planche, mais encore défendue par une cloison. Les trois autres côtés demeurèrent libres, & exposés à toutes les intempéries de l'air.

De ces quatre fenêtres il n'y avoit pour l'ordinaire que celle du côté de l'Orient, laquelle pour l'introduction de l'air libre nécessaire, je levois à la hauteur d'une main, & quelquefois tout au plus de deux pouces. Les autres fenêtres, pendant mes expériences, n'ont été qu'un petit nombre de fois haussées à demi, ou tout à fait, excepté lorsque je trouvois absolument nécessaire de procurer tout à fois à la plante qui étoit dans la caisse l'accès de l'air libre de toutes parts; encore pour l'ordinaire n'étoit-ce que du côté de l'Orient & de celui du Midi.

Tous ces arrangemens ne sont pas assujettis à des regles invariables; ils dépendent de la nature des expériences en particulier, & doivent toujours être déterminés & variés suivant que le demandent les circonstances. Mes vues demandoient que je m'y prisse comme je le fis; & j'eus tout achevé à cet égard le 7 Juillet, à quatre heures & vingt minutes de l'après-midi, après l'entrée de la Lune dans son premier quartier. Depuis ce tems je fis de ma plante l'objet d'une observation continuelle, surtout par rapport aux changemens que je m'attendois sûrement à lui voir éprouver dans son mouvement. Surtout j'étois



fort curieux de voir, combien de tems la tige que j'avois placée à présent entre des fenêtres & renfermée, conserveroit sa direction perpendiculaire. Il m'importoit aussi de découvrir de quel côté de l'horizon arrivoit le plus communément la déclinaison de la tige perpendiculaire, & si son mouvement se laisseroit changer d'une maniere arbitraire? Je cherchois en même tems, pendant le cours de ces variations, à me procurer une connoissance plus exacte par rapport au tems, à la vitesse, & d'autres circonstances particulieres de ces mouvemens.

Je fis usage dans ces Expériences d'un Instrument fort simple, qui consistoit proprement dans un Transporteur de cuivre, garni d'un Indice mobile; & j'en ai déjà fait quelquefois mention dans ce qui précède. On pourroit regarder en quelque maniere cet Instrument comme un Indice du mouvement. Il repose sur un support de bois de trois pieds; il est pourvu d'une fort longue perche quadrée qui s'adapte dans une matrice, ou fourreau, pareillement quadrée & de cuivre, où l'on peut la faire monter & descendre, pousse par pousse, & l'affermir au moyen d'une vis, suivant la hauteur de la plante & ses accroissemens. On peut encore le tourner de tous les côtés, l'approcher de la plante & l'en éloigner, aussi souvent & aussi vite que le demande la maniere prompte dont la tige décline ou se tourne.

J'ai fait diviser la circonférence du Transporteur en 90 degrés, de façon que la ligne perpendiculaire est marquée par I, ou aussi par O, & la ligne horizontale répond à 90. Au milieu de cette circonférence se trouve l'Indice mobile dont j'ai parlé tout à l'heure, que la plante, aussi souvent qu'elle change sa direction, pousse d'elle-même; de façon qu'on peut toujours observer très exactement sur la circonférence les degrés du mouvement, soit en avant, soit en arrière. De la même maniere on peut appercevoir comment la tige fait ses progrès d'une place à l'autre; & l'Indice les montre déjà quand ils sont imperceptibles par la tige seule.



L'Indice se termine par en haut en une pointe fort fine, qui a quelques pouces de largeur de plus que la hauteur de la circonférence, afin que la plante puisse parfaitement le roucher & le conduire en cercle. Dans les premières expériences j'effectuois ceci au moyen d'une longue, roide & étroite côte de baleine, qui étoit fortement attachée à la partie supérieure de la tige à la hauteur requise, de façon qu'elle conduisoit horizontalement de là à l'Indice qui étoit dans une situation perpendiculaire. Mais, dans les observations suivantes, je changeai cette circonstance avec un grand avantage, ayant mis à l'écart cette baleine, pour donner à l'Indice une pointe si longue que je pouvois la plier horizontalement au dessus de la circonférence du Transporteur, & la faire pencher du côté de la tige.

Cet Indice du mouvement, ou *Dendrometre*, étant ainsi adapté à mes Expériences, je le mis dans la caisse susdite, à côté de la tige du jeune Tournesol, à la distance de trois à quatre pouces, directement du côté du Nord, de façon que la pointe de l'Indice mobile le rouchoit de la manière requise pour montrer régulièrement le cours de ses progrès par les degrés de la circonférence. J'ai eu lieu d'être très satisfait dès le commencement de l'exactitude avec laquelle cet Instrument simple met en état d'observer le mouvement extérieur de la tige dans les plantes, & leur déclinaison de la ligne perpendiculaire vers l'horizon. Je laisse aux Connoisseurs & aux Amateurs à changer & à perfectionner cet Instrument relativement à d'autres vues particulières.

Ce ne fut qu'après tous ces préparatifs que mes observations commencerent; & elles prirent fin au bout de vingt & un jours à mon grand regret.

Le 7 Juillet, je ne remarquai pas le moindre changement dans la plante. La nuit du 7 au 8 il tomba une très forte rosée, qui étoit déjà dissipée le matin à quatre heures & douze minutes; la direction de la plante étoit toujours perpendiculaire comme la veille. A sept heures & cinq minutes le sommet avec le bouton de la fleur parut s'être tourné un tant soit peu du côté de la fenêtre à l'Orient; qui avoit



été constamment ouverte. Ce mouvement est toujours désigné dans la Table par I. comme étant le premier degré depuis la ligne perpendiculaire, qui est marquée O sur le Transporteur. La chaleur augmenta après quelques foibles mouvemens de l'air de Sud-Ouest, & à neuf heures & vingt minutes je trouvai la direction de la tige toujours la même. A' midi la chaleur étoit presque brûlante; & vers les deux heures on apperçut au Sud-Ouest plusieurs nuages de tonnerre & de pluie: alors la tige avoit réellement décliné de trois degrés de la perpendiculaire vers l'Orient.

A' cinq heures l'indice étoit sur le septieme degré; & le soir à neuf heures vingt-deux minutes, l'air étant encore extraordinairement pesant, & le Ciel assez couvert de nuages, je trouvai que l'Indice avec la tige s'étoit tellement écarté de la tige de la ligne perpendiculaire du côté de l'Orient, qu'il faisoit avec elle un angle de dix degrés. Le vent foible qui avoit regné précédemment, fut cause qu'on ne sentit cette nuit-là que peu de rosée: le 9 Juillet, à quatre heures du matin, la chaleur étoit déjà fort grande; & à quatre heures & vingt minutes la direction de la tige comme précédemment. Je ne revis ensuite ma plante qu'à dix heures six minutes, la chaleur ayant pris alors un accroissement très considérable pendant qu'il régnoit un foible vent de Sud-Ouest; je trouvai que l'Indice s'étoit déjà porté en avant jusqu'au vingtieme degré. A' minuit, il s'étoit encore avancé de dix degrés à l'Orient, & alors à mon grand étonnement il faisoit avec la ligne perpendiculaire un angle de trente degrés.

Cette circonstance redoubla mon attention, & m'engagea à recommencer toute mon Expérience; d'autant plus que j'avois outre cela remarqué une callosité à ma tige. La chaleur étoit alors extrême, l'air fort électrique, & le mouvement de la tige de ma plante s'exécutoit avec assez de vitesse. Le Ciel alors montra, par un vent de Sud-Ouest, des nuages à tonnerre de toutes parts sans pluie; & dans un espace de vingt quatre heures l'évaporation & la succion de la plante étoient



étoient si considérables que j'avois lieu de concevoir les plus grandes espérances d'appercevoir fort promptement dans la direction & dans le mouvement de la tige du Tournesol autant de variations que mes arrangemens permettoient d'en remarquer.

Je tirai donc, encore dans la même après-dinée, vers les trois heures & dix minutes la plante hors de la caisse dans laquelle elle avoit été du 7 au 9 Juillet, & je la remis en plein air. Sa place fut tout de suite occupée par la seconde plante du jardin, où par précaution je l'avois auparavant plantée en même tems que la première. Je procédai à l'égard de celle-ci précisément comme j'avois fait avec la précédente, excepté que, pour plus d'ordre & de commodité, je fis à l'Indice les changemens susmentionnés. A peine avois je achevé ces arrangemens, qu'il s'approcha du côté où je me trouvois un violent orage de tonnerres, qui venoit du Sud-Ouest; & dans ce moment-là la plante nouvellement mise dans la caisse étoit encore, aussi bien que l'Indice du Transporteur, dans la situation perpendiculaire la plus parfaite. Cet orage fut de durée, mais sans pluie; & à quatre heures & trente six minutes l'Indice étoit encore dans sa position précédente. L'air étoit fort rafraîchi, & sembloit annoncer quelque tourbillon du Nord-Ouest à l'Est; mais, ayant ouvert à sept heures & dix-sept minutes les fenêtres de la caisse, la tige avoit quitté tout à coup sa situation perpendiculaire précédente; & l'Indice, dans l'espace d'environ deux heures & demie, s'étoit avancé fort rapidement depuis 1 jusqu'au 10 degré vers l'Orient; le vent s'étoit tourné à l'Ouest, & le Ciel avec cela étoit fort rempli de nuages éparsillés.

Vû le mouvement de la plante, je fis une Expérience destinée à le troubler, ou à le changer. Pour cet effet j'ôtai entièrement les fenêtres qui étoient du côté de l'Orient & du Midi; & je laissai la caisse ouverte jusqu'à huit heures & trente-deux minutes du soir. Par là le mouvement fut en effet arrêté pour cette fois; & je fis redescendre ensuite les deux fenêtres.

Le 10 Juillet, dans la nuit, à treize minutes après minuit, on sentit, pendant un mouvement assez foible de l'air venant de l'Ouest, & quel-





quelques nuages séparés, une forte rosée; & l'Indice du Transporteur s'étoit non seulement porté en arriere tout à la fois de dix degrés; mais il avoit encore décrit trois degrés au delà de 1, du côté de l'Occident, de façon que la tige étoit presque perpendiculaire. Entre trois & cinq heures du matin l'air devint rafraîchi, & le vent du Midi à l'Ouest fort tempéré; & l'Indice tint la même position. Entre neuf & dix heures du matin, la chaleur avoit beaucoup augmenté fort rapidement, & elle continua de s'accroître jusqu'à trois heures après-midi. L'Indice recula avec la même vitesse de trois degrés de l'Occident à l'Orient revenant à 1.

Quoique je n'eusse point causé de changement au moyen de l'ouverture des fenêtres, les suc's altérèrent la direction de la tige, (qui jusqu'alors ne s'étoit encore portée que communément de 1 vers l'Orient, & de là en rebroussant,) d'une manière tout à fait extraordinaire, de façon qu'à dix heures & trente minutes, elle s'écartoit de dix degrés directement du Nord, ou de la circonférence de l'Instrument vers le Sud. A onze heures & vingt minutes avant midi, la tige avoit déjà repris sa situation accoutumée; & l'Indice se tenoit entre le 5 & le 6 degré en avançant vers l'Orient. Le vent venoit de l'Ouest, & la chaleur étoit forte. A dix-huit minutes après-midi, l'Indice se trouvoit déjà sur le dixieme degré, & le vent s'étoit renforcé. A une heure & trente minutes je le trouvai sur le quinzieme; & à quatre heures & dix minutes sur le dix-neuvieme, la température de l'air restant toujours la même.

Depuis ce tems il se tira, avec des coups variables d'un vent violent, du Nord-Ouest, des nuages noirs de pluie & de tonnerre, & après qu'ils se furent rassemblés l'air se rafraîchit. Pendant ces vicissitudes irrégulières l'Indice revint du troisieme degré jusqu'à 1. Le Ciel étant demeuré jusqu'à neuf heures du soir tout couvert d'épais nuages pluvieux, il survint une forte pluie mêlée d'un vent de tempête. A dix heures & douze minutes il plut à torrens, & cela dura une demi-heure, l'Indice conservant encore sa situation précédente. Après la pluie il re-

broussa



broussa au contraire tout doucement, de sorte que le lendemain 11 Juillet, à vingt minutes après minuit, par un mouvement fort doux de l'air, il n'étoit plus qu'à quatre degrés de 1, & par conséquent la tige de la plante étoit fort rapprochée de la direction perpendiculaire.

Le matin, à trois heures & cinquante - une minutes, il s'éleva un vent de tempête véhément de l'Occident avec le lever du Soleil; il continua jusqu'à cinq heures & trente minutes avec de la pluie, & pendant le jour il y eut des rayons du Soleil entremêlés. Pendant ce tems-là l'Indice ne perdit pas d'abord sa situation précédente. Mais, entre dix & onze heures du matin, il alla en avançant vers l'Orient, jusqu'au treizième degré où il s'arrêta jusqu'à midi & deux minutes; le tourbillon qui alloit alors du Nord-Ouest devint des plus violens, le Ciel étant fort trouble, & il chassa les plus gros nuages de pluie sans qu'il en tombât une goutte d'eau.

Depuis midi jusqu'à deux heures, l'Indice rebroussa à la vérité, pendant la durée de la tempête encore de deux degrés, en s'approchant de 1. Mais, de deux à quatre heures, le tems demeurant le même, il recula de façon qu'à quatre heures & huit minutes, je le trouvai sur le 16 & 17 degré, à quatre heures & trente minutes, sur le 18, & à sept heures & six minutes du soir sur le 19, droit à l'Orient. Pendant ce tems-là la tempête continuoit par secousses avec assez de violence. A huit heures & six minutes elle se calma, les violentes secousses cessèrent entièrement, & le Soleil se coucha lumineux, l'Indice étant sur 19. A neuf heures il étoit à 20; situation qu'il conserva avant & après minuit, l'air qui venoit de l'Occident étant rafraîchi, doux, & à la fin tout à fait calme.

Le 12 Juillet, à quarante minutes après minuit, le Ciel à la vérité étoit encore un peu nubileux; mais ensuite il s'éclaircit tout à fait; le mouvement de l'air changea à cinq heures précises, & venant du Sud il fut par alternatives un peu plus fort qu'auparavant; on apercevoit aussi successivement des nuages de tempête tout dispersés qui étoient en partie au Sud-Ouest: c'étoit proprement ce qu'on a coutu-



me d'appeller des poutres, en Allemand *Wetter-bäume*, ou *Wetter-balcke*. L'Indice avoit de nouveau rebrouffé: le matin à sept heures il étoit au 17 degré; à huit heures & dix sept minutes, il conservoit la même situation; mais le vent tomba à l'Ouest, & devint encore plus fort. A neuf heures le vent tourna au Sud-Ouest, & augmenta un peu avec la chaleur; pendant cela il s'élevoit de toutes parts au Nord & à l'Ouest des nuages d'orage. Mais, comme je trouvois encore l'Indice sans aucun changement, pour essayer d'en procurer, j'ouvris entierement la fenêtre qui étoit à l'Orient; j'ôtai le bouchon de carton qui étoit sur l'ouverture du fond de la caisse, & j'arrosai ma plante avec de l'eau aussi fraîche que la pompe pût la fournir. Après cela j'attendis avec impatience, si l'Indice rebroufferoit entierement du 17 degré à 1, & si la tige reprendroit la situation perpendiculaire, ou du moins s'en rapprocheroit: mais il arriva justement tout le contraire de ce que j'avois conjecturé au sujet de ce mouvement. Car, à neuf heures & dix minutes, l'Indice se porta beaucoup plus en avant jusqu'au 20 degré; & à dix heures, par un vent d'Ouest, il se mit premierement à rebrouffer jusqu'au 19.

Pour donner lieu à une plus grande déclinaison, je rabaissai la fenêtre occidentale, & je haussai entierement celle qui étoit au Midi. L'Indice, depuis les dix heures & huit minutes jusqu'à trois heures & dix-sept minutes de l'après-midi, rebroussa du 17 degré vers 1. La chaleur étoit alors fort grande, le Ciel rempli de nuages de pluie & d'orage dispersés; mais le mouvement de l'air venant du Sud-Ouest étoit fort foible, & le tems paroissoit se disposer de toutes parts à une pluie prochaine. Ce soir-là l'Indice demouroit encore au 17 degré; j'ouvris pour cette fois toutes les fenêtres de la caisse en même tems: & après la minuit du 13 Juillet suivant, vers les 40 minutes, l'air s'étoit assez réclairci, l'Indice ne montrant pendant ce tems-là aucun changement.

Entre six & sept heures du matin, la clarté du Ciel s'obscurcit; & comme la pluie étoit sur le point de tomber, on vit l'Indice rebrouffer



broussier tout à la fois entre le 14 & le 15 degré vers 1. La pluie ayant en effet commencé à tomber avec force, l'Indice avança de nouveau tout à coup jusqu'au 17 degré; & à huit heures & trente minutes, la pluie s'étant arrêtée, & le Ciel ayant seulement demeuré nubileux, l'Indice, dans l'espace de trente cinq minutes, pendant une pluie entremêlée de quelques rayons de Soleil, rebroussa de façon qu'à la fin, à neuf heures & cinq minutes, il ne faisoit plus avec la ligne perpendiculaire qu'un angle de huit degrés. A dix heures le Ciel étant toujours trouble, & quelques rayons de Soleil se laissant voir par ci par là, l'Indice avança de nouveau jusqu'au 9 degré, à l'Orient; & à onze heures avant midi, la pluie étant accompagnée d'un vent d'Ouest, il parvint au 10. Mais l'après-midi à cinq heures, le tems étant demeuré le même il rebroussa jusqu'au 7 degré, & même le soir à sept heures, le Ciel étant clair jusqu'au 5 vers 1.

Les deux jours suivans, 14 & 15 Juillet, pendant une grande chaleur & un vent d'Ouest fort foible, l'Indice demeura constant à très peu de degrés près, tantôt à l'Est, tantôt à l'Ouest. La nuit entre ces deux jours fut plus fraîche, l'air plus clair & un peu venteux, & les Etoiles jettoient une lueur pâle. La couverture de natte double dont j'avois toujours tenu la caisse couverte jusqu'à présent, fut soulevée par le vent, de façon que l'air pouvoit pénétrer plus librement dans la caisse & agir avec plus de force sur la plante. Cela fit allonger la tige de façon que le Transporteur, dont l'Indice n'étoit qu'à deux doigts de la tige, eut besoin d'être remonté plus haut. Le 15 Juillet vers les huit heures du soir, je remarquai que la longueur de la tige s'étoit encore accrue d'un pouce & demi; & la languette de l'Indice touchoit encore à peine l'extrémité de la pointe: de sorte qu'il falut élever de nouveau le Transporteur. Le vent s'étoit tourné au Sud-Est; l'air étoit extraordinairement pesant, les nuages d'orage se rassembloient du Sud-Ouest, où l'on voyoit aussi des éclairs fort vifs, mais séparés. A onze heures, l'air étant fort tempéré, il tomba une pluie douce, & la tige de la plante se retrouva presque perpendi-



culaire: cependant l'Indice avoit passé d'environ trois degrés de l'Orient vers l'Occident au delà de 1.

Le 16 Juillet à trois heures du matin le Ciel étoit fort clair, l'Indice n'avoit souffert aucun changement, & l'air avoit un mouvement fort foible venant du Sud-Est, pendant lequel on sentoît un peu de rosée. A quatre heures l'Indice se tenoit encore sur le 2 degré au delà de 1 vers l'Ouest; & le Ciel étoit un peu nubileux. Depuis la chaleur augmenta sensiblement; il y eut nouvelle Lune à sept heures & trente minutes; & depuis dix heures jusqu'à trois de l'après-midi, par un foible vent de Sud-Ouest, il fit un chaud presque insupportable. Finalement il s'approcha du côté où je me trouvois, depuis les quatre heures jusqu'à quatre heures & demie, du Sud au Nord, un très violent orage lequel, après quelques coups véhéments qui mirent le feu où ils frapperent, passa tout à fait en se retirant vers l'Ouest & l'Ouest-Nord.

A l'approche du premier coup de tonnerre, je haussai entièrement les fenêtres de la caisse, du côté du Nord, de l'Est & du Sud, afin que la pluie & le vent de tempête pussent agir sur la plante & sur la terre du pot à fleurs qui étoit dans la caisse. Cet orage dont la violence étoit extraordinaire, passa après une forte pluie d'une demi-heure, pendant laquelle la foudre tomba trois fois, & à environ mille pas de moi, alluma un grand moulin à vent situé sur le bord de la Sprée. L'abondance de la pluie étoit telle qu'on pouvoit la regarder comme la chute d'un nuage entre la Sprée & le fauxbourg de Berlin qu'on nomme de Francfort, jusqu'à la hauteur qui s'étend vers le Village de Lichtemberg. Les torrens d'eau qui s'étoient répandus, inonderent les chemins & les campagnes, & firent regner sur le sable le plus sec une espèce de mer, qui fut à peine écoulée au bout de trois heures. Un second orage survint; mais, après quelques coups rudes & une forte pluie, il fut bientôt passé.

Voici les observations que je fis sur ma plante pendant la durée de ce grand orage:



1. Aussitôt qu'il s'approcha, l'Indice mobile varia **constamment** du 5 degré, (où il s'étoit avancé de l'Ouest au de là de 1 vers l'Est,) en rebroussant au 3 degré vers 1; mais cela ne se fit que lentement.

2. D'abord après le grand éclat de tonnerre qui embrasa le moulin, ce qui arriva précisément à quatre heures & trente minutes, je trouvai l'Indice parvenu fort subitement au 2 degré, où il se fixa d'une manière immobile, pendant les éclairs très vifs qui durèrent jusqu'à dix heures vint & une minutes du soir; & la situation se soutint encore au delà jusqu'au 17 Juillet suivant, à quarante deux minutes après minuit, où je refermai premièrement les fenêtres de la caisse. La force des éclairs se dissipa à l'entrée du jour, au Nord & à l'Ouest; la nuit fut fort fraîche, & il fit une bruine jusqu'à onze heures de la matinée suivante.

Le 17 Juillet, à une heure & dix-huit minutes après minuit, l'Indice étoit exactement sur I ou O; & la tige de la plante avoit non seulement parfaitement recouvré sa situation perpendiculaire, mais elle s'étoit aussi un peu allongée, de sorte que je fus obligé de hausser le Transporteur. Ensuite, à onze heures & quarante minutes avant midi, ayant r'ouvert pour la première fois la fenêtre de la caisse du côté du Sud, j'observai que la tige du Tournesol avoit décliné vers le Midi, depuis quarante-deux minutes après minuit, en s'écartant de nouveau de sa situation perpendiculaire, de façon que ses mouvemens ne se portoient plus, (comme ils avoient fait communément jusqu'alors,) de l'Ouest à l'Est. En effet cette tige s'étoit tournée tout à la fois en s'éloignant de la circonférence du Transporteur, ou du Nord un peu obliquement vers le Sud; ce qui faisoit dix degrés tout entiers. Je laissai la fenêtre ouverte jusqu'à deux heures après-midi, par un vent d'Ouest soutenu & une bruine; ce qui ne fut pas sans conséquence: car, dès les onze heures & cinquante minutes, la tige, à mon grand étonnement, avoit rebroussé de dix degrés complets du Sud vers le Nord, & par conséquent, en se rapprochant de la circonférence,

avoit



avoit repris son ancienne position accoutumée; mais en même tems elle s'étoit avancée de ces dix degrés au delà de 1 vers l'Ouest. Cette déclinaison est la plus curieuse & la plus extraordinaire que j'aye eu occasion de remarquer dans le cours de ces Expériences.

A quatre heures après-midi, la pluie cessa; le côté de l'Ouest s'éclaircit le premier, & l'Indice avoit rebroussé du 10 degré au 8, à l'Est vers 1. J'ouvris cette fenêtre encore davantage, jusqu'à un demi-pied de largeur; & après quatre heures & trente minutes, je trouvai déjà l'Indice reculé au 7 degré vers 1. Le vent avoit été Sud peu auparavant, & l'air encore beaucoup plus clair: à six heures & douze minutes l'Indice, étoit encore éloigné de 6 degrés de 1.

Le soir, à huit heures 23 minutes, après que j'eus de nouveau r'ouvert toutes les fenêtres, l'Indice, par un tems beau & tempéré, rebroussa jusqu'au 4 degré vers 1; & à huit heures, trente-six minutes, le tems étant devenu encore plus agréable, plus calme & plus chaud, avec un Ciel clair, la terre commença à évaporer fortement; & l'Indice avança pleinement au delà de 1, dans sa route accoutumée, vers l'Est, de sorte que, le soir à dix heures, il étoit déjà revenu entre le 5 & le 6 degré. Là dessus le Ciel devint toujours plus clair, & fut étoilé tant avant qu'après minuit, l'air étoit tout à fait calme & humide.

Le 18 Juillet, à dix-huit minutes après minuit, les vapeurs que la terre exhaloit, semblerent redoubler, & l'Indice n'avoit reculé que d'un degré. Ensuite, à une heure & vingt minutes, les circonstances précédentes continuoient, le tems étant fort agréable, & le Ciel parfaitement étoilé de toutes parts, excepté à l'Orient: l'air se rafraîchit un peu, & avoit un mouvement doux du Nord-Ouest à l'Ouest. L'évaporation de la terre continuoit encore, & dura jusqu'à environ huit heures & quarante-huit minutes, l'Indice qui s'étoit tenu quelque tems entre le 4 & le 5 degré, ayant reculé jusqu'au 3, & un peu au delà, vers 1; & il s'y trouvoit encore à neuf heures & quarante-deux minutes. Comme la chaleur augmentoit beaucoup, je  
laissai



baissai à la vérité les fenêtres ouvertes, mais je les baissai à moitié vers dix heures, la moitié de l'horizon étant alors parsemée de nuages.

A dix heures & trente-cinq minutes avant midi, la déclinaison particulière de la tige du Tournesol se trouva pour la troisième fois du Nord au 18 degré vers le Sud; & je fus obligé de régler mon Instrument en conformité: voyant bien en même tems que le rebroussement de l'Indice seroit arrêté par là, puisque dès l'après midi à une heure je trouvais déjà l'Indice sur le 19 degré; lequel Indice, pendant toute cette déclinaison, demeura toujours parallèle avec 1, ou avec le milieu de la circonférence. A onze heures avant midi, on vit monter des nuages d'orage en abondance de tous les quatre côtés du Ciel; le mouvement de l'air étoit doux, & venoit de l'Ouest. Après une heure & quarante minutes, la tige avoit rebroussé de dix-huit degrés tout entiers du Sud vers le Nord, de sorte qu'elle étoit sur 1, & par conséquent tout à fait perpendiculaire. A une heure & cinquante minutes, elle avoit reculé jusqu'au 5 degré au delà de 1 vers l'Ouest, où elle se trouvoit encore le soir, à six heures & cinquante quatre minutes.

Le même soir, à huit heures & six minutes, après que j'eus fermé toutes les fenêtres à la fois, le Ciel étant clair, & une douce température régnant dans l'air, l'Indice se trouva de nouveau avancé jusqu'au 23 degré vers l'Orient. La rosée tomboit avec beaucoup de force par un mouvement fort doux de l'air venant de l'Ouest; & à neuf heures & trente-six minutes, l'Indice avoit rebroussé jusqu'au 18 degré vers 1.

Dans le même tems j'examinai, comme je l'avois déjà fait quelquefois pendant la nuit, les Tournesols dont j'avois fait planter une grande quantité par tout le Jardin, pour voir si toutes leurs tiges avoient une direction uniforme, & si cette direction différoit, ou non, de celle de la Plante que j'avois mise dans la caisse.

Quelques uns de ces Tournesols qui n'étoient pas fort éloignés de la caisse, & qui portoient déjà de grosses fleurs, monstroient à peu près

près la même direction; mais, dans d'autres, j'en trouvai une précisément opposée. Car ces plantes, tant grandes que petites, comme elles se trouvoient mêlées les unes parmi les autres, soit qu'elles eussent fleuri, ou non, penchoient leurs tiges de divers côtés; & au milieu d'elles on en voyoit par ci par là plusieurs, dont la tige étoit parfaitement perpendiculaire. Ici les heures du jour & la température de l'air avoient été à la vérité parfaitement les mêmes par rapport à toutes; mais l'âge, la hauteur, la force, la situation, le sol, & le libre accès de l'air, étoient sans contredit autant de choses différentes.

A dix heures & vingt-deux minutes, j'ouvris les fenêtres de la caisse tout à la fois, de la même manière que je l'avois déjà fait à dix heures avant midi, par un vent d'Ouest tout à fait doux. L'Indice se tenoit au 18 degré; mais, au bout de quelques minutes, il passa au 19 vers l'Orient. Il tomboit pendant ce tems-là une rosée excessive, le Ciel étoit clair & fort étoilé; & je trouvai le 19 Juillet, à vingt minutes après minuit, l'Indice sur le 21 degré. A une heure & seize minutes, le tems étant le même sans aucun autre mouvement, il étoit déjà au 23, la rosée demeurant toujours très forte, & le Ciel se couvrant au point du jour de nuages qui s'élevoient presque de tous côtés.

Cette température de l'air dura jusqu'à environ huit heures & dix minutes avant midi, l'Indice s'étant avancé jusqu'au 24 degré vers l'Est, par un Ciel clair & un vent foible d'Ouest. La plupart de ces Tournefols répandus dans le Jardin, dont j'ai parlé tout à l'heure, avoient exactement la même direction. Cette petite plante de Tournefol connue sous le nom de *Flos solis tuberosus, latifolius, perennis*, aussi bien que la plante qu'on nomme *Flos Solis Farnesianus*, en Allemand *Unter-Erdshokke*, tournoient également leurs jeunes tiges & leurs sommets vers l'Est, soit qu'elles eussent fleuri, ou qu'étant tardives, elles n'eussent point encore poussé de fleurs. J'aperçus la même chose dès les six heures du matin dans les espèces tant cultivées que sauvages; & dans les variations du *Ghenopodium*, des épinars, du



*Senecio*, de la petite ortie brûlante, & d'autres plantes qui n'ont point d'affinité avec le Tournesol; soit qu'elles fussent à découvert, ou placées sous des arbres & des buissons.

A' neuf heures & cinquante-cinq minutes, la chaleur s'accrût très considérablement, l'air avec cela n'avoit que le mouvement le plus doux venant du Nord-Ouest; & plusieurs petits nuages légers & minces tiroient du Nord vers le Sud. L'Indice alla toujours en avançant jusqu'au 27 degré. La chaleur augmentant de plus en plus, des nuages d'orage se montrèrent en abondance à l'Est & à l'Ouest, & à onze heures l'Indice passa d'abord au 25 degré, allant en rebroussant, vers le 0, & le vent devint Sud-Ouest. A' une heure après-midi, il s'éleva un vent frais de l'Ouest, qui jusqu'à six heures tempéra un peu la grande chaleur; surquoi l'Indice rebroussa encore plus loin jusqu'au 23 degré. Le soir, à sept heures & douze minutes, le vent s'étoit tourné au Sud-Ouest, & souffloit fort foiblement; le reste de la température de l'air se rafraîchit tout à coup & devint fort agréable, le Ciel étant clair & bleu. Alors l'Indice se trouvoit déjà au 21 degré. La nuit fut encore plus belle, le vent d'Ouest, le Ciel fort étoilé; & à dix heures & dix-sept minutes, l'Indice avoit déjà reculé vers 0.

Le 20 Juillet avant midi, à dix heures, le vent alloit du Sud-Ouest, l'Indice répondant au 19 degré. La chaleur étant fort grande, il s'éleva des nuages de tonnerre en abondance du Sud & du Nord tout à la fois. L'après-midi, à midi & seize minutes, l'Indice étoit sur le 18 degré, & le soir à sept heures, le tems étant rafraîchi, avec un peu de vent & un Ciel nubileux, il s'étoit avancé jusqu'au 19 degré. A' dix heures, le vent s'étant apaisé, & le Ciel étant fort éclairé par les Etoiles, l'Indice rebroussa de nouveau jusqu'au 17 degré vers 0.

Le 21 Juillet, l'Indice, depuis sept heures du matin jusqu'à une heure après-midi, pendant l'entrée de la Nouvelle Lune, se tint au 18 degré. Le vent d'Ouest modéra la chaleur, & les nuages ti-  
roient



roient avec force de l'Ouest à l'Est. Ces circonstances durèrent jusqu'à minuit, après quoi le vent cessa, le tems devint clair & agréable, avec une forte rosée; pendant laquelle l'Indice recula jusqu'au 19 degré vers l'Est, & par conséquent déclina de la ligne perpendiculaire vers la ligne horizontale.

Ici, contre mon gré, mes observations se terminèrent tout à coup. Une maladie qui peu de jours après devint une fièvre péchéiale maligne, me força d'abandonner le jardin dès cette nuit-là; & il se passa dix-huit semaines avant que je pusse y retourner. Sans cela je m'étois proposé de varier encore mes Expériences de diverses manières, & en particulier de continuer encore avec un plus grand nombre de plantes, dans une petite serre, pendant tout le cours de l'Automne & de l'Hyver. J'aurois pu arranger pour cet effet, tant extérieurement qu'intérieurement, quelques Barometres & Thermometres d'une maniere beaucoup plus commode qu'auparavant.

En attendant, comme on a pu le voir dans tout le cours de ma dissertation, par rapport aux Expériences dont j'y ai rendu compte, ce qu'elles ont de plus particulier est du au secours de l'Instrument, dont je donnerai une description plus exacte à la fin, accompagnée d'une figure qui le représente. J'y ai joint, suivant le conseil du célèbre Hales, l'usage du Barometre & du Thermometre; & j'ai soigneusement observé les variations tant constantes qu'extraordinaires de la température de l'air depuis le 8 Juillet jusqu'au 21; ce qui ne manque jamais d'être d'une grande utilité dans de semblables Expériences. Le Barometre étoit divisé en pouces & en lignes duodécimales du pied Rhinlandique; le Thermometre au contraire, suivant la division de M. de l'Isle, marquoit 0 au terme de l'eau bouillante, & 150 à celui de la congélation.

Pour arriver à une plus grande certitude, j'ai comparé mes observations météorologiques pour les mois de Juin & de Juillet, avec celles que M. Reccard, savant Inspecteur de l'Ecole Réelle de Berlin, & présentement Docteur & Professeur en Théologie à Königsberg



nigsberg en Prusse, a publiées, & j'ai trouvé fort peu de différence entr'elles. Vû cette harmonie, & pour plus de commodité, j'ai réduit toutes mes observations en quelques Tables qui se trouvent à la fin de ce Mémoire, & au moyen desquelles on pourra d'un coup d'oeil appercevoir le précis de toutes les circonstances.

Tout le reste de ce qui a été dit au sujet de la diverse déclinaison des jeunes tiges, des sommets & des queues, auxquelles l'évaporation fait perdre leur direction perpendiculaire, tant que leur accroissement dure, peut être connu avec plus d'étendue encore dans ce qui arrive non seulement aux jeunes arbres des forêts venues de semence par rapport à la feuille & à l'écorce de leur bois, mais dans plusieurs grands arbres tant sauvages que cultivés, dont chacun peut être regardé comme un forêt particulière, la Nature l'ayant formé sur sa tige individuelle pour sa propre conservation. Dans ces derniers seuls on peut souvent rencontrer presque toutes les espèces possibles de direction, que les vapeurs qui s'exhalent avec force sont capables de donner aux branches encore tendres pendant la durée de leur accroissement. Il est bien vrai que la déclinaison par laquelle ces jeunes tiges s'écartent de la ligne perpendiculaire vers l'horizon, n'est pas plus observable dans son commencement & dans ses progrès, que l'accroissement même des branches. Mais, quand l'une & l'autre de ces choses est arrivée, on en a des preuves de fait incontestables dans le changement de situation & dans l'allongement.

Toutes les causes qui par elles-mêmes sont en état d'affoiblir de différentes manieres les mouvemens intérieurs des plantes, ou de les augmenter, de les rendre plus forts & plus rapides, ou même de les détruire entièrement, peuvent fournir des caracteres propres à nous faire observer quelquefois dans les plantes un certain état extérieur & particulier, qui diffère fort distinctement de plusieurs autres. Cela s'explique entr'autres manieres par l'évaporation forte ou foible qu'éprouvent successivement quelques plantes dans certaines températures des saisons. . . Dès-là donc que les vapeurs en s'exhalant dirigent les

*Mém. de l'Acad. Tom. XXI.* L jeu-





jeunes tiges & les branches de ces plantes, & qu'en même tems elles cherchent l'air libre dans lequel elles montent droit en haut, les pointes & branches susdites ne peuvent manquer d'acquérir par là une semblable direction perpendiculaire. Mais, dès qu'on intercepte l'accès de l'air libre à ces pointes, tiges & plantes, tandis qu'elles sont dans leur plein accroissement, de sorte que les vapeurs qui s'en exhalent ne peuvent plus monter directement, alors elles se portent vers les côtés d'où l'air libre doit premièrement leur venir; & ces pointes, tiges & branches sont en même tems détournées de leur situation précédente, pour tendre vers les mêmes côtés où les vapeurs se portent. Cette variation se soutient ordinairement, & les branches, en subissant plusieurs sortes d'inflexions & de courbures, sont ainli conduites jusqu'à ce que leur sommet puisse regagner l'air libre, dans lequel elles reviennent insensiblement à leur première situation perpendiculaire.

Quoiqu'un semblable état soit déjà fort commun parmi quelques especes de plantes, & que des circonstances accidentelles puissent le rendre presque universel, il est néanmoins sujet à des changemens très fréquens. Leurs jeunes branches, sommets, tiges & queues, abandonnent non seulement leur direction perpendiculaire accoutumée; mais elles prennent une situation fort oblique, & qui à la fin devient presque horizontale, quelques unes mêmes poussant leur inflexion encore plus loin. Mais de nouvelles variations les ramènent tout aussi bien vers le haut, & leur font reprendre leur situation perpendiculaire précédente. Cela arrive quelquefois fort vite, quand l'évaporation est très foible, ou qu'elle cesse bientôt. Dans des alternatives si subites & si variées du mouvement intérieur des plantes, relativement à leur évaporation, il s'agit principalement d'employer en même tems une réaction plus forte de l'air qui affecte la plante, afin qu'elle puisse déterminer les vapeurs vers le degré opposé.

Cette circonstance, qui se manifeste quelque fois d'elle-même par des causes accidentelles, peut aisément être produite d'une manière arbitraire, comme je l'ai souvent exécuté en petit par rapport à  
mes





mes vues. En attendant, aussi longtems que les vapeurs se portent d'une maniere forte & durable d'un côté, les branches, les queues, les sommets conservent la situation qui est occasionnée par là; & si cela est constant, ou dure un peu trop longtems, de sorte que l'accroissement de ces plantes vienne à se terminer, & leurs fibres à devenir fortes, coriaces & ligneuses, les parties devenues ainsi inflexibles ne reprennent leur situation perpendiculaire que fort difficilement, lentement, insensiblement, ou même elles n'y reviennent jamais. Elles demeurent plutôt dans la direction & avec la courbure que les évaporations leur ont procurées.

Il en est autrement des nouveaux rejettons qui poussent de ces riges devenues roides; pourvu seulement qu'ils se trouvent dans un air libre, ils croissent toujours perpendiculairement.

On peut rien dire encore de bien positif sur l'utilité & l'application de ces observations, jusqu'à ce qu'elles soyent déterminées avec plus d'exactitude. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit dès l'entrée de ce Mémoire au sujet de la maniere d'élever le bois des forêts, ou toutes sortes d'especes de grands & petits arbres utiles, en leur donnant une figure déterminée, relativement à des vues particulieres: mais je recommande ces objets aux connoisseurs & aux amateurs de la Physique Expérimentale pour y consacrer des recherches ultérieures, l'étendre & le perfectionner; ce qui ne m'a pas été possible, tant à cause de la maladie dont j'ai parlé que de plusieurs autres traverses.

J'aurai en attendant toujours été le premier à faire des observations sur une espece de mouvement extérieur des plantes, lequel, suivant la diverse température de l'air avec laquelle elles ont une certaine liaison, peut éprouver des variations fréquentes & rapides dans un espace de 4, 6 à 8 heures; & j'ai appliqué à ces Observations un Instrument particulier & fort exact, auquel on peut donner le nom de *Dendrometre*, ou d'Indice de la direction & du mouvement des plantes, Instrument dont personne avant moi n'a fait un semblable usage.



## T A B L E.

| Jour.       | Tems du jour |          | Déclinaison de la tige vers |         |        | Barom.             | Therm. | Vent. | Température quotidienne.         |                                                                       |
|-------------|--------------|----------|-----------------------------|---------|--------|--------------------|--------|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             | Heur.        | Min.     | l'Est                       | l'Ouest | le Sud |                    |        |       |                                  |                                                                       |
| VIII.<br>24 | 4            | 12 av.m. |                             |         |        | 29.5 $\frac{1}{2}$ | 131    | S. O. | claire & calme                   | Premiere Plante.                                                      |
|             | 5            | 0 av.m.  |                             |         |        | —                  | —      | —     | chaude avec un vent foible.      |                                                                       |
|             | 7            | 5 av.m.  | 1                           |         |        |                    |        | O.    | — — —                            |                                                                       |
|             | 12           | 0        | —                           |         |        | — 4 $\frac{2}{3}$  | 116    | —     | — — —                            |                                                                       |
|             | 2            | 0 ap.m.  | 3                           |         |        |                    |        | —     | Nuages d'orages séparés & pluye. |                                                                       |
|             | 5            | 0 ap.m.  | 7                           |         |        |                    |        | —     | — — —                            |                                                                       |
|             | 6            | 0 ap.m.  | —                           |         |        | — 3 $\frac{1}{2}$  | 117    | —     | — — —                            |                                                                       |
|             | 9            | 22 ap.m. | 10                          |         |        |                    |        | —     | Tems nubileux sans pluye.        |                                                                       |
|             | 12           | 0        | —                           |         |        | — 4                | 126    | —     | — — —                            |                                                                       |
|             | 4            | 20 av.m. | 10                          |         |        | 29.3 $\frac{2}{3}$ | 127    | —     | — & chaud.                       |                                                                       |
| VIII.<br>25 | 5            | 0 av.m.  | —                           |         |        | —                  | —      | —     | — — —                            | Seconde Plante.                                                       |
|             | 8            | 0 av.m.  | —                           |         |        | —                  | 126    | N.O.  | — — —                            |                                                                       |
|             | 10           | 6 av.m.  | 20                          |         |        | — 3 $\frac{1}{2}$  | 116    | —     | — chaud avec un peu de pluye.    |                                                                       |
|             | 12           | 0        | 30                          |         |        | —                  | —      | —     | Orageux.                         |                                                                       |
|             | 3            | 10 ap.m. | 1                           |         |        | —                  | —      | —     | Orage au Sud sans pluye.         |                                                                       |
|             | 4            | 30 ap.m. |                             |         |        | —                  | —      | —     | air rafraichi.                   | Les fenêtres au Sud & à l'Est ouvertes depuis 7 h. jusqu'à 8 h. 31 m. |
|             | 7            | 0 ap.m.  |                             |         |        | — 4 $\frac{1}{2}$  | 123    | —     | — nuages disperfés               |                                                                       |
|             | 7            | 17 ap.m. | 10                          |         |        | —                  | —      | O.    | — — —                            |                                                                       |
|             | 12           | 0 ap.m.  |                             |         |        | — 4 $\frac{1}{2}$  | 127    | —     | — — —                            |                                                                       |

| Jour | Temps |          | Déclinaison     |       |         | Barom.             | Therm.            | Vent | Température quib-<br>tidienne.                                                      |                                                                                         |
|------|-------|----------|-----------------|-------|---------|--------------------|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Heur. | Min      | de la tige vers | l'Est | l'Ouest | le Sud             |                   |      |                                                                                     |                                                                                         |
| X.   | 12    | 13 ap.m. |                 | 3°    |         |                    |                   |      | vent foible, ciel nu-<br>buleux, forte rosée.                                       | Au Transporteur<br>rebrouffement<br>de 3 degrés au<br>delà de 0, de<br>l'Est à l'Ouest. |
| h    | 3-5   | av.m.    |                 | —     |         |                    |                   |      | — — — ciel clair,<br>tems agréable.                                                 |                                                                                         |
|      | 5     | 0 av.m.  |                 | —     |         | 29.4               | 131 $\frac{1}{2}$ | N.O. | — — — chaud                                                                         |                                                                                         |
|      | 8     | 0 av.m.  |                 | —     |         | 44                 | 123               |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 9-10  | av.m.    | 1               |       |         |                    |                   |      | chaleur qui s'accroît<br>considérablement.                                          | * de la circonfé-<br>rence droit en<br>avant, & par con-<br>séquent du Nord<br>au Sud.  |
|      | 10    | 30 av.m. |                 |       |         | 10°                | 116               |      | — — — vent foible.                                                                  |                                                                                         |
|      | 11    | 20 av.m. | 5-6             |       |         |                    |                   | O.   | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 12    | 0        |                 |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 12    | 18 ap.m. | 10              |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 1     | 30 ap.m. | 15              |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 4     | 10 ap.m. | 19              |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 7     | 0 ap.m.  | 13              |       |         | 4 $\frac{1}{2}$    | 117               | N.O. | air un peu disposé<br>à la tempête.                                                 |                                                                                         |
|      | 9-10  | 12 ap.m. | —               |       |         |                    |                   |      | fortes secousses de<br>vent, plusieurs nu-<br>ages noirs de pluie<br>& d'orage.     |                                                                                         |
|      |       |          |                 |       |         |                    |                   |      | Ciel obscurci avec<br>un tourbillon & u-<br>ne très forte pluie<br>par intervalles. |                                                                                         |
| XI.  | 11    | 0 ap.m.  | —               |       |         | 4                  | 121               |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 12    | 20 av.m. | 5               |       |         |                    |                   | N.O. | vent foible avec des<br>nuages par inter-<br>valles.                                |                                                                                         |
|      | 3     | 51 av.m. | —               |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 5     | 30 av.m. | —               |       |         | 29.2 $\frac{1}{2}$ | 124               |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 6     | 0 av.m.  | —               |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 10    | 11 av.m. | 13              |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 12    | 0        | —               |       |         | 1 $\frac{1}{2}$    | 120               |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 12-2  | ap.m.    | 11              |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      |       |          |                 |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      |       |          |                 |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 2-4   | 8 ap.m.  | 16-17           |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 4     | 0 ap.m.  | —               |       |         | 2 $\frac{1}{2}$    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 4     | 30 ap.m. | 18              |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 7     | 6 ap.m.  | 19              |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 8     | 6 ap.m.  | —               |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      |       |          |                 |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      | 9     | 0 ap.m.  | 20              |       |         |                    |                   |      | vent doux, ciel clair<br>au coucher du sol.                                         |                                                                                         |
|      | 11    | 0 ap.m.  | —               |       |         | 4                  | 128               |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      |       |          |                 |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |
|      |       |          |                 |       |         |                    |                   |      | — — — —                                                                             |                                                                                         |



| Jour       | Temps du Jour |          | Déclinaison de la tige vers |         |        | Température quodidienne. |                   |       |                                                              |
|------------|---------------|----------|-----------------------------|---------|--------|--------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|            | Heur.         | Min.     | l'Est                       | l'Ouest | le Sud | Barom.                   | Therm.            | Vent  |                                                              |
| XII.<br>♂  | 12            | 40 av.m. | —                           | —       | —      | —                        | —                 | S. O. | d'abord nubileux, ensuite fort clair.                        |
|            | 5             | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | 29.4 $\frac{1}{2}$       | 131               | —     | le vent se renforce; des nuages dispersés au Sud-Ouest.      |
|            | 7             | 0 av.m.  | 17                          | —       | —      | 4 $\frac{1}{2}$          | 124               | —     | air de tempête, poutres d'orage.                             |
|            | 8             | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | —                        | —                 | O.    | nuages dispersés.                                            |
|            | 8             | 17 av.m. | —                           | —       | —      | —                        | —                 | —     | —                                                            |
|            | 9             | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | —                        | —                 | —     | vent faible, chaleur, nuages à tonnerre au Nord & à l'Ouest. |
|            | 9             | 10 av.m. | 20                          | —       | —      | —                        | —                 | —     | —                                                            |
|            | 10            | 0 av.m.  | 19                          | —       | —      | —                        | —                 | —     | —                                                            |
|            | 12            | 0        | —                           | —       | —      | —                        | 117               | —     | —                                                            |
|            | 3             | 17 ap.m. | 17                          | —       | —      | 4 $\frac{1}{2}$          | 115               | N.O.  | nuages dispersés.                                            |
| XIII.<br>♂ | 7             | 0 ap.m.  | —                           | —       | —      | —                        | —                 | S. O. | —                                                            |
|            | 11            | 0 ap.m.  | —                           | —       | —      | —                        | 125               | —     | —                                                            |
|            | 12            | 40 av.m. | 17                          | —       | —      | —                        | —                 | N.O.  | temps clair.                                                 |
|            | 5             | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | 29.4 $\frac{1}{2}$       | 126               | —     | —                                                            |
|            | 6-7           | 0 av.m.  | 14-15                       | —       | —      | —                        | —                 | —     | trouble & pluvieux.                                          |
|            | 8             | 0 av.m.  | 17                          | —       | —      | —                        | 123               | —     | pluye.                                                       |
|            | 8             | 30 av.m. | —                           | —       | —      | —                        | —                 | —     | entremêlé de pluye & de rayons du Soleil.                    |
|            | 9             | 5 av.m.  | 8                           | —       | —      | —                        | —                 | —     | —                                                            |
|            | 10            | 0 av.m.  | 9                           | —       | —      | —                        | —                 | O.    | pluye & vent.                                                |
|            | 11            | 0 av.m.  | 10                          | —       | —      | 4                        | 116               | —     | trouble, pluye & vent.                                       |
| XIV.<br>♀  | 12            | 0        | —                           | —       | —      | —                        | —                 | —     | —                                                            |
|            | 4             | 0 ap.m.  | —                           | —       | —      | 3 $\frac{5}{8}$          | 112               | —     | —                                                            |
|            | 5             | 0 ap.m.  | 7                           | —       | —      | —                        | —                 | —     | —                                                            |
|            | 7             | 0 ap.m.  | 5                           | —       | —      | —                        | —                 | —     | —                                                            |
|            | 12            | 0        | —                           | —       | —      | 4 $\frac{1}{2}$          | 126               | N.O.  | clair.                                                       |
|            | 5             | 0 av.m.  | 3-5                         | —       | —      | —                        | —                 | O.    | vent faible, grande chaleur.                                 |
|            | 9             | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | 5 $\frac{1}{4}$          | 120               | —     | —                                                            |
|            | 4             | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | 5 $\frac{1}{4}$          | 111               | —     | fort clair,                                                  |
|            | 11            | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | 5 $\frac{1}{4}$          | 120 $\frac{1}{2}$ | —     | —                                                            |
|            |               |          |                             |         |        |                          |                   |       | étoiles pâles.                                               |

après l'arrosement.  
fenêtre ouverte au Sud.

toutes les fenêtres ouvertes.



| Jour  | Temps du Jour. |          | Déclinaison de la tige vers |         |        | Barom.             | Therm. | Vent  | Température quotidienne.                                                              |                                                                        |
|-------|----------------|----------|-----------------------------|---------|--------|--------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | Heur.          | Min.     | l'Est                       | l'Ouest | le Sud |                    |        |       |                                                                                       |                                                                        |
| XV.   | 5              | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | 29.4 $\frac{1}{2}$ | 127    | —     | vent foible,                                                                          |                                                                        |
| 24    | 8              | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | — 4 $\frac{1}{2}$  | 120    | S. E. | nuages délics & dispersés, chaleur.                                                   |                                                                        |
|       | 12             | 0        | —                           | —       | —      | — 3 $\frac{1}{2}$  | 110    | —     | — — — clair.                                                                          |                                                                        |
|       | 8              | 0 ap.m.  | —                           | —       | —      | — 4 $\frac{1}{2}$  | 120    | —     | air pesant, nuages à tonnerre, avec de violens éclairs au Sud-Ouest.                  |                                                                        |
|       | 11             | 0 ap.m.  | —                           | 3°      | —      | — 3 $\frac{1}{2}$  | 110    | —     | pluie douce, vent modéré.                                                             | en rebroussant au delà de 0, de l'Est vers l'Ouest.                    |
| XVI.  | 12             | 0        | —                           | —       | —      | — 3                | 116    | —     | clair, un peu de rosée, & chaud.                                                      |                                                                        |
| ♀     | 3              | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | —                  | —      | —     | vent foible.                                                                          |                                                                        |
|       | 4              | 0 av.m.  | —                           | 2°      | —      | —                  | —      | —     | air nubileux, chaud.                                                                  | encore 2 degrés, en delà de 0, vers l'Ouest.                           |
|       | 5              | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | 29.2 $\frac{3}{4}$ | 120    | S. O. | — — —                                                                                 |                                                                        |
|       | 12             | 0 ap.m.  | —                           | —       | —      | — 2 $\frac{1}{2}$  | 105    | —     | — — — fort chaud.                                                                     |                                                                        |
|       | 4              | 0 ap.m.  | —                           | —       | —      | — 2 $\frac{1}{2}$  | 113    | —     | — — —                                                                                 |                                                                        |
|       | 4              | 30 ap.m. | 5-3-2                       | —       | —      | —                  | —      | S. O. | tonnerre véhément du S. & du N. moulin à vent embrasé par la foudre, pluie à torrens. | toutes les fenêtres ouvertes.                                          |
|       | 10             | 21 ap.m. | 2                           | —       | —      | —                  | —      | —     | gr. éclairs par intervalle du Nord & de l'Ouest.                                      |                                                                        |
|       | 12             | 0        | —                           | —       | —      | — 2 $\frac{3}{4}$  | 119    | —     | — — —                                                                                 |                                                                        |
| XVII. | 12             | 42 av.m. | 2                           | —       | —      | 29.2 $\frac{3}{4}$ | 119    | S. O. | air frais, bruine, éclairs par intervalle au N. O.                                    |                                                                        |
| ♂     | 1              | 18 av.m. | 1                           | —       | —      | —                  | —      | —     | — — —                                                                                 |                                                                        |
|       | 5              | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | — 2 $\frac{3}{4}$  | 125    | —     | — — —                                                                                 |                                                                        |
|       | 9              | 0 av.m.  | —                           | —       | —      | — 3 $\frac{1}{4}$  | —      | —     | — — —                                                                                 |                                                                        |
|       | 11             | 40 av.m. | —                           | —       | 10°    | — 3 $\frac{1}{4}$  | 123    | N.O   | — — — assez clair, un peu de pluie.                                                   | en s'écartant de la circonférence du Transporteur du Nord vers le Sud. |
|       | 11             | 50 av.m. | —                           | 10      | —      | —                  | —      | —     | clair & tranquille.                                                                   |                                                                        |
|       | 12             | 0        | —                           | —       | —      | —                  | —      | —     | — — —                                                                                 |                                                                        |
|       | 4              | 0 ap.m.  | —                           | 9       | —      | — 3 $\frac{1}{4}$  | 120    | —     | — — —                                                                                 |                                                                        |
|       | 4              | 30 ap.m. | —                           | 7       | —      | —                  | —      | S. O. | — — —                                                                                 |                                                                        |
|       | 6              | 12 ap.m. | —                           | 6       | —      | —                  | —      | O.    | — — —                                                                                 |                                                                        |
|       | 8              | 23 ap.m. | —                           | 4       | —      | —                  | —      | —     | — — — chaud.                                                                          | toutes les fenêtres ouvertes.                                          |
|       | 8              | 36 ap.m. | 1                           | —       | —      | —                  | —      | —     | — — — rosée —                                                                         |                                                                        |
|       | 10             | 0 ap.m.  | 5-6                         | —       | —      | —                  | —      | —     | clair — — humide.                                                                     |                                                                        |
|       | 11             | 0 ap.m.  | 5-4                         | —       | —      | — 4                | 125    | N.O   | — — — étouffé, rafraîchi.                                                             |                                                                        |



| Jour<br>Juillet | Temps<br>du Jour |          | Déclinaison<br>de la tige vers |         |        |                    |                 |       | Température quo-<br>tidienne. |                                                           |
|-----------------|------------------|----------|--------------------------------|---------|--------|--------------------|-----------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                 | Heur.            | Min.     | P'Est                          | P'Ouest | le Sud | Barom.             | Therm.          | Vent  |                               |                                                           |
| XVIII.<br>○     | 12               | 18 av.m. | —                              | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | rosée.                                                    |
|                 | 1                | 20 av.m. | 3.45                           | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | forte rosée.                                              |
|                 | 5                | 0 av.m.  | —                              | —       | —      | 29.4 $\frac{2}{3}$ | 129             | —     | —                             | —                                                         |
|                 | 8                | 0 av.m.  | 2.3                            | —       | —      | 4 $\frac{2}{3}$    | 125             | —     | —                             | air calme.                                                |
|                 | 8                | 48 av.m. | —                              | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | nuages sé-<br>parés par rayes.                            |
|                 | 9                | 42 av.m. | —                              | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | —                                                         |
|                 | 10               | 35 av.m. | —                              | —       | 18°    | —                  | —               | —     | —                             | nuages dispersés.                                         |
|                 | 12               | 0        | —                              | —       | —      | —                  | —               | 113   | —                             | —                                                         |
|                 | 1                | 0 ap.m.  | —                              | —       | 19     | —                  | —               | —     | —                             | —                                                         |
|                 | 1                | 40 ap.m. | 1                              | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | —                                                         |
|                 | 1                | 50 ap.m. | —                              | 5°      | —      | —                  | —               | —     | —                             | temps clair & agréa-<br>ble, avec un vent<br>fort foible. |
|                 | 5                | 0 ap.m.  | —                              | —       | —      | —                  | 4 $\frac{3}{4}$ | 100   | —                             | —                                                         |
|                 | 6                | 54 ap.m. | —                              | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | rosée.                                                    |
|                 | 8                | 6 ap.m.  | 23                             | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | Ciel tout à fait<br>étoilé.                               |
| XIX.<br>D       | 9                | 36 ap.m. | 18                             | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | forte rosée.                                              |
|                 | 10               | 22 ap.m. | — 19                           | —       | —      | —                  | —               | —     | O.                            | —                                                         |
|                 | 12               | 0        | —                              | —       | —      | — 5                | 120             | —     | —                             | —                                                         |
|                 | 12               | 20 av.m. | 21                             | —       | —      | 29.5               | 120             | N.O.  | —                             | temps clair & rosée.                                      |
|                 | 1                | 16 av.m. | 23                             | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | —                                                         |
|                 | 5                | 0 av.m.  | —                              | —       | —      | — 5 $\frac{1}{2}$  | 124             | —     | —                             | calme.                                                    |
|                 | 8                | 0 av.m.  | —                              | —       | —      | — 5 $\frac{1}{2}$  | 118             | —     | —                             | —                                                         |
|                 | 8                | 10 av.m. | 24                             | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | —                                                         |
|                 | 9                | 55 av.m. | 27                             | —       | —      | —                  | —               | N.O.  | —                             | forte chaleur<br>avec des nuages<br>déliés & séparés.     |
|                 | 11               | 0 av.m.  | 25                             | —       | —      | —                  | —               | S. O. | —                             | beau temps & chaud.                                       |
|                 | 12               | 0        | —                              | —       | —      | — 5 $\frac{1}{2}$  | 109             | —     | —                             | —                                                         |
|                 | 1                | 0 ap.m.  | 23                             | —       | —      | —                  | —               | O.    | —                             | temps rafraîchi.                                          |
|                 | 3                | 0 ap.m.  | —                              | —       | —      | — 5 $\frac{1}{2}$  | 99              | S. O. | —                             | —                                                         |
|                 | 7                | 12 ap.m. | 21                             | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | clair & Ciel bleu.                                        |
|                 | 10               | 17 ap.m. | 20                             | —       | —      | —                  | —               | —     | —                             | fort étoilé & agréa-<br>ble.                              |
|                 | 12               | 0        | —                              | —       | —      | — 4 $\frac{1}{2}$  | 118             | O.    | —                             | —                                                         |

\* en s'écartant de  
la circonférence  
du Transporteur  
du N. vers le S.  
en arrière en de-  
ça de 0, vers  
l'Ouest.  
toutes les fenêtres  
ouvertes.  
toutes les fenêtres  
fermées.





| Jour<br>Juillet | Tems<br>du Jour. |          | Déclinaison<br>de la tige vers |         |        | Barom. Therm.       |                   | Vent  | Température quo-<br>tidienne.                                   |
|-----------------|------------------|----------|--------------------------------|---------|--------|---------------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|                 | Heur.            | Min.     | l'Est                          | l'Ouest | le Sud |                     |                   |       |                                                                 |
| XX.<br>♂        | 5                | 0 av.m.  | —                              |         |        | 29. 4 $\frac{1}{2}$ | 120               | S. O. | tems nubileux &<br>pluvieux.                                    |
|                 | 9                | 0 av.m.  | —                              |         |        | — 4 $\frac{1}{2}$   | 112               | O.    | fort clair & calme.                                             |
|                 | 10               | 0 av.m.  | 19                             |         |        | —                   | —                 | S. O. | chaud, nuages à ton-<br>nerre.                                  |
|                 | 12               | 0        | —                              |         |        | —                   | 103               | —     | — — —                                                           |
|                 | 12               | 16 ap.m. | 18                             |         |        | —                   | —                 | —     | — — —                                                           |
|                 | 3                | 0 ap.m.  | —                              |         |        | —                   | —                 | —     | — — — tourbillon.                                               |
|                 | 7                | 0 ap.m.  | 19                             |         |        | —                   | —                 | —     | — — —                                                           |
|                 | 10               | 0 ap.m.  | 17                             |         |        | —                   | —                 | —     | calme, fort étoilé,<br>agréable.                                |
|                 | 12               | 0        | —                              |         |        | — 5 $\frac{1}{2}$   | 112               | —     | — — —                                                           |
| XXI.<br>♀       | 5                | 0 av.m.  | 18                             |         |        | 29. 5 $\frac{1}{2}$ | 123               | O.    | clair.                                                          |
|                 | 7                | 0 av.m.  | —                              |         |        | — 6                 | 118               | —     | — chaud, les nuages<br>tirant avec force de<br>l'Ouest à l'Est. |
|                 | 8                | 0 av.m.  | —                              |         |        | —                   | 111               | —     | nubileux.                                                       |
|                 | 12               | 0        | —                              |         |        | —                   | —                 | —     | — — —                                                           |
|                 | 2                | 0 ap.m.  | —                              |         |        | — 5 $\frac{1}{2}$   | 108 $\frac{1}{2}$ | —     | fort clair, agréable<br>& rosée.                                |
|                 | 10               | 0 ap.m.  | —                              |         |        | —                   | —                 | —     | — — —                                                           |
|                 | 12               | 0        | 19                             |         |        | — 5 $\frac{1}{2}$   | 119               | —     | — — —                                                           |

## DESCRIPTION

de l'Instrument, dont on a fait usage dans les expériences du Mémoire précédent, qu'on pourroit appeler un *Dendrometre*, ou plus proprement un *Phytoclinometre*, parce qu'on peut par son moyen mesurer les inclinaisons des plantes.

**A** est le pied de bois, haut de 8 pouces, dont les trois pieds sont écartés entr'eux d'un pied & demi, afin de gagner assez de place pour la position des plantes: si on vouloit appliquer l'instrument aux arbres & aux arbrisseaux, il conviendrait de faire faire les pieds nigus à leur extrémité & inobiles par des charnières, d'une hauteur de deux jusqu'à cinq pieds, à la façon du pied des astrolabes. Outre cela les diverses circonstances rendront nécessaires d'autres changeimens du pied, dont la figure est fort arbitraire. Sur ce pied A est fermé, par une platine quarrée de deux pouces, l'étau perpendiculaire B haut de neuf pouces & large d'un demi-pouce, pour recevoir le parallépipède C haut

Mém. de l'Acad. Tom. XXI. M d'un




d'un pied & demi & divisé en pouces, qu'on peut hauffer & baiffer en le passant par un trou convenable du pied, & qu'on fixe après cela dans son étui B par la vis D. Ce parallelepipede porte en haut un *cilindre creux* E large d'un demi-pouce, & profond d'un pouce, qui y est soudé & dans lequel on peut tourner le *cilindre solide* F, & après cela le fixer par les deux vis G.



Au bout de ce cylindre solide F est soudé un *étui horizontal* H long d'un pouce & large d'un demi-pouce, pour recevoir le *parallelepipede* F, de cinq pouces de longueur, qu'on y peut avancer & reculer & fixer par la vis R. A l'une des extrémités du parallelepipede se trouve une *platine quarrée* L d'un pouce & demi, à laquelle on applique, à l'aide de deux petites vis, le transporteur. (Voyez les pieces F, H, I, R, & L, dans la seconde Figure, parce qu'elles sont couvertes par le transporteur dans la premiere.)

Le *Transporteur* M a six pouces en diametre, & il est divisé à chaque côté en 90 degrés, & marqué avec l'*Est* & l'*Ouest*; les points *m, m*, sont les deux vis par lesquelles il est fixé à la platine susdite L, Fig. 2de. Dans son centre se trouve l'*Indice* N, dont la figure donne l'idée suffisante; il est mobile sur son axe d'acier très poli, en telle sorte qu'il ne touche pas immédiatement la surface du transporteur, c'est pourquoi on a soudé, autour du trou par lequel l'axe passe, un petit anneau, de trois lignes de diametre, & d'une demi-ligne d'épaisseur, afin que la friction soit aussi petite qu'il est possible. Par l'extrémité large de l'Indice, avec laquelle il montre les degrés, passe horizontalement un *stilet rond* O, de quatre pouces de longueur & qui doit être très roide; en arriere ce stilet est fermé par une petite boule, qui doit être de même pesanteur avec ce stilet, afin que l'Indice soit toujours parallele à la surface du transporteur. C'est par l'attouchement du stilet que la plante met en mouvement l'Indice. A l'autre extrémité de l'indice est appliquée par une vis la *petite boule* P, pour rendre cette branche, qui est une fois plus courte que l'autre, de même pesanteur, & même de quelques grains plus pesante, afin que l'indice rebrousse de soi-même, quand la direction de la plante s'approche de la perpendiculaire. Il sera même à propos d'avoir en reserve deux autres boules plus pesantes que celle-ci; on doit pourtant prendre garde que le poids de l'indice tout entier ne surpasse par une once & demie.

Toutes les parties, excepté le pied, sont de cuivre jaune; mais l'exactitude de l'instrument deviendroit sans contredit plus grande, si on faisoit faire l'Indice tout entier d'acier; de même les plus petites variations des plantes deviendroient plus sensibles, si on vouloit augmenter la grandeur du transporteur, parce qu'on pourroit alors subdiviser aisément ses degrés plus grands.









# OBSERVATIONS ANATOMIQUES

SUR

LA GLANDE PINEALE, SUR LA CLOISON  
TRANSPARENTE, ET SUR L'ORIGINE DU NERF DE  
LA SEPTIEME PAIRE.

PAR M. MECKEL.

*Traduit du Latin.*

**I**l est difficile, je l'avoue, d'ajouter de nouvelles découvertes à celles qui ont été faites par rapport au cerveau, à moins qu'on ne veuille envisager sous ce point de vue une connoissance plus particulière de la structure du cerveau qui a été généralement ignorée jusqu'ici; la Nature, au moyen de la composition extrêmement subtile de ce viscere, l'ayant presque tout à fait soustrait à la connoissance humaine, on du moins ne semblant réserver cette connoissance qu'aux derniers siècles. Aussi, ni le nombre de ceux qui ont travaillé sur ce sujet, ni les secours qu'ils ont eus & les moyens qu'ils ont inventés, n'ont encore rien produit qui puisse conduire directement à ce but. Cependant l'industrie des Anatomistes modernes prouve qu'il y a de nouvelles découvertes possibles quant à la figure des parties du cerveau & à leur cohésion: ils ont mis dans un plus grand jour ce qui concerne les valvules médullaires dans le quatrième ventricule, les protubérances collatérales des ventricules tricornes, & bien d'autres choses, sans parler des origines des nerfs. Et même, quant à ces parties du cerveau qui ont été constamment regardées comme les plus dignes d'attention, on ne sauroit poser pour règle qu'elles



en sont d'autant mieux connues. En effet, s'il y a une petite partie dans le cerveau à qui convienne la prérogative d'avoir été l'objet des recherches les plus exactes, c'est sans contredit la glande pinéale, à cause de la fiction de Descartes suivant laquelle elle seroit regardée comme le siége de l'ame: & ce notwithstanding, les liens de sa cohésion avec le cerveau ne sont encore rien moins que bien connus. On aperçoit assez aisément qu'elle tient aux couches des nerfs optiques, par le moyen des funicules médullaires cylindriques, qui se portent en avant de la base de cette glande pinéale (Fig. lett. A.) vers les couches des nerfs optiques; on découvre, dis-je, cette liaison sans peine, pourvu qu'on sache enlever de dessus cette glande le plexus choroïde impair, & la grande veine du cerveau, dite de Galien, qui la couvre, avec assez de circonspection pour que la glande demeure entière & immobile dans sa situation, les petits vaisseaux qui l'envelopent comme un réseau étant adroitement disséqués; lesquels vaisseaux descendant du plexus choroïde à la pie-mère, garnissent ce qu'on nomme l'eminence quadrijumelle ou les tubérosités nommées *nates* & *testes*, & la glande pinéale elle-même. Alors il paroît que ces funicules s'enfoncent dans la substance médullaire même des couches optiques, qu'ils y continuent, & qu'ils sont même assez forts, ayant pour l'ordinaire l'épaisseur d'une ligne. (Fig. lett. D.D.)

Ceux donc qui, dans leurs Ecrits, ont parlé des filamens nerveux qui lient la glande pinéale aux couches des nerfs optiques, comme d'une chose rare, n'ont eu que des connoissances fort imparfaites à cet égard. Tel a été le cas de Vieussens \*) & de quelques autres. Bien plus, ceux qui n'ont pas eu le secours d'Observations réitérées, ont révoqué en doute cette liaison de la glande avec les couches, parce qu'en disséquant le cerveau mort & dans un état de dissolution, ils ont enlevé cette glande avec le plexus choroïde impair. Il est donc certain que la base de cette glande est toujours attachée de part & d'autre par des péduncules médullaires aux couches des nerfs optiques, & qu'elle est ainsi continuée dans leur

substan-





substance. Mais, en y regardant de plus près, on voit qu'elle a toujours une autre connexion médullaire plus large avec la commissure postérieure du cerveau. En effet, la glande pinéale fait sortir de sa base, entre les péduncules, une lame médullaire qui lie entr'eux les péduncules qui procedent de part & d'autre de la base de cette glande. Cette lame blanche médullaire (qu'on peut fort bien voir dans l'une & l'autre Figure, Lett. C.) s'étant un peu élargie, & descendant en arriere; continue & s'insere dans ce faisceau cylindrique médullaire, qu'on appelle la commissure postérieure du cerveau (Fig. Lett. B.) De cette façon la glande pinéale, au moyen de la lame médullaire susdite, tient d'une maniere plus étendue à cette commissure postérieure du cerveau, tandis qu'elle est constamment attachée par les funicules médullaires aux couches des nerfs optiques. J'ai cru que, pour rendre cette découverte plus claire, on ne pouvoit se passer du secours des Figures ci-jointes, dont la premiere représente la glande dans sa situation naturelle, placée sur les nates, vue par devant, où l'on apperçoit aussi le troisieme ventricule ouvert entre les couches des nerfs optiques, & la lame médullaire C qui paroît continuée de la base A de la glande pinéale jusqu'à la commissure postérieure du cerveau B, d'une façon si immédiate, qu'elle va sans interruption s'engager droit dans cette commissure. La seconde Figure montre la glande pinéale A renversée, & la lame médullaire C sortant de sa base, en sorte que la substance même plus épaisse de la base de la glande s'élève au dessus de cette lame médullaire; & la continuation aussi bien que l'insertion de ladite lame dans la surface antérieure de la commissure antérieure du cerveau B, vers le quatrieme ventricule, s'offrent évidemment à la vue; & l'on ne voit pas moins distinctement sous la glande même renversée, les nates, les testes, la raye transversale du cerveau & sa grande valvule. Cette liaison de la glande pinéale a échappé, entre plusieurs autres, à l'industrie de *Tarin*, qui a pourtant fait une revue fort exacte du cerveau, & qui, dans l'Ouvrage très utile qu'il a donné sous le titre d'*Adversaria Anatomica*, représente fort bien, quoiqu'un peu trop



en petit, la liaison de la glande par le moyen des péduncules médullaires, mais omet entièrement celle qui va aboutir à la commissure.

Quant à la structure même de cette glande, il m'est arrivé rarement, dans le très grand nombre de cerveaux que j'ai disséqués, de n'y pas trouver de petits cailloux ou des grains de sable. La Figure en offre deux qui sont attachés à la base dans la surface antérieure de la glande (Fig. 1. Lett. b.b.) & cela se rencontre non seulement dans ceux qui ont eu l'esprit dérangé, mais également dans ceux qui ont jusqu'à la fin de leur vie joui de l'usage de la raison. Je n'y trouve rien de surprenant; car il est de la nature de la lymphe, lorsqu'elle est en état de stagnation, d'engendrer de semblables corps pierreux; & notre glande qui est entourée de toutes parts de vaisseaux lymphatiques, est encore plus exposée à cette stagnation que les autres parties corticales du cerveau. Cependant je ne l'ai jamais trouvée purement pierreuse.

Une autre partie du cerveau, dont j'entreprends de donner une connoissance plus distincte, c'est la cloison transparente avec la voûte, dont il s'agit d'exposer la nature de façon qu'on voye évidemment s'il y a, ou non, une connexion des ventricules tricornes entr'eux & avec le troisième. On trouve de grandes différences dans les descriptions de cette cloison & de cette voûte, qui ont été fournies par les Auteurs, & par ceux même qui ont le plus de savoir & d'habileté: ce qui m'a engagé à prendre d'autant plus de peine pour découvrir la vérité par des observations réitérées sur plusieurs cerveaux, & pour donner une description qui y soit solidement fondée; ce qui ne peut manquer de faire plaisir aux gens du métier. Il est nécessaire d'entamer cette description par la constitution de la cloison transparente, de façon qu'on puisse en inférer ce que c'est que la voûte, & quelle séparation existe entre les ventricules.

La cloison transparente est une double lame médullaire du cerveau, qui continue depuis la base du cerveau, entre les grands ventricules tricornes, ou entre les corps striés & les couches des nerfs



nerfs optiques, se portant en haut vers la surface inférieure du corps calleux, ou pour mieux dire, descendant de la surface inférieure de ce corps suivant toute sa longueur dans l'interstice des parties susdites. Cette cloison étant détachée avec circonspection de la surface du corps calleux, commence à son extrémité postérieure, de façon que les deux lames médullaires de la cloison, la droite & la gauche, sont séparées l'une de l'autre de la distance d'environ un tiers de pouce. Ces lames, en descendant de cette extrémité postérieure, s'engagent dans ce qu'on nomme les jambes postérieures de la voûte. Conservant toujours la même distance l'une de l'autre depuis leur extrémité postérieure, elles vont en continuant vers les couches des nerfs optiques. Depuis l'extrémité postérieure des couches, où ils s'écartent l'un de l'autre, les lames de la cloison sont encore séparées; mais, quand vers le milieu de leur longueur les couches sont plus proches l'une de l'autre, les lames aussi deviennent convergentes jusqu'à ce qu'elles s'appliquent l'une à l'autre. Ainsi ces deux lames sont séparées l'une de l'autre de plus de trois quarts de pouce à l'extrémité postérieure de la cloison; & la partie postérieure du plexus choroïde impair, ou troisième, dans l'endroit où il s'insère dans la grande veine du cerveau, dite de Galien, est située librement entre ces lames, depuis les couches jusqu'à la fin du corps calleux. Dans cet interstice, de la surface inférieure du corps calleux la pie-mère vasculaire s'applique à la surface interne des lames de la cloison, & les revêt intérieurement jusqu'à leur extrémité antérieure. Les lames séparées, lorsqu'elles sont parvenues environ au tiers de la longueur des couches, à commencer par leur extrémité postérieure, se réunissent entre les couches des nerfs optiques, & au moyen d'une raye médullaire longitudinale, mince & transparente, elles acquièrent une cohérence qui des deux lames n'en fait qu'une, au lieu qu'auparavant elles descendent séparément de la surface inférieure du corps calleux, étant revêtues de la pie-mère. J'ai vu, dans le cerveau d'un insensé, ces lames de la cloison si éloignées entr'elles, depuis le corps calleux jusqu'à la raye médullaire qui réunit les lames par  
embas,



embas, que cet interstice se trouvoit rempli de lympe. Ainsi la voûte n'existe pas comme corps médullaire triangulaire; seulement les lames médullaires de la cloison se rapprochent entre les couches, sans former pour cela un corps médullaire triangulaire, mais il y a simplement une raye médullaire qui les réunit par embas. Cette réunion des lames de la cloison médullaire transparente par le moyen d'un petit faisceau médullaire, ou d'une raye, se continue de l'extrémité antérieure des couches optiques jusqu'aux jambes antérieures de la voûte, auxquelles, après qu'elles se sont jointes, les lames de la cloison s'attachent & s'incorporent; & dans cet endroit-là, les lames de la cloison ont plus de contiguité entr'elles que dans la partie postérieure où leur distance est plus grande. Aussi est-il difficile de séparer les lames de la cloison l'une de l'autre dans cet endroit. Mais, à mesure que la cloison transparente avance, depuis le bord antérieur des jambes antérieures de la voûte jusqu'à l'extrémité antérieure du corps calleux, les lames de la cloison devenues plus larges s'écartent de nouveau l'une de l'autre, étant divergentes du côté antérieur, de façon qu'à l'extrémité antérieure la distance des lames de la cloison va à un huitième de ponce, ces lames étant revêtues intérieurement & extérieurement de la pie-mère, & très faciles à séparer. Mais plus bas dans la même partie elles se réunissent & deviennent cohérentes au moyen de la substance médullaire, qui existe entre les corps striés dans la partie antérieure des ventricules tricornes. Les lames médullaires de la cloison transparente qui descendent de l'extrémité antérieure du corps calleux, sont donc séparées l'une de l'autre, & cela de façon que leur distance est la plus grande là où elles sont adhérentes au corps calleux, & qu'en continuant depuis ce corps jusqu'aux jambes antérieures de la voûte elles prennent de la convergence. Cette partie de la cloison transparente ne repose pas sur la voûte, mais elle est attachée de la longueur de six lignes ou de plus d'un demi-pouce, depuis les jambes antérieures de la voûte jusqu'à l'extrémité antérieure du corps calleux, à la substance médullaire des lobes antérieurs du cerveau qu'il réunit ici. Ainsi l'extrémité  
anté-

antérieure de la cloison transparente est fermée dans cette partie du cerveau, parce que les lames deviennent ici adhérentes à la partie antérieure du corps calleux, là où il se termine dans la moëlle des lobes antérieurs du cerveau; mais l'extrémité postérieure étant ouverte entre la lame droite & la gauche, laisse un passage à la pie-mère pour arriver à la surface intérieure des lames de la cloison. De cette façon il n'y a point de *psalter*, ou d'espace, où les jambes postérieures de la voûte se réunissent & deviennent cohérentes par des fibres longitudinales médullaires, à moins qu'on ne veuille, en renversant le cerveau, & après avoir coupé les jambes postérieures du cerveau, la cloison transparente demeurant adhérente à la surface inférieure du corps calleux, considérer la chose comme si le corps calleux même représentoit par cet endroit de sa surface la moëlle striée qui se trouve placée entre l'intervalle des lames de la cloison transparente. Il en est de même à l'égard de la voûte, dès qu'on voudra donner le nom de corps médullaire à une partie médullaire solide triangulaire. En effet les lames médullaires de la cloison transparente séparées l'une de l'autre du côté postérieur, en descendant du corps calleux, de part & d'autre au dessus de la surface convexe des couches des nerfs optiques en dehors, depuis le troisième plexus choroïde intermédiaire, prennent une telle expansion, que s'étendant au dessus des couches, à la pointe aigue qui forme leur limite extérieure, elles constituent cette partie du cerveau, qu'on nomme de part & d'autre les jambes postérieures de la voûte, étant continuées dans les corps bordés ou *corpora fimbriata* du cerveau & dans les grandes cornes d'Ammon. Mais, vers la partie antérieure des couches, les lames médullaires de la cloison constituent par embas de part & d'autre un filer médullaire séparé, assez épais, étant seulement réunies plus bas encore par la raye médullaire susdite; de sorte qu'il faut compter deux parties de la voûte, depuis les jambes antérieures jusqu'aux postérieures jointes entr'elles par une petite lame, ou raye médullaire. Leur figure de part & d'autre est triangulaire, l'une des surfaces, savoir l'inférieure étant concave vers les couches des nerfs optiques,



l'autre supérieure répondant à la surface intérieure du corps calleux, où la cloison a une adhérence intérieure ; & la troisième intérieure plus plane, étant continue à la surface interne des lames de la cloison transparente, toutes ces surfaces se regardant l'une l'autre là où elles sont unies entr'elles à l'extrémité de leur bord par la raye médullaires. Sous ces parties de la voûte, au delà de la surface convexe des couches, les plexus choroïdes latéraux sont continués en dedans vers le milieu, comme une pie-mère très vasculaire : ce qui a été parfaitement représenté d'après nature par mon illustre Maître, M. de Haller, dans la seconde Planche du septième Recueil de ses *Icones Anatomicae*. Mais là où les lames de la cloison transparente deviennent cohérentes par embas, près des jambes antérieures de la voûte, & séparées par en haut à leur issue du corps calleux, se trouve l'endroit situé entre l'extrémité antérieure des couches des nerfs optiques & le commencement antérieur de la voûte ; où, sous la voûte, de part & d'autre, au delà des couches, les plexus choroïdes qui descendent, se réunissent ; & c'est là aussi où la lymphe rassemblée dans l'hydropisie des ventricules du cerveau, perce & se fait un passage contre nature des ventricules tricornes dans le troisième ; car il n'y a point là d'ouverture naturelle, ni aucune connexion entre le troisième ventricule, & les grands ventricules dits tricornes. Par le moyen donc de la cloison transparente, l'un des ventricules tricornes est parfaitement séparé de l'autre, de façon qu'il n'y a aucune communication de l'un dans l'autre. Ce qu'on nomme la voûte n'égale pas non plus toute la longueur des ventricules tricornes ; mais cette voûte est plus courte que la cloison transparente d'un demi-pouce ; car cette partie de la cloison qui est entre les jambes antérieures de la voûte, & l'extrémité antérieure du corps calleux, & qui est aussi la partie antérieure de la cloison, repose sur le cerveau, & non sur la voûte.

Par rapport à la largeur de la cloison, ou plutôt à sa hauteur, entre le corps calleux, & la région longitudinale qui est au milieu des grands ventricules, elle n'est pas égale partout ? En effet sa partie antérieure.





rière, entre les couches des nerfs optiques, & l'extrémité antérieure du corps calleux, est constituée par des lames médullaires plus larges qui s'appuyent les unes contre les autres de la largeur de 4 lignes, entre l'extrémité antérieure des couches optiques, & de sept lignes entre l'extrémité antérieure des corps cannelés; au lieu que ces lames sont de 3 lignes & demie entre la convexité des couches & la surface inférieure du corps calleux, & tout à fait courtes de 3 lignes seulement à la partie postérieure; de sorte que, depuis les parties postérieures jusqu'aux antérieures, cette cloison s'élargit toujours davantage de son extrémité postérieure vers sa fin antérieure.

La troisième Observation que j'ajoute aux précédentes, a pour objet l'origine du nerf mol de la septième paire, ou de celui des nerfs du cerveau qu'on nomme acoustique. Les Savans les plus versés dans la connoissance du corps humain, ont été jusqu'ici, par rapport à l'origine de ce nerf, dans l'idée que cette portion molle de la septième paire des nerfs du cerveau procédoit du quatrième ventricule du cerveau, renfermé dans le cervelet & dans la moëlle allongée, par des fibres médullaires blanches, qui sortoient transversalement de ce qu'on nomme dans ce ventricule *calamus scriptorius*, ou *raye longitudinale*; lesquelles fibres diffèrent en nombre & en grandeur, & forment, suivant cette hypothèse, en avançant extérieurement vers le haut, le nerf mol qui n'en est qu'une continuation. Cette discussion m'a engagé à considérer la chose plus attentivement dans un grand nombre de cerveaux d'insensés, qui sont plus durs que les autres. Il est vrai que cette substance tout à fait molle du nerf acoustique, se soustrait presque entièrement aux recherches les plus exactes dans les cerveaux d'une constitution naturelle, & qu'au moindre attouchement elle s'écoule avec tant de facilité, que la découverte de l'origine & du progrès de ce nerf dépend moins de l'industrie de celui qui s'y applique que de la nature & de l'état du cerveau. En y regardant donc de plus près dans les cerveaux que j'ai indiqués, j'ai observé que ce nerf mol de la septième paire tiroit principalement son origine du bord postérieur du pont du Varole, ou plutôt des péduncules du cervelet;



mais par un filet différent & séparé de la portion dure de ce nerf acoustique, en sorte que la portion molle étant la plus proche du cer-  
 veler sort par une origine large du pédoncule du cervelet qui consti-  
 tue le pont de Varole, & qu'à la distance d'une ligne, ou de la dixie-  
 me partie d'un pouce, la portion plus petite, qu'on appelle dure,  
 procede de la partie la plus voisine de la moëlle allongée du bord  
 postérieur du pont de Varole. Je conserve plusieurs semblables cer-  
 veaux dans de l'esprit de vin; & leur inspection suffit pour mettre  
 sous les yeux la vérité de ce que j'avance. La Figure ci-jointe, tra-  
 cée d'après nature, désigne de la maniere la plus exacte cette origine  
 de la portion molle Lett. A, & celle de la portion dure Lett. B. Mais  
 j'ai vu le *calamus scriptorius* du quatrieme ventricule, quelquefois tout  
 à fait dépourvu de fibres blanches transversales, & dans d'autres ces  
 fibres se terminant dans la moëlle allongée même, tandis qu'il y en a  
 qui se réfléchissent autour de cette moëlle, & parviennent jusqu'à l'en-  
 droit des pédoncules du cervelet, d'où ce nerf mol tire de part &  
 d'autre son origine.

## EXPLICATION DES FIGURES

### Figure I.

Représentation de quelques parties du cerveau, depuis le côté antérieur, ou le  
 front, jusqu'au côté postérieur.

A, La glande pinéale, dans sa situation naturelle, au dessus des *nases*, derriere la  
 commissure postérieure du cerveau.

B, La commissure postérieure du cerveau.

C, La lame médullaire blanche qui lie la base de la glande pinéale avec cette com-  
 missure.

DD. Les pédoncules de la glande pinéale.

EE. Les *nases*,

FF. Les *testes*.

G. La raye transversale du cerveau.

a, l'origine du nerf de la quatrieme paire de cette raye transversale.

H. La grande valvule du cerveau.

II, Les couches des nerfs optiques.

Fig. I.



Fig. II.



Fig. III.




*Fig. 1.*




*Fig. II.*





*Fig. III.*





- K, Le lobe vermiforme du cervelet.  
 LL, Partie des lobes latéraux du cervelet.  
 M, Le troisième ventricule.

### Figure II.

Représentation de l'état de quelques parties du cerveau vu par derrière, c'est à dire, de l'occiput vers le front.

- A, La glande pinéale renversée de derrière en devant, & soulevée des *nates* vers le ventricule, de façon que la lame qui la joint avec la commissure s'offre d'autant mieux aux regards.  
 B, La commissure postérieure du cerveau.  
 C, La lame médullaire qui descend de la base de la glande pinéale dans cette commissure.  
 DD, Les peduncules de la glande pinéale recourbés avec la glande.  
 EE, Les *nates*, auxquelles la glande pinéale tient naturellement, vues à nud.  
 FF, Les *testes*.  
 G, La raye transversale du cerveau.  
 a, L'issue du nerf de la quatrième paire de cette raye.  
 H, La grande valvule du cerveau.

Le reste comme dans la Figure précédente.

### Figure III.

- A, L'origine du nerf mol de la septième paire.  
 B, L'issue du nerf dur de la septième paire.  
 C, Le nerf de la cinquième paire.  
 D, Le pont de Varole.  
 E, Les peduncules du cervelet qui par leur concours forment ce pont.  
 F, La moëlle allongée.  
 GG, Les corps pyramidaux de la moëlle allongée.  
 HH, Ses corps olivaires.  
 II, L'issue du nerf de la huitième paire.  
 KK, Les fibres du nerf de la neuvième paire.  
 LL, Partie des lobes du cervelet.







# M É M O I R E

S U R

LA RÉSISTANCE DES FLUIDES AVEC LA SOLUTION  
DU PROBLEME BALISTIQUE.

P A R M. L A M B E R T.

---

§. 1.

**L**a théorie du mouvement des corps dans un milieu résistant est un de ces sujets, dont la physique nous présente un grand nombre. Elle est d'une utilité manifeste, puisque la perfection de l'art de jeter les bombes en dépend. Elle est compliquée dans ses principes, puisque les milieux étant supposés fluides, il faudroit avoir égard au mouvement de chaque particule du fluide, dont on cherche la résistance. Et si, en n'en considérant que la somme, on parvient à découvrir une loi, sinon exacte à toute rigueur, du moins tolérable en ce qu'elle ne s'écarte pas considérablement de l'expérience, on est encore bien éloigné du but auquel on se propose de parvenir. Il s'agit d'y appliquer le calcul, afin d'en tirer des formules simples & facilement applicables: difficulté, qu'il n'est pas si facile de surmonter. Et quand même on pourroit le faire, il s'agit encore de vérifier par des expériences les conséquences & les règles, que le calcul nous fournit. Car les principes employés pour cet effet, n'étant vrais qu'à peu près ou en gros, on court risque que ce qu'on en déduit par le calcul, s'éloigne encore d'avantage de la parfaite précision à laquelle il faudroit pouvoir parvenir.

§. 2. Je ne retracerai pas ici l'histoire de ce qu'on a fait à cet égard. On sait qu'un corps pesant étant projeté obliquement dans un espace vuide d'air avec une vitesse quelconque, parcourt une parabole,





bole, & qu'il affecte pour ainsi dire de parcourir cette courbe dans l'air même, dès qu'il ne se meut pas avec une très grande vitesse, & que la gravité spécifique surpasse celle de l'air plusieurs centaines de fois. En effet, la densité de l'air étant si peu considérable, il est aisé d'en conclure, que la résistance ne sauroit être fort grande. Mais, comme cette résistance s'augmente en raison du quarré de la vitesse, ou peut être encore plus fortement, elle devient très grande dans le cas où la vitesse égale celle des bombes & des boulets de canon. De là vient que les regles qu'on donne pour les jets paraboliques, ne sont d'aucun usage pour l'artillerie, & que, si elles ont quelque élégance, on ne peut les considérer que comme des propriétés remarquables des paraboles. C'est dommage en effet qu'on ne puisse les y employer, & qu'il faille y substituer des formules, qui n'offrent que des quantités logarithmiques, circulaires ou transcendentes, de façon qu'il faut se contenter, quand on peut parvenir à les exprimer par des suites infinies, qui soient encore passablement convergentes. On peut juger des difficultés qui s'y rencontrent, dès qu'on fait que *Newton*, après avoir donné les principes & les regles pour les cas les plus simples, abandonna la solution du problème principal; que feu M. *Jean Bernoulli* ne la donna que sous la condition de *concessis quadraturis*; & que M. *Euler*, au lieu de donner les formules intégrales, se contenta d'une approximation, en substituant des lignes droites aux petites parties de l'arc, que la bombe parcourt, & en substituant de la sorte à la véritable courbe une espece de poligone, dont on pouvoit déterminer la longueur & la position de chaque côté, du moins à très peu près.

§. 3. A ces difficultés qu'offre le calcul, se joignent celles qu'on rencontre dans l'examen des principes & dans la maniere de les examiner par des expériences. On est assez généralement d'accord, que la résistance est en raison du quarré des vitesses, mais on ne se rencontre pas sur la question, s'il faut prendre ce quarré double ou simple, & si pour les grandes vitesses il ne faut pas encore y joindre le rapport du cube, du biquarré, ou de quelques puissances plus élevées

vées de la vitesse. S'il étoit facile de faire & de varier les expériences de toutes les façons qu'on pourroit souhaiter, cette difficulté seroit bientôt levée. On n'auroit qu'à exprimer l'effet de la résistance par une suite, qui procède suivant toutes les dimensions ou puissances de la vitesse, & en déterminer les coefficients, & par ce moyen on auroit cet effet tel qu'il est du à toutes les causes qui peuvent y influer. De la sorte il ne resteroit plus à surmonter que les difficultés & les embarras du calcul.

§. 4. Mais ces sortes d'expériences ne sont pas si faciles à faire. On laissa tomber des boules & des vessies fort légères du haut d'une tour, & on observa le tems de la chute. Ce tems & la hauteur étant donnés, de même que le volume & le poids de la boule, on en déduisit le coefficient, qui divise ou multiplie le quarré de la vitesse. Mais cette vitesse n'étant pas fort grande, on reste en doute, si pour des vitesses plus considérables ce seul coefficient suffit. Les expériences faites à Petersbourg ne décident point cette question. On tira avec différentes charges un boulet d'un canon verticalement élevé, & on compta les secondes de tems, que le boulet employoit à monter & descendre. Ce tems ne pouvoit donner tout au plus que la vitesse initiale; & pour la trouver, il falloit supposer, que la résistance de l'air suit le quarré des vitesses. Si on avoit pu observer séparément le tems de la montée, celui de la chute, & la hauteur à laquelle le boulet parvint, il y auroit eu moyen d'examiner, si le quarré de la vitesse suffit, ou bien s'il faut employer le cube, le biquarré &c. Peut-être pourroit-on refaire cette expérience, en élevant un mortier verticalement, & en ne le chargeant que d'un boulet de bois ou d'une autre matière fort légère, & sur laquelle la résistance de l'air ait plus de prise. Mais l'expérience qui fut faite ici le 15 Juin de l'année passée a beaucoup plus d'avantages, si elle peut être faite avec plus de soin, & si on arrange d'avance les préparatifs, qu'elle exige. Comme par là on peut déterminer autant de points que l'on veut, de la courbe que la bombe parcourt, il sera ensuite facile d'en déduire le tems & la vitesse pour chaque point de la courbe. Il seroit même possible de fai-



re en sorte, qu'un certain nombre de ces expériences étant fait, on en puisse immédiatement déduire des tables pour l'usage des bombardiers. Car chaque courbe déterminée de cette façon tient lieu de toutes celles où la bombe, sous un moindre angle d'élévation, auroit eu un degré déterminé de vitesse.

§. 5. Ces remarques préliminaires font voir, à peu près, où nous en sommes, & qu'il n'est pas si hors de propos de reprendre depuis les premiers commencemens la théorie dont il est ici question. Il s'y joint encore une autre raison, qui me détermine à en agir de la sorte. Car, en employant les mêmes lettres dans tous les calculs que je vais exposer, on se trouvera mieux en état de faire la comparaison des différens cas que cette théorie présente, & de voir jusqu'où ceux qui sont plus compliqués peuvent se réduire aux plus simples. Je tâcherai de rendre cette comparaison plus facile en ce que je ne me bornerai pas à ne donner que des formules algébriques, mais qu'après les avoir exposées, je les traduirai dans le langage ordinaire, toutes les fois qu'elles auront quelque élégance susceptible d'une semblable traduction, ou que je pourrai les raccourcir & les simplifier jusqu'à leur donner cette élégance.

§. 6. Soit donc AB une ligne droite dans laquelle se meuve un corps sphérique. Que la vitesse initiale en A soit  $\equiv G$ , que le corps dans un tems  $\equiv \tau$  soit parvenu en P, & que la vitesse qui lui reste encore soit  $\equiv c$ . Soit enfin l'espace parcouru AP  $\equiv x$ . La vitesse en P étant  $\equiv c$ , le corps pourroit parcourir dans un tems infiniment petit  $d\tau$ , l'espace Pq. Mais, comme il est retardé par la résistance du milieu, il ne parcourt en effet que l'espace Pp, qui sera par conséquent  $\equiv dx$ . Or l'effet de la retardation, qui est  $\equiv pq \equiv ddx$ , est proportionel au quarré de la vitesse. Car, pour aller du plus simple au plus composé, je m'en tiendrai à cette condition dans les premiers calculs que je vais proposer. Nous aurons donc  $\dots ddx \propto cc$ , & pour réduire cette analogie à l'égalité, nous introduirons un coëfficient  $a$  tel qu'il soit

$$\dots ddx = ccd\tau^2 : a.$$

Planche III.  
Fig. 1.



§. 7. Je remarquerai d'abord, que cette équation se réduit à des nombres absolus, quand on fixe les unités auxquelles les lettres  $x$ ,  $c$ ,  $\tau$  se rapportent. J'exprimerai donc les tems  $\tau$  en minutes secondes, les espaces parcourus  $x$  en pieds du Rhin, & les vitesses  $c$  par les espaces qu'un corps mu uniformément avec ces vitesses pourroit parcourir en une minute seconde de tems. Ce qui étant établi, il s'ensuit que la lettre  $a$  exprime une ligne droite, & que par là même elle pourra être comparée avec le diamètre du corps dont il s'agit de calculer le mouvement. La suite du calcul nous donnera lieu de la rendre intelligible encore de diverses autres façons.

§. 8. Reprenant donc l'équation

$$— ddx = cc d\tau^2 : a,$$

nous pourrons exprimer l'espace  $ddx$  encore d'une autre maniere. Car il est

$$dx = cd\tau,$$

& partant

$$ddx = dc d\tau,$$

ce qui étant substitué nous donne

$$— dc. d\tau = cc d\tau^2 : a,$$

ou bien

$$— \frac{dc}{cc} = \frac{d\tau}{a},$$

d'où on tire l'intégrale

$$\frac{a}{c} — \frac{a}{G} = \tau.$$

La constante  $a : G$  est telle que  $\tau$  soit  $= 0$ , lorsqu'il est  $c = G$ .

§. 9. Cette formule, qui exprime le rapport entre le tems & la vitesse, nous fait voir que ce rapport est simplement réciproque, & que, quand même la vitesse initiale  $G$  seroit infinie, il ne faudra qu'un



qu'un tems fini  $a : c = \tau$ , pour qu'elle devienne aussi petite que l'on voudra. Le changement des grandes vitesses étant donc si rapide, il s'ensuit, comme nous l'avons remarqué ci-dessus, que la résistance du milieu n'est pas une chose dont on puisse faire abstraction, sans s'assurer préalablement de la quantité de son effet.

§. 10. L'équation trouvée

$$-\frac{dc}{cc} = \frac{d\tau}{a},$$

se change sans peine en

$$-\frac{dc}{c} = \frac{cd\tau}{a} = \frac{dx}{a},$$

ce qui donne l'intégrale

$$\log \frac{G}{c} = \frac{x}{a}.$$

Cette formule, qui exprime le rapport entre la vitesse & l'espace parcouru, fait voir que la vitesse décroît en progression géométrique tandis que l'espace parcouru croît en progression arithmétique. On auroit pu commencer le calcul par cette considération. Car le corps parcourant l'espace  $dx$ , rencontre le même nombre d'obstacles, quand on suppose cet espace partout égal ou constant, & chaque obstacle lui ôte d'autant plus de sa vitesse, plus cette vitesse est grande. On déduit cette proportion également des formules que l'on donne pour le choc des Corps, quand on considère le fluide ou le milieu résistant comme un assemblage de petits globules, comme l'a fait M. Jean Bernoulli dans sa *Dissertation sur le mouvement &c.*

§. 11. Il nous reste encore à trouver le rapport entre le tems & l'espace parcouru. Ce rapport se déduira aisément des deux formules intégrales trouvées

$$\frac{a}{c} - \frac{a}{G} = \tau,$$

$$\log \frac{G}{c} = \frac{x}{a}.$$



Car la première donne

$$\frac{G}{c} = \frac{G\tau}{a} + 1,$$

d'où l'on tire

$$\frac{x}{a} = \log \left( \frac{\tau G}{a} + 1 \right),$$

$$\& \frac{G\tau}{a} = e^{x:a} - 1,$$

en prenant  $\log e = 1$ .

§. 12. Il seroit à souhaiter qu'on pût imaginer des expériences, pour examiner les formules que nous venons de trouver. Elles ne renferment d'autre inconnue que la lettre  $a$ , qui divise le quarré des vitesses dans les formules différentielles, & qui dans les formules intégrales devient encore significative d'une autre façon. Car dans celle du §. 8.

$$\frac{a}{c} - \frac{a}{G} = \tau,$$

elle désigne la vitesse, que le corps, après avoir commencé à être mu avec une vitesse infinie, a encore de reste après la première seconde de tems. Au contraire dans la formule du §. 10.

$$\frac{x}{a} = \log \frac{G}{c},$$

la lettre  $a$  dénote la sous-tangente de la logarithmique, dont les ordonnées représentent la vitesse du corps pour chaque point de l'espace parcouru. Dans ce cas cette lettre est la mesure absolue de la force de la résistance, puisqu'elle dénote l'espace que le corps pourroit parcourir, si la vitesse continuoit de décroître dans chaque petit espace  $dx$  de la même quantité, dont elle a diminué dans le premier espace  $dx$ .





§. 13. Mais, comme le mouvement horizontal rectiligne s'altère subitement par la pesanteur, il n'y a pas moyen d'en rester à ces formules; mais, en introduisant dans le calcul l'action de la gravité, il s'agit d'en trouver d'autres pour le cas où le corps monte ou tombe dans une ligne verticale. Ce cas est encore assez simple, puisque le mouvement restant droit, on évite l'embarras qui naît de la déviation, qui se rencontre & se change continuellement dans le mouvement oblique. Je vais donc examiner ce cas en sorte qu'on puisse parvenir à le comparer avec le précédent, & à définir la valeur de la lettre  $a$  par une espèce de théorie aussi bien que par des expériences.

§. 14. Soit donc la verticale AB. Que le corps commence à tomber en A, & qu'après  $\tau$  secondes de tems il se trouve en P, de sorte que l'espace parcouru soit  $AP = x$ . La vitesse en P soit  $= c$ . Cette vitesse croîtra par l'action de la gravité, & au contraire elle sera diminuée par la résistance du milieu. Il s'agit donc de voir, quel est l'un & l'autre de ces deux effets pendant le tems  $d\tau$ , dans lequel le corps continue de tomber par le petit espace  $Pp = dx$ . Je remarquerai en conséquence, que l'effet de la résistance se détermine par la formule du §. 10. Fig. 2.

$$-\frac{dc}{c} = \frac{dx}{a},$$

car il sera  $= cdx : a$ . Au contraire l'effet de la gravité se trouve, quand on cherche la hauteur  $\xi$  par laquelle un corps doit tomber dans le vuide pour acquérir la vitesse  $c$ . Nommant donc  $\frac{1}{2}g$  l'espace de la chute d'un corps, qui répond à une seconde de tems, la lettre  $g$  fera de  $31\frac{1}{4}$  pieds du Rhin dans le vuide, mais dans un fluide il faudra la diminuer dans le même rapport que le poids du corps y diminue. Or les loix de la gravité nous fournissent la formule

$$c = V(2g\xi),$$

d'où l'on tire la différentielle

$$dc = g d\xi : V(2g\xi),$$

O 3

ou



ou bien

$$dc = \frac{g d\xi}{c},$$

Pofant donc

$$d\xi = dx,$$

on aura l'effet ou l'accélération due à la gravité

$$= \frac{g dx}{c}.$$

Et, en fouftraiant de cet effet celui qui eft du à la réfiftance, on aura l'accroiffement de la viteffe

$$dc = \frac{g dx}{c} - \frac{c dx}{a},$$

ce qui donne

$$\frac{c dc}{ga - cc} = \frac{dx}{a},$$

& partant l'intégrale

$$\frac{2x}{a} = \log \frac{ag}{ag - cc},$$

$$c = \sqrt{ag} \cdot \sqrt{(1 - e^{-2x/a})}.$$

D'où l'on voit, que  $c$  ne fauroit devenir plus grand que la racine quarrée de  $ag$ , & que par conféquent cette racine dénote la viteffe terminale, à laquelle le corps pourroit parvenir, fi la chute fe continuoit à l'infini. Nous nommerons cette viteffe  $C$ , & il paroît qu'elle eft la moyenne proportionnelle entre  $g$  &  $a$ .

§. 15. En reprenant l'équation

$$\frac{dx}{a} = \frac{c dc}{ag - cc},$$



nous la transformerons en

$$\frac{dc}{ag - cc} = \frac{dx}{ac} = \frac{d\tau}{a},$$

ce qui donne l'intégrale

$$\frac{2\sqrt{g}}{\sqrt{a}} \cdot \tau = \log \frac{\sqrt{ag} + c}{\sqrt{ag} - c},$$

ou bien

$$\frac{2C}{a} \cdot \tau = \log \frac{C + c}{C - c},$$

d'où l'on tire réciproquement

$$c = C \cdot \frac{e^{2\tau C/a} - 1}{e^{2\tau C/a} + 1}.$$

§. 16. Egalant enfin cette quantité à celle que nous avons trouvée ci-dessus (§. 14.)

$$c = C \cdot \sqrt{1 - e^{-x/a}},$$

nous en tirerons

$$e^{\tau C/a} = e^{x/a} + \sqrt{e^{2x/a} - 1},$$

& réciproquement

$$2e^{x/a} = e^{\tau C/a} + e^{-\tau C/a}.$$

§. 17. Voilà donc toutes les formules dont on pourra avoir besoin pour déterminer le tems, ou l'espace, ou la vitesse d'un corps, qui tombe dans un milieu résistant. Pour trouver des formules applicables aux cas où le corps est jeté verticalement en haut, il suffira de remarquer, que dans ces cas la gravité & la résistance contribuent l'une & l'autre à diminuer la vitesse. En revenant donc à ces deux effets

effets déterminés dans le §. 14. il suffira de les faire l'un & l'autre soustractifs, & nous aurons, en accentuant la lettre  $c$ ,

$$-dc' = -\frac{gdx}{c'} - \frac{c'dx}{a}.$$

Mais, avant que de passer à l'intégration de cette équation, nous la comparerons à celle que nous avons trouvée pour la descente (§. 14.) & qui est

$$dc = \frac{gdx}{c} - \frac{cdx}{a}.$$

Ces deux équations se transforment facilement en les deux suivantes

$$acdc = agdx - cc dx$$

$$ac'dc' = agdx + c'dc' dx,$$

donc en soustrayant l'une de l'autre, on aura

$$ac'dc' - acdc = (c'dc' + cc) dx,$$

& partant

$$\frac{dx}{a} = \frac{c'dc' - cdc}{c'dc' + cc},$$

équation, qui exprime la hauteur  $x$  par les deux vitesses  $c$ ,  $c'$ , qui lui répondent. Elle ne semble pas être intégrable. Mais nous allons d'abord voir, qu'on peut lui substituer la suivante

$$\frac{dx}{a} = \frac{c'dc'}{c'c'} - \frac{cdc}{cc}.$$

§. 18. Reprenons pour cet effet les deux équations

$$dc' = \frac{gdx}{c'} + \frac{c'dx}{a},$$

$$dc = \frac{gdx}{c} - \frac{cdx}{a},$$

&

& nous en tirerons

$$\frac{dx}{a} = \frac{cdc}{ag - cc} = \frac{c'dc'}{ag + c'c'}$$

& partant

$$agcdc + c'c'dc' = agc'dc' - cc'cd'$$

ce qui donne

$$c'dc'dc' + cc'cd' = ag(c'dc' - cdc)$$

d'où l'on tire l'intégrale

$$c'c'cc = agc'c' - agcc$$

$$c'c' = \frac{agcc}{ag - cc}$$

$$cc = \frac{agc'c'}{ag + c'c'}$$

Ces équations font voir, que la vitesse du corps en montant étant donnée, on en trouve immédiatement la vitesse qu'il a en retombant au même point de la hauteur P. Soit AD la vitesse terminale C (§. 14.) AB la vitesse en montant, la perpendiculaire AE du triangle rectangle DAB fera la vitesse en descendant. Fig. 3.

§. 19. L'équation trouvée

$$c'c'cc = agc'c' - agcc$$

se change en

$$\frac{1}{ag} = \frac{1}{cc} - \frac{1}{c'c'}$$

d'où l'on tire la différentielle

$$\frac{dc}{ccc} = \frac{dc'}{c'c'c'}$$

ou bien

$$0 = \frac{c^2 c' dc'}{c'c'} - \frac{c'c'cdc}{cc}$$



Or, en ajoutant de part & d'autre  $c' dc' - c dc$ , on obtient

$$c' dc' - c dc = c' dc' + \frac{c^2 c' dc'}{c' c'} - \frac{c' c' c dc}{c c} - c dc$$

ce qui donne

$$\frac{c' dc'}{c' c'} - \frac{c dc}{c c} = \frac{c' dc' - c dc}{c' c' - c c} = \frac{dx}{a} \quad (\S. 17.)$$

d'où l'on tire

$$\frac{dx}{a} = \frac{dc'}{c'} - \frac{dc}{c}$$

$$\frac{x}{a} = \log \frac{c'}{c}.$$

Fig. 2.

§. 20. Cette formule est assez remarquable en ce qu'elle nous met en état de comparer le mouvement vertical d'un corps avec son mouvement horizontal. Car la vitesse initiale  $c$  est à la vitesse qu'il a en retombant, dans le même rapport que si le corps dans le même milieu résistant avoit parcouru la droite  $AP = a$ . (§. 10.) On en tire facilement la conséquence, que, dans le cas où le corps monte & retombe, l'action de la gravité ne fait que redoubler le chemin parcouru, & changer la direction du mouvement.

§. 21. Mais revenons maintenant à l'équation différentielle

$$dc = \frac{g dx}{c} + \frac{c' dx}{a}$$

que nous avons trouvée (§. 17.) pour le cas, où le corps monte. Elle se transforme en

$$\frac{c' dc'}{ag + c' c'} = \frac{dx}{a}$$

d'où nous tirons l'intégrale

$$\frac{2x}{a} = \log \frac{ag + c' c'}{ag}$$

&





& réciproquement

$$c' : C = \sqrt{(e^{2x:a} - 1)}$$

§. 22. Or nous avons (§. 14.) pour la chute:

$$c : C = \sqrt{(1 - e^{-2x:a})}$$

donc il est

$$c' : c = e^{x:a}$$

$$x : a = \log \frac{c'}{c}.$$

tout comme dans le §. 19.

§. 23. La même équation

$$\frac{c' dc'}{ag + c'c'} = \frac{dx}{a}$$

nous donne

$$\frac{dc'}{ag + c'c'} = \frac{dx}{c'a} = \frac{d\tau}{a}$$

dont l'intégrale est

$$\frac{\tau C}{a} = \text{Arc. tang } \frac{c'}{C}$$

& réciproquement

$$\frac{c'}{C} = \text{tang Arc. } \frac{\tau C}{a}.$$

§. 24. Après avoir trouvé le tems de la montée & celui de la descente, nous tâcherons d'en exprimer la somme de la manière la plus simple qu'il sera possible, par la vitesse  $c'$  avec laquelle le corps commence à monter. Faisons d'abord la tangente

$$\frac{c'}{C} = \cot 2\omega, \text{ ou bien } \frac{C}{c'} = \text{tang } 2\omega$$

& l'équation (§. 18.)

$$c c = \frac{C C c c'}{C C + c c'}$$

étant changée en

$$\frac{c c}{C C} = \frac{c c' : C C}{1 + c c' : C C}$$

se transformera en

$$\frac{c c}{C C} = \frac{\cot 2 \omega^2}{\operatorname{cof} 2 \omega^2} = \cot 2 \omega^2$$

d'où l'on tire

$$\frac{c}{C} = \cot 2 \omega.$$

Mais le tems de la descente est (§. 15.)

$$\frac{2 \tau C}{a} = \log \frac{1 + c : C}{1 - c : C}$$

ce qui donne

$$\frac{2 \tau C}{a} = \log \frac{1 + \cot 2 \omega}{1 - \cot 2 \omega} = \log \cot \omega^2$$

& partant

$$\frac{\tau C}{a} = \log \cot \omega$$

Au contraire, le tems de la montée étant (§. 23.)

$$\frac{\tau C}{a} = \operatorname{Arc. tang} \frac{c'}{C}$$

nous aurons, en posant  $\pi = 3,1415926 \dots$  &c.

$$\frac{\tau C}{a} = \frac{1}{2} \pi - 2 \omega$$



Par conséquent la somme de l'un & de l'autre tems étant exprimée par T, il fera

$$T = \left( \frac{1}{2} \pi - 2 \omega + \log \cot \omega \right) \cdot \frac{a}{C}$$

Il est presque superflu d'avertir, que dans cette formule il faut entendre les logarithmes hyperboliques, & prendre le rayon du cercle égal à l'unité.

§. 25. Comparons encore le tems de la montée avec la hauteur à laquelle le corps parvient avant que de retomber. Pour cet effet nous avons (§. 23. 21.)

$$c' : C = \text{tang Arc. } \frac{\tau C}{a}$$

$$\frac{2x}{a} = \log \left( 1 + \frac{c' c'}{CC} \right)$$

d'où nous tirons

$$\frac{x}{a} = \log. \sec. \text{Arc. } \frac{\tau C}{a}.$$

Et puisqu'il est (§. 24. 23.)

$$\frac{c'}{C} = \cot 2 \omega = \text{tang. Arc. } \frac{\tau C}{a}$$

il fera

$$\frac{x}{a} = \log. \text{cosec } 2 \omega.$$

Donc le même arc  $2 \omega$ , qui est tel que  $\cot 2 \omega = c' : C$ , suffit pour trouver d'une manière fort facile, & la hauteur  $x$ , & la somme du tems de la montée & de la descente, ou bien chacun séparément.

On trouvera facilement, que dans le triangle ADB cet arc  $2 \omega$  est Fig. 3. l'angle B, & que, tandis qu'il est

$$c' : C = \cot 2 \omega,$$



il fera  $c : c' = \sin 2 \omega$  &  $c : C = \cos 2 \omega$   
 puisqu'en faisant

$$A D = C,$$

$$A B = c'$$

il est

$$A E = c \quad (\S. 18.)$$

§. 26. Nous allons maintenant déterminer la valeur de la lettre  $a$ , que nous avons employée dans tout ce calcul, & que nous employerons encore dans les suivans. La remarque que nous avons faite au §. 14. que la vitesse terminale d'un corps tombant est la racine quarrée de  $ag$ , ou qu'il est

$$ag = C C,$$

nous met en état de comparer cette vitesse & la résistance qui lui est due avec l'action de la gravité, qu'exprime la lettre  $g$ , qui dénote la vitesse qu'un corps tombant dans le vuide acquerrait dans la première seconde de tems, si sa gravité étoit égale à celle qu'il a lorsqu'il est plongé dans le fluide. (§. 14.) Il est clair, que si la vitesse terminale  $C$  pouvoit être trouvée immédiatement par des expériences, on n'auroit qu'à diviser son quarré  $CC$  par  $g$ , & on trouveroit la valeur de la lettre  $a$ , sans avoir besoin d'entrer dans d'autres recherches. Mais, comme un corps tombant n'acquiert cette vitesse que lorsqu'il tombe d'une hauteur infinie dans le même milieu, cette expérience n'est pas faisable. Cependant, quand on connoit à peu près cette vitesse, il ne seroit pas impossible de jeter le corps en bas avec une force qui lui donne d'abord une vitesse approchante, & il est clair que le corps en continuant de tomber s'approchera d'avantage de la vitesse  $C$ , que l'on cherche.

§. 27. Mais nous pourrons nous y prendre de diverses autres manieres. Je remarque en conséquence, que le tems & le lieu ne changeant rien dans les choses, la résistance & son effet restent les mêmes,



mêmes, soit que le corps se meuve dans le milieu résistant, ou que ce milieu se meuve contre le corps reposant. Il est clair qu'en employant une certaine force, on pourra retenir ce corps en sorte que le mouvement du milieu ne l'entraîne point, & qu'il y aura un équilibre tel que, pour peu qu'on relâche de cette force, le corps commence à être entraîné. Substituons à cette force un poids qui lui soit égal, & nous pourrons par là estimer l'effort du fluide par celui de la pesanteur.

§. 28. Afin de rendre cette comparaison moins compliquée, nous supposerons la vitesse du fluide, ou du milieu résistant, égale à celle que le corps acquerrait en tombant dans ce milieu d'une hauteur infinie. Cette vitesse est telle, que si le corps est poussé en bas avec une force qui la lui procure, elle n'est, ni augmentée par l'action de la gravité, ni diminuée par la résistance du milieu dans lequel le corps tombe, & que par conséquent l'action de la gravité est parfaitement égale à celle de la résistance.

§. 29. Soit maintenant CDE un tuyau recourbé, & ouvert Fig. 4.  
en C & E, de sorte que l'une & l'autre ouverture soit égale. Que par le canal AB il tombe continuellement une colonne d'eau, ou du fluide résistant, sur l'ouverture C, on fait qu'elle remplira le tuyau CDE jusqu'à la hauteur E, qui est de niveau avec B. La colonne BC en tombant acquiert une vitesse, que nous appellerons C, & qui répond à la hauteur BC, en sorte que  $BC = \frac{CC}{2g}$ . Or, quel que soit l'effort dû à cette vitesse, il est clair que le simple poids de la colonne DE y maintient l'équilibre. Cet équilibre aura lieu de quelque manière que ce poids soit appliqué. Il suffit que sa réaction soit directement opposée à l'action de la colonne BC, ou que, si elle ne l'est pas, ou pas tout à fait, on en tienne compte.

§. 30. Supposons donc un levier horizontal appuyé sur A, Fig. 5.  
& chargé des deux cylindres égaux C, D, ce levier restera en équilibre.

bre. Qu'il tombe maintenant sur C une colonne d'eau, ou du fluide résistant, qui ne soit ni plus ni moins large que ne l'est le cylindre; il est clair que, pour ne point voir l'équilibre levé, il faudra contrebalancer l'action de cette colonne par un poids E, & ce poids sera égal à celui de toute la colonne B, entant que sa hauteur est CB, & la base égale à celle du cylindre C.

§. 31. Mais si, au lieu du cylindre C, on l'avoit placé en C une boule, l'action de la colonne BC y auroit eu moins de prise, puisque la boule l'auroit fendue plus facilement. La théorie de la percussion oblique nous fait voir que, dans ce cas, le poids E qui contrebalance l'action de la colonne BC se réduit à la moitié, & que par conséquent il est égal à celui de la colonne CF, dont la hauteur est  $= \frac{1}{2} BC$ , & la base égale à la surface du plus grand cercle de la boule.

§. 32. Voilà donc l'action du fluide comparée à celle de la gravité. Nous avons vu ci-dessus, que l'une & l'autre est égale dans le cas où la vitesse du fluide en C est la même que celle que le corps acquerrait dans ce fluide en tombant d'une hauteur infinie, si son poids ou sa gravité n'étoit point diminuée par celle du fluide. Si donc cette vitesse est  $= C$ , & qu'on fasse  $\gamma = 31\frac{1}{4}$  pieds du Rhin, c'est à dire, égal à la gravité absolue du corps, la hauteur de la colonne CB sera  $= \frac{CC}{2\gamma}$ , & partant  $CF = \frac{CC}{4\gamma} = \frac{a}{4}$ . (§. 26.)

De la sorte une colonne du fluide, dont la hauteur est  $\frac{a}{4}$ , & la base égale à la surface du plus grand cercle de la boule qui s'y meut, cette colonne, dis-je, est du même poids que la boule. Or, ce poids étant donné, nous pourrions nous en servir pour déterminer la valeur de  $a$ .

§. 33. Soit le poids de la boule  $= P$ , celui d'un globe du fluide d'un égal volume: soit  $P:D$ , la densité ou la gravité spécifique du





du globe étant posée  $D$  fois plus grande que celle du fluide. Soit le demi-diamètre de la boule  $= r$ ; & nous aurons le poids d'un cylindre du fluide circonscrit à la boule  $= 3 P : 2 D$ , le nombre de ces cylindres dans la colonne  $\frac{1}{4} a$  sera  $= a : 8 r$ ; par conséquent leur poids  $= 3 P a : 16 D r$ . Or, ce poids étant égal à celui de la boule, nous aurons

$$3 a P : 16 r D = P$$

d'où l'on tire la valeur de la lettre

$$a = \frac{16}{3} r D.$$

Cette valeur se définit donc en chaque cas par le demi-diamètre de la boule, & par le rapport de la gravité spécifique de la boule & du fluide.

§. 34. Il est cependant assez ordinaire, que l'on connoît plus aisément le poids de la boule que sa gravité spécifique, quoique celle-ci en puisse être trouvée, dès que l'on fait le diamètre de la boule. Afin donc d'abrégier ce calcul, nous déterminerons en nombres absolus le poids d'une boule d'eau du même diamètre. Supposons qu'un pied cubique d'eau, mesure de Paris, pèse 70 livres poids de marc, le pied cubique, mesure du Rhin, dont nous nous servirons dans ce discours, ne pèsera que  $63\frac{1}{2}$  lb. Si donc nous mettons pour base une boule d'eau, dont le diamètre est d'un pied de Rhin, ces  $63\frac{1}{2}$  livres seront encore diminuées dans le rapport de 21 à 11. De là nous aurons le poids de cette boule  $= \frac{11}{21} \cdot 63\frac{1}{2} = 33\frac{1}{4}$  livres, poids de marc. Si donc le poids & le diamètre d'une boule quelconque est donné, on la réduira aisément à une boule, dont le diamètre est un pied du Rhin, & on en trouvera le poids, en observant qu'il faut l'augmenter ou le diminuer en raison du cube des diamètres. Ce poids étant trouvé, on le comparera avec les  $33\frac{1}{4}$  livres, que pèse une boule d'eau d'un diamètre d'un pied du Rhin, & on trouvera par là le rapport entre la gravité spécifique de la boule & de l'eau. Or le rapport de la gravité de l'eau & de celle des autres fluides étant connu, on changera ce rapport de la boule à l'eau dans celui de la boule à tel fluide que l'on



voudra. Nous pourrions trouver une même règle pour l'air, si sa densité n'étoit pas extrêmement variable. Communément on regarde l'air comme environ 850 fois plus léger que l'eau. Ce rapport réduiroit le poids d'une boule d'air, dont le diamètre est d'un pied de Rhin, à  $\frac{33\frac{1}{4}}{850}$  lb ou  $\frac{2}{51}$  lb. Il y a cependant des cas où l'air est plus pesant, comme il y en a nombre d'autres où il est plus léger, que ce rapport ne le donne. De la table des hauteurs batométriques répondantes aux élévations des endroits au dessus de la mer, que j'ai donnée dans le traité des *Propriétés remarquables de la route de la lumière par les airs, &c.* & qui est tirée immédiatement des observations faites sur les Pyrénées, il résulte, que depuis la surface de la mer, où le batomètre est de 28 pouces de Paris, il faut s'élever de  $73\frac{1}{2}$  toises, pour que le baromètre s'abaisse d'un demi-pouce. Or ces  $73\frac{1}{2}$  toises font 10560 demi-pouces, & partant le vif argent est 10560 plus pesant que l'air. Divisant donc ce nombre par 14, nous aurons 754 pour le rapport entre la gravité spécifique de l'eau & celle de l'air; ce qui fait voir, que l'air est quelquefois plus dense que ne le donne le rapport dont nous avons parlé au commencement de ce paragraphe. Mais il pourra encore être plus pesant par une double raison. Car cette pesanteur répond à la hauteur du baromètre de 28 pouces. Or cette hauteur peut aller jusqu'à 29 pouces, & même au delà. Ceci diminue encore le nombre 754 en raison de 29 à 28, de sorte que l'eau ne fera que 728 fois plus pesante que l'air comprimé par une colonne de 29 pouces de mercure. Ensuite je remarquerai que les observations dont je tire ce résultat, ont été faites aux mois de Février & de Mars, & dans un climat qui approche de celui de l'Italie, de sorte que le Thermometre n'y aura été que fort peu au dessous de la température. Ce qui fait que, dans des climats plus froids, le nombre 728 devra encore être diminué d'une 12 ou 10 partie, & par là il sera réduit à 650, de sorte que dans les pays du Nord, à la surface de la mer, & le baromètre étant à 29 pouces de Paris, comme cela arrive pendant les plus grands froids, la pesanteur de l'eau n'excédera que 650 fois celle de l'air.



§. 35. Au contraire, pendant l'été, & le barometre n'étant qu'à  $27\frac{1}{2}$  pouces de hauteur, le nombre 754 devra être augmenté dans le rapport de  $27\frac{1}{2}$  à 28, ce qui donne 782; & en outre d'une 10 partie par rapport à la chaleur, ce qui le change en 860. Nous voyons de là, que la variation de la densité de l'air peut aller depuis 650 jusqu'à 860. Il est clair que ce changement influera assez considérablement sur la résistance que l'air oppose à des corps mûs avec autant de vitesse, que les boulets de canon & les bombes en ont.

§. 36. Tout ceci ne regarde encore que l'air tel qu'il est à la surface de la mer, & même indépendamment des variations qui peuvent résulter de l'humidité & des vapeurs dont l'air est toujours plus ou moins chargé. Voyons ce qui en fera pour des endroits plus élevés; & pour avoir un nombre rond, prenons une élévation de 1000 toises au dessus de la mer, en supposant que le barometre à la mer reste à sa hauteur moyenne de 28 pouces, & que le thermometre se trouve à la température. A cette hauteur de 1000 toises, répond à une ligne du barometre, une élévation de  $16\frac{2}{3}$  toises, ou de 14170 lignes, de sorte que l'air y est  $\frac{14170}{14}$  fois plus léger que le

vif. argent, & par conséquent  $\frac{14170}{14} = 1012$  fois plus léger que l'eau: au lieu que, sous les mêmes conditions, il n'étoit que 754 fois plus léger à la surface de la mer. On voit par là, que pour déterminer exactement la valeur de la lettre  $n$ , il faut avoir égard à toutes les circonstances dont nous venons d'indiquer l'effet & l'influence, & qu'il est à propos de peser l'air, dans les cas où l'on veut s'assurer à toute rigueur des effets de la résistance qu'il oppose aux corps qui s'y meuvent avec des vitesses considérables. Nous avons vu ci-dessus, que cette lettre dénote la sous-tangente de la logarithmique, dont les ordonnées représentent les vitesses & leur décroissement (§. 10. 19. 20.) & que par là elle est l'exposant de la progression géométrique suivant laquelle ces vitesses décroissent. Je remarquerai encore, comme en passant, que feu Mr. *Muschenbroek* a donné une table des



différentes pesanteurs de l'air, telles qu'elles avoient été observées par divers Physiciens. On verra par ce que je viens de dire, comment il est possible qu'il s'y trouve des résultats fort différens, & que quelques unes doivent être censées moins exactes que les autres.

§. 37. Je vais maintenant rapporter les expériences qui ont été faites à Londres sur la Tour de l'Eglise de *St. Paul*. Mr. *Hawksbee*, ayant fait faire des globes de verre creux & fort legers, les laissa tomber du haut de cette Tour, & fit observer le tems de la chute. La hauteur étoit de 220 pieds de Londres, ce qui revient à 213,6 pieds du Rhin, le barometre se trouvoit à  $29\frac{7}{8}$  de pouce, mesure de Londres, ce qui revient à 27 pouces  $4\frac{1}{2}$  lignes mesure de Paris, & enfin le thermometre étoit 60 degrés au dessus du terme de congélation, ce qui marque généralement parlant une chaleur d'été; & par l'une & l'autre raison nous pourrons nous en tenir au §. 35. & supposer que pendant ces expériences l'air a été à très peu près 850 fois plus léger que l'eau. Voici maintenant les expériences.

| P o i d s<br>grains. | Diametres<br>pouces. | Temps<br>secondes. |
|----------------------|----------------------|--------------------|
| 510                  | 5, 1                 | $8\frac{1}{2}$     |
| 642                  | 5, 2                 | 8                  |
| 599                  | 5, 1                 | 8                  |
| 515                  | 5, 0                 | $8\frac{1}{4}$     |
| 483                  | 5, 0                 | $8\frac{1}{2}$     |
| 641                  | 5, 2                 | 8                  |

Le poids est marqué en grains, dont une once pèse 480, ou une livre 7680. Et Mr. *Hawksbee* observe que le tems de la chute est généralement trop grand d'environ  $\frac{3}{8}$  de secondes, à cause d'un inconvénient qu'il y avoit en observant.



§. 38. Pour appliquer le calcul à ces expériences, déterminons d'abord la valeur de la lettre  $n$  par le poids & le diamètre des boules. Soit le demi-diamètre  $= r$ , le rapport du diamètre à la circonférence  $= 1 : \pi$ , celui de la pesanteur de l'air à celle de l'eau  $= 1 : 850$ , & le poids d'un pied cubique d'eau, mesure du Rhin,  $= 63\frac{1}{2}$  lb, le poids d'un pied cubique d'air fera  $= \frac{127}{1700}$  lb, & le poids d'une boule d'air, dont le demi-diamètre est d'un pied du Rhin, fera  $= \frac{4 \cdot 127 \cdot \pi}{3 \cdot 1700} = 0,3130$  lb, & le demi-diamètre étant en général  $= r$  pieds, le poids de la boule d'air fera  $= 0,313 \cdot rrr$  livres.

§. 39. Or par le §. 33. le poids de la boule même étant  $P$ , celui de la boule d'air d'un même volume est  $= P : D$ , d'où nous aurons

$$P : D = 0,313 \cdot r^3$$

$$D = P : (0,313 \cdot r^3)$$

$$n = \frac{16}{3} r D = \frac{16 \cdot P}{0,939 \cdot r r} = 17,043 \cdot \frac{P}{r r}$$

§. 40. Mais il est (§. 14.)

$$C C = n g$$

$$g = 31\frac{1}{4} \text{ pieds du Rhin}$$

donc il fera

$$C C = 532,605 \cdot \frac{P}{r r} = \frac{500}{3} \cdot r D$$

d'où l'on voit, que la vitesse terminale est en raison réciproque du diamètre de la boule, & en raison directe de la racine quarrée de son poids. Il convient de remarquer, qu'en faisant  $g = 31\frac{1}{4}$  pieds, je laisse à cette lettre la valeur qu'elle auroit dans le vuide. Il auroit fallu la diminuer dans le rapport de  $D : (D - 1)$ . Mais les boules



ayant été pesées dans l'air, & par conséquent dans le milieu résistant, cette diminution se trouve déjà dans la valeur de  $n$ , qui est  $\equiv 17,043 P : rr$ . Donc le produit  $ag \equiv CC$  est tel qu'il doit être. (§. 14. 26.) Du reste le rapport  $D : (D - 1)$  ne différant que fort peu de l'unité, on voit bien que nous aurions pu en faire abstraction.

§. 41. Appliquons maintenant ces rapports trouvés à la troisième expérience de Mr. *Hawksbee*, & nous aurons le poids de la boule  $P \equiv \frac{599}{7680} \text{ lb} \equiv \frac{1}{12,8} \text{ lb}$ . Le diamètre  $2r \equiv 5,1$  pouces de Londres  $\equiv \frac{5}{12}$  pieds du Rhin, enfin la hauteur de la chute  $x \equiv 213,6$  pieds du Rhin. D'où nous trouvons

$$n \equiv 17,043 \frac{P}{rr} = \frac{4 \cdot 144 \cdot 17,043}{25 \cdot 12,8} = 30,678 \text{ pieds}$$

$$CC \equiv ag \equiv 958,69 \text{ pieds quarrés}$$

$$C \equiv 30,96.$$

§. 42. Ces données suffisent pour trouver le tems de la chute par la formule du §. 16.

$$e^{rC:a} \equiv e^{x:a} + \sqrt{(e^{2x:a} - 1)}$$

car il sera

$$\frac{x}{a} = \frac{213,6}{30,678} = 6,97$$

ce qui fait, que nous pourrons réduire cette équation à

$$e^{rC:a} \equiv 2 e^{x:a}$$

d'où nous aurons

$$r C : a \equiv \log 2 + x : a$$

$$r = \frac{a \log 2}{C} + \frac{x}{C}$$

mais





mais il est

$$\log 2 = 0,693$$

d'où nous tirons  $\tau = 7\frac{3}{4}$  secondes. Mais l'expérience donna ce tems  $= 8 - \frac{1}{10} = 7\frac{9}{10}$  secondes. Donc la différence n'est que d'une  $\frac{1}{10}$  de seconde, c'est à dire, si petite qu'elle n'a pu être observée.

§. 43. Cet exemple est le seul que j'aye calculé. Car on voit par la table du §. 37. que les autres 5 expériences ne sauroient donner des différences plus notables. Toutes les boules étoient à peu près d'un même diamètre, & la différence qui se trouvoit entre leur poids répond au plus ou moins de tems que les boules employoient à tomber, puisque ce tems suivoit à très peu près le rapport des racines quarrées du poids, en croissant ou décroissant en raison inverse de ces racines.

§. 44. Mr. *Défaguliers* a fait de semblables expériences sur la même Tour, en laissant tomber de la hauteur de 272 pieds de Londres des vessies de porc, des boules de papier & de verre, & en observant le tems de la chute. Il répéta les expériences faites avec les mêmes vessies & les boules de papier. En voici le résultat

| Diametres<br>pouces. | P o i d s<br>grains. | Temps<br>secondes. | Expérienc.<br>repetée se-<br>condes. |                          |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 5, 3                 | 128                  | $19\frac{3}{8}''$  | $19''$                               | } Vessies.               |
| 5, 193               | 156                  | $17\frac{1}{4}$    | $18\frac{3}{8}$                      |                          |
| 5, 33                | $137\frac{1}{2}$     | $18\frac{3}{4}$    | $18\frac{3}{8}$                      |                          |
| 5, 26                | $97\frac{1}{2}$      | $22\frac{1}{8}$    | 24                                   |                          |
| 5, 2                 | $99\frac{1}{8}$      | $21\frac{5}{8}$    | $21\frac{1}{4}$                      |                          |
| 5, 5                 | 1800                 | $6\frac{1}{2}$     | $6\frac{3}{4}$                       | } Boules<br>de<br>papier |
| 5, 1                 | 1320                 | $7\frac{1}{8}$     | $6\frac{1}{2}$                       |                          |
| 5, 1                 | 1500                 | 7                  | $6\frac{1}{2}$                       |                          |
| 5, 42                | 2610                 | $6\frac{1}{4}$     |                                      | } Boules<br>de verre.    |
| 5, 45                | 2910                 | 6                  |                                      |                          |



§. 45. Je ne prendrai de ces expériences que la cinquieme, pour y appliquer le calcul. On voit que la durée de la chute y étoit très considérable, & que l'expérience répétée s'accorde très bien avec la premiere, ce qui fait croire que la vessie avoit été fort ronde & d'une figure réguliere. Nous avons donc

$$2r = \frac{5}{12} \text{ pieds du Rhin}$$

$$P = \frac{100}{7680} \text{ livres}$$

$$x = 262 \text{ pieds du Rhin}$$

D'où nous tirons

$$a = \frac{17,043 \cdot 24 \cdot 24 \cdot 10}{25 \cdot 768} = 5,1123 \text{ pieds.}$$

$$x : a = 51,24$$

$$\tau \sqrt{\frac{g}{a}} = x : a + \log 2 = 51,24 + 0,69 = 51,93$$

$$\tau = 21''.$$

Ce qui s'accorde, à  $\frac{1}{4}$  de seconde près, avec l'expérience répétée, qui donne ce tems de  $21\frac{1}{4}''$ . La premiere le donne de  $21\frac{1}{8}''$ . Mais il semble que l'air a été plus pesant qu'il ne le fût dans les expériences de Mr. *Hawksbee*, qui les fit pendant l'été & lorsque le barometre étoit fort bas. J'ignore si Mr. *Desaguliers* a observé le barometre & le thermometre. Mais je suis fort porté à croire, qu'il auroit trouvé l'état de l'air différent. En conséquence j'ai encore calculé la septieme de ces expériences, & je trouve le tems de la descente de  $6\frac{7}{8}$  secondes. Mr. *Desaguliers* l'a observé la premiere fois de  $7\frac{1}{8}$ , la seconde de  $6\frac{1}{2}$  secondes. Le terme moyen est 6,8 secondes, & surpasse le tems trouvé par le calcul d'une  $\frac{1}{87}$  partie, au lieu que dans l'exemple précédent cette différence, qui est  $= 21\frac{1}{8}'' - 21'' = \frac{1}{8}''$  est d'une  $\frac{1}{87}$  partie. Quoiqu'il en soit, ces différences sont si petites qu'il



qu'il ne vaud pas la peine de s'y arrêter. Et nous avons tout lieu d'en conclure, que la maniere dont nous avons déterminé la valeur de la lettre *a* convient très exactement avec les expériences, & qu'il faudra la laisser passer, du moins pour toutes celles où la vitesse n'est pas fort considérable. Je vais en conséquence appliquer ce calcul à un cas qui arrive très souvent, & qui excite même la curiosité des personnes qui n'étudient ni la Physique ni ces sortes de calculs.

§. 46. On sait que la pluie tombe des nuées. Leur hauteur est assez variable, & les gouttes elles-mêmes sont d'une grosseur fort différente. Si donc on demande, quelle est leur vitesse en tombant, & combien de tems elles employent, cette question ne sauroit se décider généralement. Je vais donc prendre quelque terme moyen. Je ne donnerai à la hauteur des nuées que 5000 pieds. Elles sont quelquefois plus basses, & particulièrement en hyver; mais aussi en revanche les trouve-t-on au dessus des plus hautes montagnes, & la neige permanente au haut des Cordelières nous fait voir, que les nuées peuvent s'élever au-delà de 20000 pieds au dessus de la mer. Quoiqu'il en soit, il y a encore une autre raison qui rend cette supposition superflue, c'est que le froid excessif qui regne dans ces grandes hauteurs, change toujours les nuées en flocons de neige, qui ne se fond que lorsqu'en tombant elle parvient dans un air, qui, par là qu'il est plus proche de la surface de la terre, en peut être assez échauffé pour fondre la neige. En gardant donc la hauteur de 5000 pieds, je supposerai le diamètre d'une goutte de pluie égal à une ligne du pied du Rhin, & en prenant un terme moyen, je garderai la densité de l'air 850 fois plus petite que celle de l'eau. De là nous aurons

$$r = \frac{1}{288} \quad D = 850$$

$$a = \frac{16}{3} r \quad D = \frac{850 \cdot 16}{288 \cdot 3} = 15,74$$

$$C = 22,18.$$



Ainsi la plus grande vitesse que cette goutte peut acquérir en tombant, n'est que de  $22\frac{1}{2}$  pieds par seconde, & ne s'aggrandit qu'en raison de la racine quarrée du diametre, de sorte que si ce diametre n'est que d'un  $\frac{1}{4}$  de ligne, cette vitesse sera encore de 11 pieds par secondes. Pour trouver maintenant le tems de la chute, nous aurons

$$\tau \sqrt{\frac{g}{a}} = x : a + \log 2$$

ce qui donne

$$\tau = 229'', 4.$$

Ainsi une goutte de 1 ligne de diametre, en tombant de la hauteur de 5000 pieds, emploiera  $3', 49''$  pour cette descente. En tombant uniformément avec la vitesse terminale de 22, 18 pieds par seconde, elle emploieroit 225, 4 secondes de tems. Et sans la résistance de l'air, & tombant par la seule action de la gravité, elle feroit ce chemin en 18 secondes de tems.

§. 47. Appliquons le même calcul à une dragée de fer, dont le diametre est d'une ligne, mesure du Rhin. Le fer est 7, 645 fois plus pesant que l'eau. Mais la valeur de la lettre  $a$  croit en raison de la gravité spécifique. En multipliant donc les 15, 74 pieds que nous venons de trouver pour une goutte d'eau du même volume, avec 7, 645, & nous aurons pour cette dragée de fer

$$a = 120, 41.$$

$$C = \sqrt{a g} = 61, 34.$$

La plus grande vitesse que cette dragée peut acquérir en tombant dans un air 850 fois plus leger que l'eau, n'est donc que de  $61\frac{1}{2}$  pieds du Rhin par seconde ; & quand même elle seroit jettée horizontalement avec une vitesse infinie, cette vitesse diminueroit si rapidement, qu'au bout de la premiere seconde de tems elle ne seroit plus que de  $120\frac{2}{3}$  pieds par seconde, en continuant de décroître en raison réciproque du tems, de sorte qu'au bout de la deuxieme seconde elle seroit réduite à la moitié, &c. (§. 9. 12.)



§. 48. Il ne sera pas plus difficile d'appliquer ce calcul aux boules de savon. On fait qu'elles ne tombent presque point du tout. Supposons p. ex. une goutte d'eau savonnée, dont le diamètre est d'une ligne, étendue en une boule de deux pouces de diamètre. Par là son volume devient  $24^3 = 13824$  fois plus grand. Ce qui fait que l'air renfermé dans la boule pesera  $\frac{13824}{850} = 16$  fois plus que l'eau. Donc la gravité spécifique de toute la boule sera  $D = \frac{1}{16}$ . Et le diamètre étant  $2r = \frac{1}{8}$  pied, on aura  $n = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{96}$ . Et comme dans ce cas il est  $g = \frac{D - 1}{D} \cdot 31\frac{1}{4} = \frac{1}{96} \cdot 31\frac{1}{4}$ , on aura  $CC = \frac{1}{96} \cdot \frac{1}{96} = \frac{1}{9216}$  ce qui donne à très peu près  $C = \frac{1}{96} = 11$  pouces, qui est la plus grande vitesse que la boule pourra acquérir en tombant.

§. 49. Après ces exemples, où la vitesse des corps tombants est peu considérable, j'en vais rapporter quelques uns où elle est considérablement plus grande. Mr. *Sulzer* ayant vu les difficultés que Mrs. *Robins* & *Euler* opposoient à l'hypothèse de la résistance exactement proportionnelle au quarré des vitesses, entreprit d'examiner le résultat que donnent les calculs de Mr. *Euler*, par des expériences simplifiées à un tel point qu'on puisse répondre de toutes les circonstances qui y influent : prérogative, dont celles de Mr. *Robins* ne jouissent pas. Mais, sans m'arrêter ici à cet examen, je me bornerai à rapporter les expériences de Mr. *Sulzer*, afin de pouvoir ensuite y appliquer le calcul, & faire voir, qu'on auroit pu en prédire l'effet, en admettant simplement le principe de la résistance proportionnelle au quarré de la vitesse.

§. 50. Mr. *Sulzer* ayant appliqué à la boîte d'un fusil à vent un tuyau de verre de près de 12 pieds de longueur, le remplit de vif-argent, enforte qu'en comprimant l'air enfermé dans la boîte, la hauteur de la colonne de mercure dans ce tuyau lui indiquât exactement



le degré d'élasticité de cet air comprimé. Il chargea ensuite le fusil d'une boule de plomb, dont le diamètre étoit  $3\frac{2}{3}$  lignes pied du Rhin, & ayant donné au fusil une position verticale il lâcha le coup, & observa le tems que la boule employoit à monter & à descendre. Cette expérience fut répétée cinq fois pour différens degrés d'élasticité. En voici les résultats tels qu'ils ont été observés :

| Hauteur du mercure<br>pieds du Rhin | Tems de la montée<br>& de la descente |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| $f = 9,08$ . . . . .                | $T = 12\frac{1}{2}$ secondes          |
| 8,75 . . . . .                      | 12                                    |
| 6,54 . . . . .                      | 11                                    |
| 4,71 . . . . .                      | 10                                    |
| 2,56 . . . . .                      | $7\frac{1}{2}$                        |

Je remarquerai d'abord, que pour avoir l'entier degré de l'élasticité de l'air comprimé, il faut ajouter à ces colonnes de mercure le poids de l'atmosphère, ou la hauteur du barometre, que nous pouvons supposer avoir été de 2,45 pieds du Rhin, parce que Mr. *Sulzer* me dit qu'il avoit fait ces expériences à Berlin au mois de Juin, & que ç'a-voit été un des plus beaux jours d'été. J'ajoute ces circonstances, parce qu'il en résulte aussi, que pour déterminer la résistance de l'air, nous pourrons nous en tenir au §. 35. en donnant à cet air 850 fois moins de gravité spécifique qu'à l'eau.

§. 51. Pour tirer parti de ces expériences il s'agit avant toutes choses de déterminer la vitesse avec laquelle la boule a été tirée. Ce calcul demande encore d'autres données. Mr. *Sulzer* y a pourvu, en nous donnant exactement les mesures qu'il a prises en conséquence. Les voici toutes en pieds du Rhin & ses parties décimales.

|                            |                            |            |
|----------------------------|----------------------------|------------|
| La capacité de la boîte    | $= 0,00677$ pieds cub.     | $= a$      |
| La base du canon . .       | $= 0,000532$ pieds quarrés | $= \beta$  |
| La longueur . . . .        | $= 2,5833$ pieds . .       | $= \gamma$ |
| Le diamètre de la boule    | $= 0,02546$ . . . .        | $= \delta$ |
| L'aire de son grand cercle | $= 0,000508$ pieds quarrés | $= e$      |

Le





Le rapport de la gravité spécifique du mercure & du plomb  $\equiv 1,2378 \equiv m$ . Enfin je poserai la hauteur du barometre de 2,45 pieds  $\equiv \lambda$ .

§. 52. De là il suit que l'élasticité de l'air comprimé dans la boîte est égale à une colonne de mercure haute de  $f + \lambda$  pieds. Cette colonne étant changée en une colonne de plomb du même poids, la hauteur de celle-ci sera  $\equiv (f + \lambda)m$  pieds, d'où il suit qu'elle surpassoit  $\frac{3m}{2\delta} (f + \lambda)$  fois le poids de la boule de plomb dont le fusil étoit chargé, & qu'elle mit en mouvement par sa pression. Si donc la pression de la gravité est posée  $\equiv 1$ , la force accélératrice de l'air comprimé dans la boîte sera  $\equiv \frac{3m}{2\delta} (f + \lambda)$ .

§. 53. Cette force diminue en raison réciproque de l'espace. Supposons qu'elle ait poussé la boule dans le canon du fusil jusqu'à la distance  $\equiv \xi$ , la densité de l'air comprimé dans la boîte sera diminuée en raison  $\frac{a}{a + \beta \xi}$ , & la force accélératrice sera donc réduite à

$$\frac{3mfa}{2\delta(a + \beta\xi)},$$

Or cette force doit non seulement pousser la boule, mais encore tout le poids de l'air extérieur, qui, étant égal à une colonne de mercure  $\equiv \lambda$ , sera  $\equiv \frac{3m\lambda}{2\delta}$ , quantité constante dont la force accélératrice de l'air comprimé doit être, diminuée. Elle ne sera donc efficace qu'avec la quantité, ou portion,

$$\frac{3mfa}{2\delta(a + \beta\xi)} - \frac{3m\lambda}{2\delta}.$$



§. 54. Soit maintenant  $v$  la hauteur, par laquelle un corps doit tomber dans le vuide pour acquérir la vitesse que la boule  $a$  acquiert à la distance  $\xi$ , de sorte que cette vitesse soit  $= \sqrt{v}$ , & nous aurons par les loix de la mécanique

$$dv = \frac{3am(f+\lambda)}{2a\delta + 2\beta\delta\xi} d\xi = \frac{3m\lambda d\xi}{2\delta}$$

d'où l'on tire l'intégrale pour toute la longueur du canon du fusil

$$v = \frac{3am(f+\lambda)}{2\beta\delta} \log\left(1 + \frac{\beta\gamma}{a}\right) = \frac{3m\lambda\gamma}{2\delta}$$

§. 55. Remarquons ici en passant, que la hauteur  $v$  aussi bien que sa différentielle  $dv$  peut devenir  $= 0$ . Dans ce dernier cas elle offre un *maximum*, qui aura lieu lorsque

$$\xi = \frac{a(f+\lambda)}{\beta\lambda}$$

ce qui veut dire, que la vitesse de la boule croîtra jusqu'à ce qu'on donne au canon du fusil une longueur telle, que l'air comprimé de la boîte se dilant dans toute la longueur du canon, ait alors une densité égale à celle de l'air extérieur. On voit par cette équation que cette plus grande longueur du canon est en raison directe de l'élasticité de l'air comprimé dans la boîte, & en raison réciproque de l'élasticité de l'air extérieur. Le premier cas, où la hauteur  $v$  devient  $= 0$ , a lieu, lorsque la compression de l'air enfermé dans la boîte est si petite, que la force accélératrice qui en naît, ne sauroit pousser la boule que jusqu'au bout du canon du fusil. Car dans ce cas elle n'en sortira pas, mais l'air extérieur gagnant le dessus, de même que le propre poids de la boule, la feront rentrer, en lui faisant faire des oscillations diminués jusqu'à ce qu'elle s'arrête là, où par son propre poids joint à celui de l'air extérieur elle tient en équilibre l'air qui reste dans la boîte. Ceci arrive quand on suppose, que la boule remplit exactement le canon du fusil. Car, lorsqu'elle est plus petite, elle retombe entierement, &c.



§. 56. Mais revenons à notre calcul. Nous n'aurons pour cet effet qu'à substituer aux lettres  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, f, \lambda$  les valeurs, que nous donnent les expériences de Mr. *Sulzer*, & nous aurons

$$\frac{\beta\gamma}{\alpha} = 0,2030$$

$$\log\left(1 + \frac{\beta\gamma}{\alpha}\right) = 0,18483$$

$$\frac{3}{2} \frac{m\lambda}{\delta} = 461,56$$

$$\frac{3}{2} \frac{m\alpha}{\delta\beta} \log\left(1 + \frac{\beta\gamma}{\alpha}\right) = 171,528$$

$$\frac{3}{2} \frac{m\alpha\lambda}{\beta\delta} \log\left(1 + \frac{\beta\gamma}{\alpha}\right) = 420,24$$

$$461,56 - 420,24 = 41,32$$

& enfin

$$v = 171,528 f - 41,32$$

d'où l'on voit, que si  $f$  n'étoit que de  $\frac{41,32}{171,528}$ , ou environ  $\frac{1}{4}$  pied, c'est à dire, si l'élasticité de l'air comprimé dans la boëre n'excédoit celle de l'air extérieur que de 3 pouces de mercure, la balle ne sortiroit point du fusil, mais qu'elle retomberoit dans la boëre.

§. 57. Substituons maintenant dans la dernière de ces équations les valeurs de la lettre  $f$  (§. 50.) & nous aurons les hauteurs

$$\begin{aligned} v &= 1516 \text{ pieds} \\ &= 1460 \\ &= 1080 \\ &= 767 \\ &= 364. \end{aligned}$$

§. 58.



§. 58. Or, pour trouver la vitesse initiale de la boule  $c'$ , on n'aura qu'à multiplier ces valeurs de  $v$  par  $2g = 62\frac{1}{2}$  pieds, & prendre les racines quarrées des produits. Mais, avant que de faire cela, nous chercherons encore la valeur de la lettre  $C$ , ou de la plus grande vitesse que la boule peut acquérir en tombant par l'air, tel qu'il étoit dans ces expériences. Cet air étant 850 fois plus léger que l'eau, & l'eau 11,3 fois plus legere que le plomb, il s'enfuit que la boule avoit  $113 \cdot 85 = 9350$  fois plus de densité que l'air. Il fera donc  $D = 9350$ . Ensuite nous avons le demi-diametre de la boule  $r = \frac{1}{884}$  pieds. Ces deux nombres étant substitués dans la formule du §. 33.

$$a = \frac{16}{3} r D$$

nous donnent

$$a = \frac{176 \cdot 9350}{2592} = 634,9$$

De là

$$\log a = 2,8026893$$

$$\log g = 1,4948500$$

$$\log ag = 4,2975393 = \log CC (\S. 26.)$$

$$\log C = 2,1487696 \quad C = 140,85$$

$$\log \frac{a}{g} = 1,3078393$$

$$\log \sqrt{\frac{a}{g}} = 0,6539197 \quad \sqrt{\frac{a}{g}} = \frac{a}{C} = 4,507.$$

§. 59. De là nous aurons les nombres suivants (§. 24.)

| $v$  | $\log v g$ | $\log \sqrt{2vg} = \log c'$ | $c'$   | $\log \frac{c'}{C} = \log \cot 2\omega$ | $2\omega$  |
|------|------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------|------------|
| 1516 | 4, 6755492 | 2, 4882896                  | 307, 8 | 0, 3395200                              | 24°, 35' + |
| 1460 | 4, 6592028 | 2, 4801164                  | 302, 1 | 0, 3313468                              | 25, 0      |
| 1080 | 4, 5282737 | 2, 4146518                  | 259, 8 | 0, 2658822                              | 28, 28     |
| 767  | 4, 3796454 | 2, 3403377                  | 218, 9 | 0, 1915681                              | 32, 45 +   |
| 364  | 4, 0559514 | 2, 1784907                  | 150, 8 | 0, 0297211                              | 43, 2      |

Ce qui donne encore

| $\frac{1}{2}\pi - 2\omega$ | $\omega$ | $\log. \cot \omega$ | $\log. \cot 2\omega$ |
|----------------------------|----------|---------------------|----------------------|
| 65°, 25'                   | 12°, 18' | 0, 6614733          | 0, 3808897           |
| 65, 0                      | 12, 30   | 0, 6542448          | 0, 3740517           |
| 61, 32                     | 14, 14   | 0, 5957514          | 0, 3218028           |
| 57, 15                     | 16, 23   | 0, 5316127          | 0, 2668232           |
| 46, 58                     | 21, 31   | 0, 4042321          | 0, 1659459           |

§. 60. Or ces logarithmes étant tabulaires, il faut les multiplier par  $\log 10 = 2,30258$  pour les changer en hyperboliques. Et par la même raison il faut multiplier les degrés ( $\frac{1}{2}\pi - 2\omega$ ) par la longueur d'un degré, qui est  $= 0,01745$  &c. Mais les formules des §. 24. 25.

$$T = (\frac{1}{2}\pi - 2\omega + \log \cot \omega) \frac{a}{C}$$

$$x = a \log \operatorname{cosec} 2\omega$$

demandent encore qu'on multiplie les  $\log. \cot \omega$  par  $\frac{a}{C}$ , que nous avons trouvé être  $= 4,507$  & les  $\log. \operatorname{cosec} 2\omega$  par  $a = 634,9$ . De là, en multipliant d'abord ces multiplicateurs, il suffira de multiplier les degrés ( $\frac{1}{2}\pi - 2\omega$ ) par 0,07864, & les  $\log. \cot \omega$  par

par 10,378, pour avoir les tems de la montée & de la descente, & partant les sommes, & enfin les log. coséc.  $2\omega$  par 1462, pour avoir les hauteurs  $x$ , ce qui donnera

| Tems calculés |             |              | Tems                   |                        | Différence | Hauteurs |
|---------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------|------------|----------|
| montée        | descente    | somme        | observés               |                        |            |          |
| 5'', 15 . .   | 6'', 87 . . | 12'', 02 . . | 12'' $\frac{1}{2}$ . . | + $\frac{1}{2}$ '' . . |            | 567, 0   |
| 5 , 11 . .    | 6 , 79 . .  | 11 , 90 . .  | 12 . .                 | + $\frac{1}{8}$ '' . . |            | 546, 9   |
| 4 , 84 . .    | 6 , 18 . .  | 11 , 02 . .  | 11 . .                 | 0 . .                  |            | 470, 6   |
| 4 , 50 . .    | 5 , 52 . .  | 10 , 02 . .  | 10 . .                 | 0 . .                  |            | 390, 2   |
| 3 , 69 . .    | 4 , 19 . .  | 7 , 88 . .   | 7 $\frac{1}{2}$ . .    | - $\frac{1}{2}$ '' . . |            | 242, 6   |

§. 61. Je regarde ces différences des tems comme nulles. Car les degrés d'élasticité de l'air comprimé dans la boîte différoient trop peu entre eux, pour qu'ils eussent du produire une différence d'une  $\frac{1}{2}$  seconde dans le tems. Nous voyons que la seconde, la troisieme, & la quatrieme observation diffèrent chacune d'une seconde entiere, & que pour produire cette différence, celle de l'élasticité a du être de près de 2 pieds de mercure. (§. 50.) Mais la premiere & la seconde expérience ne différoient que d'un  $\frac{1}{3}$  de pied, ce qui ne pourra produire qu'une  $\frac{1}{3}$  partie de seconde de différence dans le tems; minutie qui ne pouvoit être observée, quoiqu'elle ait pu porter l'observateur à compter pour la premiere observation une demi-seconde davantage. On peut juger de la même maniere des  $\frac{2}{3}$  secondes, dont la dernière expérience diffère du calcul. De la sorte ces expériences sont telles, qu'au lieu de changer la moindre chose au principe de la résistance proportionnelle au quarré des vitesses, elles le confirment autant qu'on peut le souhaiter. Les vitesses, dans les deux premieres expériences surtout, étoient telles, que si la boule avoit été tirée horizontalement avec une vitesse infinie, elle auroit été réduite à cette vitesse après la deuxième seconde de tems (§. 12.9.) Mr. *Sulzer*, d'après les raisons assez plausibles que donne Mr. *Euler*, a joint au quarré des vitesses encore une petite fonction du biquarré. On peut voir dans son Mémoire, que les deux



deux dernières expériences se trouvant assez conformes aux résultats de son calcul, les deux premières, dans lesquelles ce biquarré se trouve considérablement plus grand, diffèrent au de là d'une seconde, & par conséquent de la 10 partie du tems entier.

§. 62. Déterminons encore pour la première de ces expériences le tems que la boule auroit employé à monter & à descendre dans le vuide, & dans un air dont la résistance auroit été double de ce qu'elle a été en effet. Le tems pour le vuide se trouve aisément. Car il est  $\equiv 2c':g$  & par conséquent  $\equiv \frac{615,6}{31,25} \equiv 19,7$  secondes.

Au contraire dans un air, dont la résistance seroit double, la valeur de la lettre  $a$  se réduit à la moitié de ce que nous avons trouvé, ou à 317,4 pieds. Il sera donc

$$\begin{aligned} \log a &\equiv 2,5016593 \\ \log g &\equiv 1,4948500 \\ \log ag &\equiv \frac{3,9965093}{1,9982546} = \log CC \\ \log C &\equiv \frac{1,9982546}{1,0068093} \text{ donc } C \equiv 99,60 \text{ pieds} \\ \log a:g &\equiv 1,0068093 \\ \log \sqrt{\frac{a}{g}} &\equiv \frac{0,5034046}{\phantom{0,5034046}} \text{ donc } \sqrt{\frac{a}{g}} \equiv \frac{a}{C} \equiv 3,187. \end{aligned}$$

De là nous aurons

$$\begin{aligned} \log C &\equiv 1,9982562 \\ \log c' &\equiv 2,4882896 \\ \log c':C &\equiv \frac{0,4900334}{\phantom{0,4900334}} = \log \cot \omega \\ 2 \omega &\equiv 17^{\circ}, 56' \\ \omega &\equiv 8, 58 \\ \frac{1}{2}\pi - 2\omega &\equiv 72, 4 \\ \log. \cot \omega &\equiv 0, 8019258. \end{aligned}$$

Ce logarithme étant changé en logarithme hyperbolique, est  $\equiv 1,4465$ , & l'arc  $(\frac{1}{2}\pi - 2\omega)$  étant converti en parties décimales

males du rayon est  $\equiv 1,2576$ . Or l'un & l'autre de ces nombres doit encore être multiplié par  $c'$  :  $C \equiv 3,187$ , pour avoir le tems

de la montée  $\equiv 4'',01$

de la descente  $\equiv 5,89$

Tems T . . .  $\equiv 9,90$

Nous voyons de là que tems décroît de maniere, que la densité de l'air étant représentée par les abscisses, & le tems T par les ordonnées, cette courbe devient assymptotique, & que les tems décroissent plus lentement que ne croissent les densités, &c. Car il est pour la

densité  $\equiv 0$  . . . . T  $\equiv 19,7$

$\equiv 1$  . . . .  $\equiv 12,0$

$\equiv 2$  . . . .  $\equiv 9,9$  &c.

La hauteur  $x$  diffère également. Elle est  $x \equiv a \log. \text{cofec. } 2\omega$  (§. 25.) Or le logarithme tabulaire de cofec  $2\omega$  est  $\equiv 0,5119665$ , qui étant multiplié par  $2,30258$   $a \equiv 731$ , donne  $x \equiv 384,3$ . de sorte qu'il est pour la

densité  $\equiv 0$   $x \equiv 1516$

$\equiv 1$  . . .  $\equiv 567$

$\equiv 2$  . . .  $\equiv 384$  &c.

d'où il paroît, que les hauteurs décroissent plus vite que les tems.

§. 63. Jusqu'ici nous avons considéré le cas où le milieu résistant est en repos. Il ne sera pas inutile de donner encore quelque attention à ceux où il a quelque mouvement. Nous supposerons ce mouvement rectiligne & uniforme; & pour commencer par le cas le plus simple, nous le regarderons comme étant directement opposé à celui du corps qui s'y meut. Soit donc AB la droite, dans laquelle

laquelle un corps sphérique se meuve de A vers B, de sorte qu'après un tems  $\equiv \tau$  il ait parcouru l'espace  $AP \equiv x$ . Que sa vitesse en P soit  $\equiv c$ . Avec cette vitesse le corps pourroit parcourir dans le tems  $d\tau$  l'espace  $Pq$ , s'il n'étoit retardé par la résistance & par l'action du fluide. Le fluide se mouvant de B vers A, avec une vitesse, que nous nommerons  $\equiv \gamma$ , la vitesse relative du corps sera  $\equiv \gamma + c$ ; & c'est du quarré de cette vitesse que dépend l'effet de la résistance, ou le retardement  $p q \equiv - d d x$ . Nous aurons donc

$$- d d x \equiv (c + \gamma)^2 d \tau^2 : a.$$

Mais il est

$$\begin{aligned} d x &\equiv c . d \tau \\ d d x &\equiv d c . d \tau . \end{aligned}$$

Donc, en substituant cette valeur, nous aurons

$$\begin{aligned} - d c &\equiv (c + \gamma)^2 d \tau : a \\ - \frac{d c}{(c + \gamma)^2} &\equiv \frac{d \tau}{a} \end{aligned}$$

& l'intégrale, en faisant la vitesse initiale  $\equiv G$ , sera

$$\frac{\tau}{a} \equiv \frac{1}{c + \gamma} - \frac{1}{G + \gamma}.$$

de sorte que le tems est en raison réciproque de la vitesse relative  $c + \gamma$ .

§. 64. L'équation

$$- \frac{d c}{(c + \gamma)^2} \equiv \frac{d \tau}{a}$$

se change en

$$- \frac{c d c}{(c + \gamma)^2} \equiv \frac{c d \tau}{a} \equiv \frac{d x}{a}.$$

ce qui donne l'intégrale

$$\frac{x}{a} = \log \frac{G + \gamma}{c + \gamma} - \frac{\gamma}{c + \gamma} + \frac{\gamma}{\gamma + G}$$

Et, en exprimant la vitesse  $c$  par la valeur du tems, il sera

$$\frac{x}{a} = \log \left( \frac{\tau(G + \gamma)}{a} + 1 \right) - \frac{\gamma\tau}{a}$$

Dans cette formule  $\gamma\tau$  est l'espace que le milieu parcourt dans le tems  $\tau$ , & au contraire  $a \log \left( \frac{\tau(G + \gamma)}{a} + 1 \right)$  est l'espace, que le corps auroit parcouru, si, en supposant le fluide en repos, le corps avoit eu la vitesse initiale  $G + \gamma$  (§. 11.) Ainsi l'espace  $x$  est la différence de ces deux espaces. Ou bien, en transposant les termes de cette équation, nous avons la suivante.

$$x + \gamma\tau = a \log \left( \frac{\tau(G + \gamma)}{a} + 1 \right)$$

dont l'un & l'autre membre dénote l'espace relatif, ou la distance de la boule d'une particule du fluide emportée par ce fluide.

§. 65. L'équation que nous venons de trouver pour l'espace parcouru, nous présente un *maximum*. Ce qui fait voir qu'une boule poussée contre le torrent du fluide avec une vitesse quelconque est rallentie, en sorte qu'après avoir parcouru un certain espace, la vitesse devient  $= 0$ , & qu'elle commence à être entraînée par le fluide. Pour en trouver le tems, nous n'aurons qu'à faire  $c = 0$ , dans l'équation

$$\frac{\tau}{a} = \frac{1}{c + \gamma} - \frac{1}{G + \gamma}$$

& elle se change en

$$\frac{\tau}{a} = \frac{1}{\gamma} - \frac{1}{G + \gamma}$$

Par exemple, dans la première expérience de Mr. *Sulzer*, nous avons la vitesse initiale de la boule  $= 307,8$  pieds, & la valeur de la lettre  $a = 634,9$ , ce qui donne

$$\tau = \frac{634,9}{\gamma} - \frac{634,9}{307,8 + \gamma}$$

Supposons la vitesse du vent  $= 60$  pieds par seconde, & il se trouvera que le tems  $\tau$  n'est que de 8,85 secondes, de sorte que cette boule étant tirée horizontalement avec une vitesse de 307,8 pieds, & contre un vent dont la vitesse est de 60 pieds, rebroussera chemin en moins de 9 secondes, & elle ne fera que 618 pieds de chemin.

§. 66. Pour accommoder les formules que nous venons de trouver, au cas où le mouvement du fluide suit la même direction que le corps qui s'y meut, nous n'aurons qu'à prendre la lettre  $\gamma$ , négative, ce qui donne

$$\frac{\tau}{a} = \frac{1}{c - \gamma} - \frac{1}{G - \gamma}$$

$$\frac{x}{a} = \log \frac{G - \gamma}{c - \gamma} + \frac{\gamma}{c - \gamma} - \frac{\gamma}{G - \gamma}$$

$$\frac{x}{a} = \log \left( \frac{\tau(G - \gamma)}{a} + 1 \right) + \frac{\gamma\tau}{a}$$

Ces formules auront lieu, lorsque la vitesse initiale du corps est plus grande que celle du fluide, dans lequel il se meut. Mais, si le fluide se meut plus vite, on aura les formules suivantes

$$\frac{\tau}{a} = \frac{1}{\gamma - c} - \frac{1}{\gamma - G}$$

$$\frac{x}{a} = -\log \frac{\gamma - G}{\gamma - c} + \frac{\gamma}{\gamma - c} - \frac{\gamma}{\gamma - G}$$

$$\frac{x}{a} = -\log \left( 1 + \frac{\tau(\gamma - G)}{a} \right) + \frac{\gamma\tau}{a}$$

§. 67. Ce qui donne pour le cas où le mouvement du corps commence par le repos

$$\frac{\tau}{a} = \frac{1}{\gamma - c} \quad \text{---} \quad \frac{1}{\gamma} = \frac{c}{\gamma - c}$$

$$\frac{x}{a} = \frac{c}{\gamma - c} \quad \text{---} \quad \log \frac{\gamma}{\gamma - c}$$

$$\frac{x}{a} = \frac{\gamma \tau}{a} \quad \text{---} \quad \log \left( 1 + \frac{\tau \gamma}{a} \right).$$

Fig. 6.

§. 68. Cette dernière formule se construit de la manière suivante. Ayant tiré à angle droit les lignes AB, RT, on fait  $AB = AT = a$ , & on tire par le point B une logarithmique EBM, dont la sous-tangente soit  $AT = a$ , l'axe RT. Après avoir ensuite tiré BT prolongée vers Q, & BP parallèle à RT, on prend  $PM = \tau \gamma$ , & on aura  $MQ = x$ . Car il est

$$AR = BP = PQ = a \log \frac{RM}{AB}$$

$$RM = a + \tau \gamma$$

$$BP = PQ = a \log \frac{a + \tau \gamma}{a}$$

$$PM = \tau \gamma;$$

$$\text{donc } QM = \tau \gamma - a \log \left( 1 + \frac{\tau \gamma}{a} \right).$$

Si donc les tems croissent comme PM, les espaces croissent comme QM.

§. 69. L'équation

$$\frac{x}{a} = \frac{c}{\gamma - c} \quad \text{---} \quad \log \frac{\gamma}{\gamma - c}$$

étant



étant résolue en une suite, nous donne

$$x = \frac{a c c}{2 \gamma \gamma} + \frac{2 a c^3}{3 \gamma^3} + \frac{3 a c^4}{4 \gamma^4} + \&c.$$

Si donc la vitesse du fluide est incomparablement plus grande que celle du corps, & que le fluide soit fort rare, il suffira de garder le premier terme de cette suite, puisque les suivans s'évanouissent. Il fera donc

$$x = \frac{a}{2 \gamma \gamma} . c c$$

La lettre  $a$  dépend de la densité du fluide. Ainsi, si nous supposons que la pesanteur des corps dérive du mouvement d'un semblable fluide, le rapport  $a : 2 \gamma \gamma$  se définit par la loi de la chute des corps. Car il est

$$x = \frac{c c}{2 g}$$

d'où l'on tire

$$\frac{a}{2 \gamma \gamma} = \frac{1}{2 g}$$

$$a g = \gamma \gamma$$

$$g = \gamma \gamma : a = 31 \frac{1}{4} \text{ pieds.}$$

§. 70. Mais, sans nous arrêter à ces recherches, nous passerons à considérer le mouvement d'un corps sphérique dans un milieu qui se meut dans une direction oblique, & qui par conséquent non seulement altère la vitesse du corps, mais qui en change en même tems la direction.

§. 71. Soit donc AB la direction du mouvement du fluide, de sorte qu'il se meuve de A vers B, & que sa vitesse soit  $\equiv$  AF. Soit AME la courbe que le corps parcourt, de sorte qu'en A sa direction soit perpendiculaire à celle du fluide. Supposons la vitesse

Fig. 7.



se en  $A = AG$ , & achevant le rectangle  $AFHG$ , tirons la diagonale  $AH$ . Faisons

$$\begin{aligned} AF &= \gamma \\ AG &= Q \\ HAG &= \psi \end{aligned}$$

Supposons maintenant qu'après un certain tems  $= \tau$ , le corps soit parvenu en  $M$ , & que dans ce point sa vitesse soit  $= c$ . Il s'agira de voir, de quelle maniere il change de vitesse & de direction.

§. 72. La vitesse du fluide étant supposée constante & parallele, nous transférerons  $AF$  en  $MN$ , & ayant tiré la tangente  $MQ$ , nous ferons  $MQ = c$ , de sorte que les droites  $MM$ ,  $MQ$ , expriment les directions & les vitesses du fluide & du corps qui s'y meut. Comme l'effet reste le même, soit que le fluide pousse de  $N$  vers  $M$ , ou que le corps soit poussé de  $M$  vers  $N$ , en achevant le parallélogramme  $NMQP$ , & tirant la diagonale  $MP$ , cette diagonale représentera la direction, & la vitesse qui naît de la composition des deux mouvemens du corps, de même que la direction suivant laquelle le corps est détourné de sa route. Soit  $Pp$  l'effet qui en résulte pendant le tems  $d\tau$ , & nous n'aurons qu'à transférer  $Pp$  en  $Qq$ , en gardant la même direction. De cette maniere le corps, au lieu de se mouvoir suivant la direction tangentielle  $MQ$ , se meut en effet par le petit arc  $Mq$ .

§. 73. Cet effet se résout facilement en deux autres, paralleles & perpendiculaires à la direction  $NM$ . Prolongeant  $PQ$  en  $r$ , & abaissant sur  $Qr$  la perpendiculaire  $qr$ , tirons encore  $MS$  parallele, &  $Mm$ ,  $rq$  perpendiculaires à  $AB$ ; & faisons

$$\begin{aligned} Am &= x \\ mM &= y \end{aligned}$$

& il sera

$$\begin{aligned} MS &= : dx \\ Qr &= + ddx \\ Sr &= dy \\ rq &= - ddy \end{aligned}$$

Nom-

Nommons encore la vitesse suivant  $MS = k$ , celle qui est suivant  $SQ = q$ , & ces quantités se réduiront à des équations de la manière suivante.

§. 74. La diagonale  $MP$  exprimant la vitesse, nous avons d'abord.

$$Pp = Qq = PM^2 : a$$

Cette équation se résout dans les deux suivantes

$$Qr = ddx = \frac{PM \cdot PR}{a}$$

$$rq = -ddy = \frac{PM \cdot MR}{a}$$

Or il est

$$MR = SQ = dy$$

$$PR = PQ - RQ = \gamma d\tau - dx.$$

Donc en substituant ces valeurs, on aura

$$\frac{PM}{a} = \frac{ddx}{\gamma d\tau - dx} = -\frac{ddy}{dy}.$$

Mais il est

$$dx = kd\tau \quad ddx = dk d\tau$$

$$dy = qd\tau \quad ddy = dq d\tau.$$

Donc en substituant de nouveau

$$\frac{dk}{\gamma - k} = -\frac{dq}{q}.$$

dont l'intégrale est

$$-\log \frac{\gamma - k}{\gamma} = \log \frac{Q}{q},$$

& partant

$$\frac{q}{Q} = \frac{\gamma - k}{\gamma},$$



ce qui veut dire

$$AG : HG = MR : RP.$$

d'où il suit, que la direction de la diagonale MP, ou QD, qui est celle de la force composée, reste par tout la même, ou qu'elle est par tout parallèle à AH.

§. 75. Ayant donc trouvé

$$\frac{y-k}{y} = \frac{q}{Q}$$

cette équation étant multipliée par  $d\tau$ , se change en

$$d\tau - \frac{k d\tau}{y} = \frac{q d\tau}{Q}$$

ce qui donne

$$d\tau - \frac{dx}{y} = \frac{dy}{Q}$$

& partant l'intégrale

$$\tau - \frac{x}{y} = \frac{y}{Q}$$

ou bien

$$\tau = \frac{x}{y} + \frac{y}{Q}$$

c'est à dire le tems que le corps employe à parcourir l'arc AM est la somme du tems que le fluide employe pour parcourir l'abscisse Am, & de celui que le corps employeroit, si avec la vitesse qu'il a en A, il avoit à parcourir l'ordonnée m M.

§. 76. Mais revenons à nos équations différentielles, & introduisons-y l'angle HAG, dont nous venons de voir qu'il est constant. En conséquence nous aurons pour les ordonnées

$$PM = MR. \sec. \psi = dy \sec \psi$$

&



& partant

$$- d d y = \frac{d y^2}{a \cos \psi}$$

Mais il est

$$q d \tau = d y \quad d q d \tau = d d y,$$

ce qui donne

$$- d q \cdot d \tau = \frac{q^2 d \tau^2}{a \cos \psi}$$

$$- \frac{d q}{q q} = \frac{d \tau}{a \cos \psi}$$

dont l'intégrale est

$$\frac{\tau}{a \cos \psi} = \frac{1}{q} - \frac{1}{Q} = \frac{Q - q}{Q q}.$$

Ensuite la même équation

$$- \frac{d q}{q q} = \frac{d \tau}{a \cos \psi}$$

nous donne

$$- \frac{d q}{q} = \frac{q d \tau}{a \cos \psi} = \frac{d y}{a \cos \psi}$$

dont l'intégrale est

$$\frac{y}{a \cos \psi} = \log \frac{Q}{q}$$

& de là, en exprimant  $Q$  par  $\tau$ ,

$$\frac{y}{a \cos \psi} = \log \left( 1 + \frac{\tau Q}{a \cos \psi} \right)$$

$$\tau = \frac{a \cos \psi}{Q} (e^{y : a \cos \psi} - 1).$$



§. 77. De la même manière nous avons pour les abscisses

$$\frac{ddx}{\gamma d\tau - dx} = \frac{PM}{a} = \frac{(\gamma d\tau - dx)}{a \sin \psi}$$

mais il est

$$k d\tau = dx \quad dk d\tau = dd x.$$

Ces valeurs étant substituées, il sera

$$\frac{(\gamma - k)^2 d\tau}{a \sin \psi} = dk$$

$$\frac{d\tau}{a \sin \psi} = \frac{dk}{(\gamma - k)^2},$$

dont l'intégrale est

$$\frac{\tau}{a \sin \psi} = \frac{1}{\gamma - k} - \frac{1}{\gamma}.$$

§. 78. Ensuite l'équation

$$\frac{d\tau}{a \sin \psi} = \frac{dk}{(\gamma - k)^2}$$

se change en

$$\frac{k d\tau}{a \sin \psi} = \frac{k dk}{(\gamma - k)^2} = \frac{dx}{a \sin \psi}$$

d'où l'on tire l'intégrale

$$\frac{x}{a \sin \psi} = \log \left( \frac{\gamma - k}{\gamma} \right) + \frac{k}{\gamma - k}.$$

§. 79. Enfin nous avons (§. 75.)

$$\tau = \frac{x}{\gamma} + \frac{y}{Q}$$





ce qui donne

$$Q r = \frac{Q x}{\gamma} + y$$

ou bien

$$Q r = x \cot \psi + y = a \cot \psi (e^{y : a \cot \psi} - 1) \quad (\S. 76.)$$

Donc il est

$$x = a \sin \psi (e^{y : a \cot \psi} - 1) - y \cdot \tan \psi.$$

ou

$$\frac{x}{a \sin \psi} = e^{y : a \cot \psi} - 1 = \frac{y}{a \cot \psi}.$$

Faisant

$$\begin{aligned} A T &= A B = R P = 1, \\ A R &= B P = y : a \cot \psi \end{aligned}$$

Fig. 6.

il fera

$$Q M = \frac{x}{a \sin \psi}.$$

Donc BP de même que BQ est proportionnelle à y, & QM à x.

§. 80. Cette construction fait voir, comment la courbe AME, se construire aisément moyennant une logarithmique. Il en résulte pareillement, que la branche AME n'est point asymptotique, mais bien celle qui s'étend de l'autre côté de la ligne AB, & qu'en général la courbe AME n'est autre chose qu'une logarithmique placée obliquement.

Fig. 7.

§. 81. Quoique, depuis le point A, le mouvement du fluide commence à accélérer celui du corps, l'effet de la résistance ne laisse pas cependant de l'emporter encore, & le corps doit continuer de se mouvoir vers E, avant que ces deux effets se contrebalancent. L'équation (§. 75.)

$$\frac{\gamma - k}{\gamma} = \frac{q}{Q}$$

nous



nous conduit le plus facilement à trouver le point où cela arrive.  
Elle se change en

$$q = Q - k \cot \psi$$

d'où l'on obtient le carré de la vitesse tangentielle

$$c^2 = q^2 + k^2 = k^2 + Q^2 - 2Qk \cot \psi + k^2 \cot^2 \psi$$

& en prenant les différentielles

$$0 = c \, dc = (k - Q \cot \psi + k \cot^2 \psi) :$$

ce qui donne

$$k = Q \sin \psi \cot \psi$$

$$q = Q \sin \psi^2$$

$$c = Q \sin \psi.$$

Donc

$$q = c \sin \psi$$

$$k = c \cot \psi.$$

Ainsi le point où la vitesse tangentielle recommence à croître, se trouve là où la diagonale PM est perpendiculaire sur la courbe. L'équation (§. 76.)

$$y = n \cot \psi. \log \frac{Q}{q}$$

nous fournit l'ordonnée repondante à ce point, si nous y substituons la valeur

$$\frac{Q}{q} = \operatorname{cosec} \psi^2$$

que nous venons de trouver. Cette ordonnée sera donc

$$y = n \cot \psi. 2 \log. \operatorname{cosec} \psi.$$

§. 82. Après les deux cas, que nous venons de considérer, nous passerons à contempler quelques uns de ceux où il se trouve un équi-



équilibre entre l'action de la gravité & celle du fluide, dont le mouvement tend à entrainer un corps qui s'y trouve. A l'exception des fontaines saillantes, il n'y a gueres de cas où un fluide se meuve de bas en haut dans une direction opposée à celle de la pesanteur. Dans ces cas l'équilibre aura lieu, lorsqu'il sera

$$CC = ng,$$

c'est à dire, là où la vitesse du fluide est la même que celle que la boule acquerroit en tombant dans ce fluide d'une hauteur infinie. Si donc on met sur le tuyau d'une fontaine qui jette ces eaux verticalement, une boule dont la pesanteur spécifique surpasse celle de l'eau, & dont le diametre est plus petit, ou du moins pas plus grand que celui de l'ouverture du tuyau, cette boule sera toujours poussée à une certaine hauteur, où elle restera comme suspendue en équilibre, & ce point sera là où il est

$$CC = ag.$$

Il est cependant possible, que ce point ne se trouve pas, & cela arrive toutes les fois que la vitesse initiale du fil d'eau n'est pas si grande que la vitesse  $C$ , ou la racine quarrée de  $ng$ .

§. 83. Si le mouvement du fluide est horizontal suivant la direction  $AB$ , & qu'on y suspende une boule plus pesante,  $B$ , à un fil  $BC$ , l'action du fluide empêchera la boule d'être dans une position inclinée  $BC$ , dans laquelle la boule restera en équilibre. Il y a longtemps qu'on s'est servi de ce moyen pour déterminer la vitesse du fluide. Ainsi je ne rapporterai ce cas ici, que pour en exprimer les formules par les mêmes lettres dont je me suis servi dans les calculs exposés ci-dessus. Soit donc la vitesse du fluide  $= c$ , son action sur la boule sera  $= ccd\tau^2: n = BM$ . Mais la boule ne pouvant se mouvoir que dans une direction perpendiculaire au fil  $BC$ , nous résoudrons cette action en  $MP$  &  $PB$ . Faisant donc l'angle  $BCA = \phi$ , nous aurons l'action suivant  $MP = ccd\tau^2 \cos\phi: n$ . Au contraire l'action de la gravité est  $= gd\tau^2 = BG$ , & elle doit

Fig. 8.



pareillement être résolue en  $GQ$  &  $QB$ . Il sera donc  $GQ = g d\tau^2 \sin \phi$ . De là nous aurons, en posant  $CB = 1$ ,

$$\frac{cc d\tau^2 \cos \phi}{a} - g d\tau^2 \sin \phi = dd\phi.$$

Or, dans le cas de l'équilibre, nous avons  $dd\phi = 0$ ; il sera donc

$$cc = ag \tan \phi = CC \tan \phi.$$

Ce qui fait voir que, toutes les fois que l'angle  $\phi$  est de 45 degrés, la vitesse  $c$  est  $= C$ , & par conséquent la même que celle que la boule acquiert en tombant dans ce fluide d'une hauteur infinie.

§. 84. Si on veut se servir de ce moyen pour déterminer la vitesse du vent, il sera bon d'avoir égard à différentes circonstances qui peuvent en assurer le succès. Je remarque d'abord que la lettre  $a$  est variable, puisqu'elle dépend de la densité de l'air, de sorte qu'il est (§. 33.)

$$a = \frac{1}{3} r D.$$

Nous avons déjà vu ci-dessus comment la densité de l'air varie, & de quelle manière il faut l'estimer, en employant le barometre & le thermometre. Mais, comme la lettre  $a$  dépend encore du diamètre de la boule & de sa gravité spécifique, il convient de déterminer ces deux points, de façon que les angles  $\phi$  ne soient ni trop grands ni trop petits. Supposons, par exemple, que l'angle  $\phi = 45$  degrés doive répondre à la vitesse du vent de 100 pieds du Rhin, par seconde, quand la densité de l'air est 850 fois moins grande que celle de l'eau. Nous aurons donc pour ce cas  $C = 100$ , & partant

$$CC = ag = 10000$$

$$a = \frac{10000}{31\frac{1}{4}} = 320 \text{ pieds.}$$

Donc

$$320 = \frac{1}{3} r D$$

$$rD = 60 \text{ pieds.}$$

Moyen.



Moyennant cette équation, la gravité spécifique de la boule étant donnée, on en trouve le demi-diamètre  $r$ . Supposons, par exemple, que la boule soit d'un bois léger, dont la gravité spécifique ne surpasse celle de l'air que 600 fois; nous aurons  $r = \frac{600}{8000} = \frac{3}{40}$  pieds. On diminuera ce demi-diamètre en prenant une boule plus pesante spécifiquement, ou en se contentant d'une vitesse  $C$  moins grande. Car on voit qu'il est en général

$$r = \frac{3CC}{16D}.$$

§. 85. Si, au lieu de la boule, on ne suspend qu'une règle, ou un corps parallélépipède, l'effet de l'action du fluide se calcule autrement. Que le poids en soit  $= P$ , le poids d'un volume égal du fluide  $= P: D$ , l'épaisseur  $= h$ , & nous aurons (§. 31. 32.)

$$\frac{aP}{2hD} = P$$

$$a = 2hD$$

$$CC = ag = 2ghD.$$

§. 86. Ensuite l'action absolue du fluide est également

$$MB = \frac{cc}{a} d\tau^2,$$

mais le plan  $BC$  étant oblique, cette action sera moindre en raison du sinus d'incidence, puisque la quantité du fluide diminue dans ce rapport. Cette action est encore moindre à cause de l'obliquité d'incidence qui en diminue l'efficacité, de sorte que nous avons

$$MP = \frac{cc d\tau^2}{a} \cdot \cos \phi^2,$$

& partant

$$MP - QG = \frac{cc d\tau^2 \cos \phi^2}{a} - g d\tau^2 \sin \phi = dd\phi.$$

V 2

Or,



Or, pour le cas de l'équilibre, il est  $dd\phi = 0$ , donc il sera

$$\frac{cc}{a} \cos \phi^2 = g \sin \phi.$$

$$cc = \frac{ag \sin \phi}{\cos \phi^2} = CC \tan \phi. \sec \phi.$$

Fig. 9. §. 87. Si ce plan n'est point suspendu ou voluble autour d'un point fixe C, le calcul se fait encore d'une autre manière. Que le plan soit CE, la direction du mouvement du fluide AB, sa vitesse  $= c$ . Soit BN l'action du fluide, qui résulteroit si son mouvement étoit perpendiculaire au plan; & il sera

$$BN = \frac{cc}{a} d\tau^2.$$

Mais cette action est diminuée en raison de BN à MB, puisqu'un plan oblique est exposé à une moindre quantité du fluide. Elle est encore diminuée dans le rapport de MB à MP, parce que l'obliquité d'incidence en diminue la force. Enfin cette action MP se résout en PR & PQ, de sorte qu'il n'y a que cette dernière qui s'oppose à celle de la gravité. Faisant donc l'angle EBF  $= \phi$ , nous aurons

$$PQ = \frac{cc d\tau^2}{a} \cdot \cos \phi^2 \cdot \sin \phi.$$

Soit donc l'action de la gravité  $= BG = g d\tau^2$ , & il sera

$$\frac{cc}{a} \cdot d\tau^2 \cdot \cos \phi^2 \cdot \sin \phi - g d\tau^2 = dd x.$$

Et dans le cas de l'équilibre, il est  $dd x = 0$ ; donc

$$cc = ag : \cos \phi^2 \sin \phi.$$

Si donc la vitesse du fluide est telle que le demande cette équation, le plan EC ne montera ni ne tombera, mais il sera mu horizontalement avec une vitesse qui est due à la partie de l'action du fluide  $= PR =$

$$\frac{cc}{a} d\tau^2 \cdot \sin \phi^2.$$





§. 88. Cette dernière équation nous offre un *maximum*. Car, la lettre  $a$  dépendant du poids du plan, on peut la considérer comme variable. Il s'agit donc de définir les angles  $\Phi$ , où ce poids peut être le plus grand possible, en gardant la même vitesse du fluide. Il est donc

$$a = \frac{cc}{g} \cdot \sin \Phi (1 - \sin \Phi^2)$$

$$da = 0 = \frac{cc}{g} (d \sin \Phi - 3 \sin \Phi^2 \cdot d \sin \Phi)$$

$$\sin \Phi^2 = \frac{1}{3}.$$

Mais il est en général

$$1 - 2 \sin \Phi^2 = \cos 2 \Phi;$$

donc il fera

$$\cos 2 \Phi = \frac{1}{3};$$

ce qui donne l'angle  $\Phi = 70^\circ, 32'$ . Si donc l'angle EBF est de  $70\frac{1}{2}$  degrés, le plan EC pourra avoir le plus grand poids possible. Mais, si le poids est moins grand, il est clair qu'on aura le choix de faire l'angle  $\Phi$  plus grand ou plus petit que  $70\frac{1}{2}$  degrés, & qu'on trouvera toujours un angle tel que le plan ne pourra ni tomber ni descendre.. On n'aura pour cet effet qu'à résoudre l'équation

$$\sin \Phi - \sin \Phi^3 = \frac{ag}{cc} = \frac{CC}{cc},$$

& n'en retenir que les racines positives. C'est à dire qu'on fera

$$- \frac{3CC\sqrt{3}}{2cc} = \cos w,$$

& on aura les trois racines

$$\sin \Phi = \sqrt[3]{\frac{1}{3} \cdot \cos \frac{1}{3} w}$$

$$\sin \Phi' = \sqrt[3]{\frac{1}{3} \cdot \cos (\frac{1}{3} w \pm 120^\circ)}.$$



Entre ces trois racines il y en a toujours une qui est plus grande que 1, & qui par là même ne sauroit avoir lieu, puisque les sinus ne sont jamais plus grands que le rayon. Or l'angle  $w$  est toujours plus grand que 90 degrés; donc  $\frac{1}{3}w > 30^\circ$ , &  $\frac{1}{3}w + 120^\circ > 150^\circ$ , de la  $\cos(\frac{1}{3}w + 120^\circ) > \sqrt{\frac{3}{4}}$ . Ainsi la valeur de  $\sqrt{\frac{1}{3}} \cdot \cos(\frac{1}{3}w + 120^\circ)$  est non seulement négative, mais en même tems aussi plus grande que le rayon. Les deux racines seront donc  $\sqrt{\frac{1}{3}} \cdot \cos \frac{1}{3}w$ , &  $\sqrt{\frac{1}{3}} \cos(\frac{1}{3}w - 120^\circ)$ . Du reste il convient de remarquer, que tout ceci n'a lieu, que lorsque le plan EC n'a point encore reçu de mouvement. Car, dès qu'il se meut le calcul doit être fait autrement puisqu'il faudra considérer ce qui s'y trouve de relatif.

Planche IV.  
Fig. 10.

§. 89. Passons maintenant à considérer le cas où une boule, jetée obliquement dans un milieu résistant, est exposée en même tems à la résistance du milieu & à l'action de la gravité. Soit CAB la courbe qu'elle parcourt, AD la droite verticale qui passe par le sommet de cette courbe, EAQ la droite horizontale qui passe par le même sommet A. Que la boule, après avoir passé par A, parvienne au point M, & que sa vitesse en M soit  $= c$ , de sorte qu'avec cette vitesse elle pourroit parcourir l'espace M $\eta$  dans le tems  $d\tau$ . Mais la résistance la retardant, elle ne parvient qu'en  $\pi$ , & l'action de la gravité fait que réellement elle se trouve en  $m$ . Nominons

$$AP = x \quad PQ = NM = dx$$

$$MP = y \quad Nq = dy$$

$$\text{Parc AM} = v \quad Mm = dv$$

$$\text{l'angle PMT} = \phi,$$

Faisons encore la vitesse horizontale  $= k$ , la vitesse verticale  $= g$ , de sorte qu'il soit

$$cd\tau = dv$$

$$kd\tau = dx$$

$$gd\tau = dy,$$



& il fera ..

$$k^2 + q^2 = c^2$$

$$k = c \sin \phi$$

$$q = c \cos \phi.$$

§. 90. Ce qui étant posé, il s'agit de déterminer la diminution des vitesses  $c$ ,  $k$ ,  $q$ . Je remarque en conséquence, que la vitesse tangentielle  $c$  s'altère par la résistance aussi bien que par la gravité. Le premier effet sera  $= \frac{c dv}{a}$ , parce qu'il est en raison de la vitesse même & en celle de l'espace parcouru. Cet effet influe proportionnellement sur les vitesses horizontale & verticale, de sorte qu'il sera pour la verticale  $= \frac{q dv}{a} = \frac{c dy}{a}$ , pour l'horizontale  $= \frac{k dv}{a} = \frac{c dx}{a}$ . Or la gravité agissant verticalement, elle n'altère point la vitesse horizontale. Nous aurons donc

$$\frac{c dx}{a} = \frac{k dv}{a} = - dk.$$

ce qui donne •

$$\frac{dv}{a} = - \frac{dk}{k}.$$

Nommant donc la vitesse au sommet  $A = G$ , nous aurons l'intégrale

$$- \log \frac{k}{G} = \frac{v}{a}.$$

*Si donc les parties de l'arc croissent en progression arithmétique, les vitesses horizontales décroissent en progression géométrique, ou bien le logarithme de la vitesse horizontale est toujours en raison de l'arc parcouru par la boule.* Cette proposition est fort analogue à celles que nous avons trouvées pour le mouvement horizontal & pour la chute des corps dans un milieu résistant (§. 10. 19. 20.)

§. 91.



§. 91. La gravité agissant verticalement, elle augmente la vitesse verticale d'une partie  $= g d\tau = g dy : q$ . Il sera donc

$$\frac{g dy}{q} - \frac{c dy}{a} = dq$$

§. 92. Enfin, cet effet de la gravité étant  $= \pi m$ , il n'augmente l'arc parcouru que de la partie  $\mu m = \pi m \cos \phi$ . Il sera donc

$$\frac{g dy \cdot \cos \phi}{q} - \frac{c dv}{a} = dc.$$

§. 93. Mais il est

$$dy : q = dv : c;$$

donc en substituant il sera

$$\frac{g dv \cos \phi}{c} - \frac{c dv}{a} = dc,$$

& partant

$$\frac{dv}{ac} = \frac{d\tau}{a} = \frac{dc}{ag \cos \phi - cc}.$$

§. 94. La formule du §. 91.

$$\frac{g dy}{q} - \frac{c dy}{a} = dq$$

donne pareillement

$$\frac{dy}{aq} = \frac{d\tau}{a} = \frac{dq}{ag - cq} = \frac{dq}{ag - cc \cos q}.$$

§. 95. Enfin nous aurons aussi (§. 90.)

$$\frac{dv}{ac} = \frac{d\tau}{a} = - \frac{dk}{ck}$$



de sorte que le tems  $d\tau$  s'exprime par les vitesses de trois manieres différentes, en ce qu'il est

$$\frac{d\tau}{a} = \frac{dk}{kc} = \frac{dc}{ag \cos \Phi - cc} = \frac{dq}{ag - cc \cos \Phi}.$$

En comparant ces formules avec celles que nous avons trouvées pour le mouvement horizontal & pour la chute des corps dans des milieux résistans (§. 8. 15.) on trouvera aisément de quelle maniere elles en diffèrent. Elles sont d'une même forme, mais plus embarrassantes, puisqu'il s'y trouve, ou l'angle  $\Phi$ , ou deux des vitesses  $c$ ,  $k$ ,  $q$ , à la fois; & c'est l'unique cause, qui les rend plus intraitables.

§. 96. Reprenons cependant l'équation

$$\frac{dc}{ag \cos \Phi - cc} = \frac{dq}{ag - cc \cos \Phi},$$

& elle se transformera en

$$\frac{cdc}{ag \cos \Phi \cdot c - c^3} = \frac{dq}{ag - cc \cos \Phi}.$$

Mais il est

$$c \cos \Phi = q;$$

donc il fera

$$\frac{cdc}{agq - c^3} = \frac{dq}{ag - cq},$$

ce qui donne

$$ag(cdc - qdq) = qc^2dc - c^2q.$$

Mais il est

$$cdc - qdq = kdk;$$

donc il fera

$$ngkdk = (qdc - cdq)cc,$$

ou bien

$$\frac{ngkdk}{ccqq} = \frac{qdc - cdq}{qq} = d\left(\frac{c}{q}\right).$$



Mais il est

$$c: q = 1: \cos \phi$$

$$1: c = \sin \phi: k$$

$$1: q = \tan \phi: k;$$

donc en substituant il sera

$$\frac{ag \, k \, dk \cdot \sin \phi^2 \cdot \tan \phi^2}{k^4} = d \left( \frac{1}{\cos \phi} \right),$$

& partant

$$\begin{aligned} \frac{ag \, dk}{k^3} &= \frac{\cos \phi^2}{\sin \phi^4} \cdot d \frac{1}{\cos \phi} = - \frac{d \cos \phi}{\sin \phi^4} = \frac{d \phi}{\sin \phi^3} \\ - \frac{ag \, dk}{k^3} &= - \frac{d \phi}{\sin \phi^3}, \end{aligned}$$

dont l'intégrale est

$$\frac{ag}{kk} = \frac{\cos \phi}{\sin \phi^2} - \log \tan \frac{1}{2} \phi + \text{const.}$$

La constante est  $= ag: GG$ , donc il sera

$$\frac{k}{G} = \frac{C}{V(C^2 + G^2 (\cos \phi: \sin \phi^2 - \log \tan \frac{1}{2} \phi))},$$

ou bien

$$\frac{k}{G} = \frac{C: G}{V(C^2: G^2 + \cos \phi: \sin \phi^2 - \log. \tan \frac{1}{2} \phi)}.$$

§. 97. Or la quantité  $\cos \phi: \sin \phi^2 - \log. \tan \frac{1}{2} \phi$  est la longueur d'un arc parabolique, depuis le sommet de la parabole jusqu'au point où elle s'incline vers son axe sous un angle  $= \phi$ , & le paramètre de cette parabole doit être pris  $= 4$ . Si on prend sur cette parabole, de l'autre côté du sommet, un arc  $= C^2: G^2$ , on déterminera le point où l'inclinaison de la parabole vers son axe est la même que celle de l'asymptote EF vers la verticale FAD, de sorte qu'en



qu'en comptant l'arc parabolique depuis ce point, & la longueur jusqu'au point où son inclinaison est  $= \Phi$ , étant posée  $= p$ , on aura

$$\frac{k}{G} = C: G\sqrt{p}.$$

§. 98. Mais nous avons vu (§. 90.) qu'il est

$$- \log \frac{k}{G} = \frac{v}{a};$$

Donc, en substituant la valeur de  $k$ , il sera

$$\frac{v}{a} = \log \frac{G}{C} + \frac{1}{2} \log p.$$

Ayant construit une parabole  $cab$ , dont le parametre soit  $= 4$ , & dont l'axe  $ad$  soit parallele à AD, tirez une tangente  $fe$  parallele à l'asymtote FE, & une autre  $mt$  parallele à la tangente MT, & vous aurez

$$\frac{AM}{a} = \frac{v}{a} = \log. \text{arc. } eam - \log. \text{arc. } am = \log \frac{\text{arc. } eam}{\text{arc. } am}.$$

$$\frac{k}{G} = \frac{\sqrt{\text{arc. } am}}{\sqrt{\text{arc. } eam}}.$$

§. 99. Nous avons trouvé, qu'il est (§. 90. 96.)

$$\frac{c dx}{a} = - dk$$

$$\frac{ng dk}{k^3} = \frac{d\Phi}{\sin \Phi^3};$$

d'où il suit

$$\frac{gc dx}{k^3} = - \frac{d\Phi}{\sin \Phi^3}.$$



Mais il est

$$c = k: \sin \phi;$$

donc en substituant, il sera

$$\frac{g dx}{k^2} = - \frac{d\phi}{\sin \phi^2} = d \cot \phi$$

$$g dx = k^2. d \cot \phi.$$

Et de là

$$g dy = k^2. \cot \phi. d \cot \phi$$

$$g dv = k^2. \operatorname{cosec} \phi. d \cot \phi$$

$$\frac{g dx}{k} = g d\tau = k. d \cot \phi.$$

Or la vitesse horizontale étant donnée par une fonction de l'angle  $\phi$  (§. 96.) on n'aura qu'à la substituer dans ces formules, pour avoir des équations différentielles entre  $x$ ,  $y$ ,  $\tau$  &  $\phi$ .

§. 100. Mais ces équations étant peu traitables, nous remarquerons que le parametre de la parabole  $cam$  étant posé  $= 4$ , & l'angle  $gmt = \phi$ , il sera

$$\frac{1}{2} ns = d \cot \phi$$

$$\frac{1}{2} mn = \cot \phi. d \cot \phi.$$

Nous avons de plus (§. 98.)

$$k = G \sqrt{\left(\frac{am}{eam}\right)}.$$

Donc, en substituant ces valeurs dans les formules du §. 99. il sera

$$2g dx = G^2. \frac{am}{eam}. ns$$

$$2g d\tau = G. \sqrt{\left(\frac{am}{eam}\right)}. ns$$

$$2g dy = G^2. \frac{am}{eam}. mn$$

Et



Et par ces formules il sera facile de construire des lignes courbes, dont les espaces représentent les valeurs  $x$ ,  $y$ ,  $\tau$ . Car les arcs  $am$ ,  $eam$ , se déterminant par les angles  $\Phi$ , on n'aura qu'à faire les ordonnées

$$qi = G^2 \cdot \frac{am}{eam}$$

$$qh = G \sqrt{\frac{am}{eam}}$$

$$\lambda l = G^2 \cdot \frac{am}{eam},$$

& on aura les espaces des courbes construites de cette façon

$$aIiq = 2gx$$

$$aHhq = 2g\tau$$

$$aLl\lambda = 2gy.$$

Ces trois courbes approchent d'autant plus des lignes droites parallèles à  $aq$  &  $a\lambda$ , moins la résistance est grande; & si elle est  $= 0$ , on aura au lieu de ces courbes des droites parallèles à  $aq$ ,  $a\lambda$ , dont par conséquent les espaces sont proportionels aux ordonnées & aux abscisses de la parabole  $eam$ , ce qui veut dire que la route de la boule sera parabolique.

§. 101. Lorsque l'abscisse  $a\lambda$  commence à être extrêmement grande, la longueur de l'arc  $am$  ne différera plus beaucoup de  $a\lambda$ , & par conséquent il croîtra à très peu près en raison du carré de l'ordonnée  $\lambda m = aq$ . Ainsi l'ordonnée  $qi$  décroît encore plus fortement qu'en raison réciproque de l'abscisse  $aq$ . Il s'ensuit que l'espace  $aIiq$ , que nous avons trouvé être égal à  $2gx$  a une grandeur finie, quand même on prend l'abscisse  $aq$  infinie. Nous pouvons conclure de là, que la courbe CAM a non seulement l'asymptote oblique EF, mais que son autre branche AB a encore une



asymptote, dont la position est verticale. Car  $x$  ne devient pas un *maximum* à moins qu'il ne soit  $\phi = 0$ .

§. 102. N'y ayant pas moyen de trouver des formules intégrales finies pour les quantités  $x$ ,  $y$ ,  $t$ , j'ai essayé de les exprimer par des suites infinies, dont du moins chaque terme pourroit être exprimé par des logarithmes ou par des fonctions circulaires. Je n'ai pu réussir que pour les abscisses  $x$ . Voici de quelle façon je m'y suis pris.

§. 103. Nommons la cotangente de l'angle  $\phi = z$ , & nous aurons

$$\cotang \phi = z$$

$$- d\phi = \frac{dz}{1 + zz}$$

$$\sin \phi = \frac{1}{V(1 + zz)},$$

& partant (§. 96.)

$$- \frac{ag dk}{k^3} = - \frac{d\phi}{\sin \phi^3} = dz \cdot V(1 + zz)$$

$$\frac{ag}{k^2} = 2f dz V(1 + zz) + \text{const.}$$

ce qui donne (§. 96.)

$$\frac{k}{G} = \frac{C: G}{V(C^2: G^2 + 2f dz V(1 + zz))}$$


Mais il est (§. 99.)

$$g dx = k^2 d \cot \phi = k^2 dz;$$

donc, en substituant la valeur de  $k$ , il sera

$$g dx = \frac{CC dz}{C^2: G^2 + 2f dz V(1 + zz)}.$$

Cette





Cette fraction étant résolue en une série, on aura

$$\frac{g dx}{GG} = dz - \frac{2G^2}{C^2} dz \int dz \sqrt{(1+zz)} + \frac{4G^4}{C^4} dz (\int dz \sqrt{(1+zz)})^2 \\ - \frac{8G^6}{C^6} dz (\int dz \sqrt{(1+zz)})^3 + \&c.$$

Or nommant les intégrales de chaque terme P, Q, R, S, &c. & faisant  $\int dz \sqrt{(1+zz)} = r$ , &  $\sqrt{(1+zz)} = s$ , on aura

$$P = z$$

$$Q = zr - \frac{1}{3}s^3$$

$$R = zr^2 - \frac{2}{3}s^3r + \frac{2}{3}z + \frac{4}{9}z^3 + \frac{1}{15}s^5$$

$$S = zr^3 - \frac{2}{3}s^3r^2 + 2(z + \frac{2}{3}z^3 + \frac{1}{5}z^5)r - (\frac{1}{4}s^5 + \frac{8}{7}s^5s + \frac{2}{3}s^7)$$

$$T = zr^4 - \frac{4}{3}s^3r^3 + 4(z + \frac{2}{3}z^3 + \frac{1}{5}z^5)r^2 - (\frac{6}{5}s^5 + \frac{2}{7}s^5s + \frac{8}{3}s^7) \\ + 8(\frac{1}{2}s^3z + \frac{2}{3}s^3z^3 + \frac{8}{15}s^5z^5 + \frac{8}{3}s^5s^3 + \frac{1}{3}s^7).$$

Et il sera

$$\text{Const.} + \frac{gx}{GG} = P - \frac{2G^2}{C^2} \cdot Q + \frac{4G^4}{C^4} \cdot R - \frac{8G^6}{C^6} \cdot S + \frac{16G^8}{C^8} \cdot T - \&c.$$

Dans cette suite les lettres P, Q, R, S, T, &c. dépendent uniquement de l'angle  $\phi$ , & par conséquent elles sont tout à fait indépendantes des vitesses & de la résistance du milieu. Nous voyons de là, que les abscisses  $x$  s'expriment par une suite qui procède suivant les dimensions paires des vitesses. Il faut encore remarquer, que lorsqu'on veut avoir les abscisses  $x$  pour la branche AC, il faut prendre tous les termes de cette suite négatifs. Enfin, si on compte les abscisses depuis le sommet A, il faut que  $x$  devienne = 0, lorsque  $z = 0$ , & par là on détermine la constante, qui sera donc

$$\text{const.} = \frac{2G^2}{3C^2} + \frac{8 \cdot 326}{525} \cdot \frac{G^6}{C^6} + \&c.$$



Du reste, la suite que nous venons de trouver n'est convergente, qu'à moins que l'angle  $\phi$  soit plus grand que l'angle AFE.

§. 104. On trouvera de la même manière une suite assez semblable pour le tems  $\tau$ . Car il est (§. 99. 103.)

$$g d\tau = k d \cot \phi = k dz$$

$$\frac{k}{G} = \frac{C: G}{V(C^2: G^2 + 2fdz V(1 + zz))}.$$

Donc, en substituant cette valeur de  $k$ , on aura

$$\frac{g d\tau}{G} = \frac{C dz: G}{V(C^2: G^2 + 2fdz V(1 + zz))}.$$

Cette formule étant résolue en une suite donnera

$$\begin{aligned} \frac{g d\tau}{G} = dz - \frac{2 G^2}{2 C^2} dz f dz V(1 + zz) + \frac{4 \cdot 3 G^4}{2 \cdot 4 C^4} \cdot dz [f dz V(1 + zz)]^2 \\ - \frac{8 \cdot 3 \cdot 5 \cdot G^6}{2 \cdot 4 \cdot 6 C^6} \cdot dz [f dz V(1 + zz)]^3 + \&c. \end{aligned}$$

dont l'intégrale est

$$\begin{aligned} \text{Const.} + \frac{g\tau}{G} = P - \frac{2 G^2}{2 C^2} \cdot Q + \frac{4 \cdot 3 \cdot G^4}{2 \cdot 4 C^4} \cdot R - \frac{8 \cdot 3 \cdot 5 \cdot G^6}{2 \cdot 4 \cdot 6 C^6} \cdot S \\ + \frac{16 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot G^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 C^8} \cdot T - \&c. \end{aligned}$$

On peut faire sur cette série les mêmes remarques comme sur celle qui exprime les abscisses  $x$ . Les Lettres P, Q, R, S, T, &c. ont la même valeur, la constante se détermine de la même manière, & elle est convergente sous la même condition &c. Mais, en comparant l'une & l'autre suite, on voit que si la fraction  $G: C$  est si petite, que



que l'on puisse omettre le troisieme terme & les suivans, on aura à très peu près

$$\frac{g\tau}{G} + \frac{gx}{GG} = \frac{G^2}{2C^2} \cdot Q.$$

Mais  $x : G$  exprime le tems dans lequel l'espace  $x$  pourroit être parcouru avec la vitesse  $G$ . Faisant donc ce tems  $= t$ , on aura

$$\frac{g}{G} (\tau - t) = \frac{G^2}{2C^2} \cdot Q.$$

§. 105. La suite différentielle qu'on pourroit trouver de la même maniere pour l'élément  $dy$ , puisqu'il est

$$dy = z dx$$

n'offre point de termes intégrables. Et comme en général ces suites ne sont convergentes que pour de certains cas, je ne m'y arrêterai pas plus longtems, d'autant qu'elles n'expriment les quantités  $x, \tau, y$ , que par l'angle  $\Phi$  ou par les fonctions, & qu'elles ne pourroient conduire que d'une maniere extrêmement prolix & indirecte, à déterminer le rapport entre les ordonnées  $y$  & les abscisses  $x$ , qu'il s'agit de chercher.

§. 106. Nous avons trouvé (§. 99.)

$$g dv = k^2, \operatorname{cosec} \Phi. d \cot \Phi.$$

Mais il est

$$- d \cot \Phi = d\Phi. \operatorname{cosec} \Phi^2.$$

Donc il fera

$$- g dv = k^2. \operatorname{cosec} \Phi^3. d\Phi,$$

& partant

$$- \frac{dv}{d\Phi} = \frac{k^2 \operatorname{cosec} \Phi^3}{g}.$$



Mais  $dv : d\phi$  est le rayon de courbure, que nous nommerons  $R$ .  
Il fera donc

$$R = \frac{k^2 \operatorname{cosec} \phi^3}{g} = \frac{c^2 \cdot \operatorname{cosec} \phi}{g} = \frac{CC \cdot \operatorname{cosec} \phi^3}{g \cdot eam} = \frac{GG e^{-2v : a}}{g \cdot \sin \phi^3}.$$

Et nommant le rayon de courbure de la parabole  $eam$  au point  $m$ ,  
 $= \rho$ , nous aurons

$$R = \frac{CC}{2g} \cdot \frac{\rho}{eam}.$$

Car le parametre de cette parabole étant  $= 4$ , & l'angle  $gmt = \phi$ ,  
le rayon de courbure répondant au petit arc  $ms$  sera  $= 2 \operatorname{cosec} \phi^3$ .  
Et si la vitesse au point  $m$  est  $= c$ , ce rayon de courbure sera pa-  
reillement  $= \frac{c^2 \operatorname{cosec} \phi}{g}$ . Ainsi le rayon de courbure au point  $M$

ne dépend que de la vitesse  $c$  & de l'angle  $\phi$ , & par conséquent il  
est le même, quelle que soit la résistance du milieu. J'en conclus, que  
la courbe  $CAM$  peut être considérée comme composée de petits  
arcs de paraboles, dont le parametre change continuellement. Cette  
circonstance fait voir, qu'on peut exprimer les ordonnées  $y$  par une  
suite qui procède suivant les dimensions des abscisses. Voyons donc  
de quelle manière nous la déterminerons.

§. 107. En supposant les différentielles des abscisses  $dx$   
constantes, les différentielles  $dy$  croîtront d'une quantité qui est due  
à l'action de la gravité, de sorte qu'il sera

$$ddy = g d\tau^2.$$

Mais il est

$$dx^2 = k^2 d\tau^2 :$$

donc nous aurons

$$dx^2 : ddy = k^2 : g,$$



& partant

$$-\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{2dk}{k} = -\frac{2dv}{a}$$

§. 108. Soit donc la suite

$$y = \gamma x^2 + \delta x^3 + \epsilon x^4 + \mu x^5 + \rho x^6 + \sigma x^7 + \upsilon x^8 + \&c.$$

& nous aurons

$$dy = (2\gamma x + 3\delta x^2 + 4\epsilon x^3 + 5\mu x^4 + 6\rho x^5 + 7\sigma x^6 + 8\upsilon x^7 + \&c.) dx$$

$$ddy = (2\gamma + 6\delta x + 12\epsilon x^2 + 20\mu x^3 + 30\rho x^4 + 42\sigma x^5 + 56\upsilon x^6 + \&c.) dx^2$$

$$dddy = (6\delta + 24\epsilon x + 60\mu x^2 + 120\rho x^3 + 210\sigma x^4 + 336\upsilon x^5 + \&c.) dx^3$$

$$\frac{dv^2}{dx^2} = 1 + 4\gamma^2 x^2 + 12\gamma\delta x^3 + 16\epsilon\gamma x^4 + 20\mu\gamma x^5 + 24\rho\gamma x^6 + 28\sigma\gamma x^7 + \&c.$$

$$+ 9\delta\delta.. + 24\delta\epsilon.. + 30\delta\mu.. + 36\delta\rho..$$

$$+ 16\epsilon\epsilon.. + 40\epsilon\mu..$$

$$\frac{dv}{dx} = 1 + 2\gamma^2 x^2 + 6\gamma\delta x^3 + 8\gamma\epsilon x^4 + 10\gamma\mu x^5 + 12\gamma\rho x^6 + \&c.$$

$$+ 2\delta\delta.. + 12\delta\epsilon.. + 15\delta\mu..$$

$$- 2\gamma^4.. - 12\gamma^3\delta.. + 8\epsilon\epsilon..$$

$$- 27\gamma^2\delta^2..$$

$$- 16\gamma^3\epsilon..$$

$$+ 4\gamma^5..$$

Mais il est (§. 107.)

$$\frac{1}{2} a d^3y = ddy. dv.$$



Donc, en multipliant les deux suites trouvées pour  $ddy$  &  $dv$ , & égalant le produit à la suite  $\frac{1}{2}ad^3y$ , on aura

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{aligned} &= 3\delta n + 12\epsilon 1x + 30\mu 1x^2 + 60\rho 1x^3 + 105\sigma 1x^4 + 168\nu 1x^5 + 252\eta 1x^6 \\ &= 2\gamma + 6\delta.. + 12\epsilon.. + 20\mu + 30\rho.. + 42\sigma.. + 56\nu.. \\ &\quad + 4\gamma^3.. + 12\gamma^2\delta.. + 24\gamma^2\epsilon.. + 40\gamma^2\mu.. + 60\gamma^2\rho.. \\ &\quad + 36\gamma\delta^3.. + 72\gamma\delta\epsilon.. + 120\gamma\delta\mu.. \\ &\quad + 16\gamma^2\epsilon.. + 48\gamma\delta\epsilon.. + 96\gamma\epsilon^2.. \\ &\quad + 9\gamma\delta^2.. + 27\delta^3.. + 54\epsilon\delta^2.. \\ &\quad - 4\gamma^5.. - 12\gamma^4\delta.. - 24\gamma^4\epsilon.. \\ &\quad + 20\gamma^2\mu.. + 60\gamma\mu\delta.. \\ &\quad + 24\gamma\delta\epsilon.. + 72\epsilon\delta^2.. \\ &\quad - 24\gamma^4\delta.. - 72\gamma^3\delta^2.. \\ &\quad + 24\gamma^2\rho.. \\ &\quad + 30\gamma\delta\mu.. \\ &\quad + 16\gamma\epsilon^2.. \\ &\quad - 54\gamma^3\delta^3.. \\ &\quad - 32\gamma^4\epsilon.. \\ &\quad + 8\gamma^7.. \end{aligned} \right. \end{aligned}$$



§. 109. En comparant donc les termes, on aura

$$\delta = \frac{2\gamma}{3a}$$

$$\varepsilon = \frac{\delta}{2a} = \frac{\gamma}{3a^2}$$

$$\mu = \frac{2\varepsilon}{5a} + \frac{2\gamma^3}{15a} = \frac{2\gamma}{15a^3} + \frac{2\gamma^3}{15a}$$

$$\varrho = \frac{\mu}{3a} + \frac{2\gamma^2\delta}{5a} = \frac{2\gamma}{45a^4} + \frac{14\gamma^3}{45a^2}$$

$$\sigma = \frac{2\varrho}{7a} + \frac{8\gamma^2\varepsilon}{21a} + \frac{3\gamma\delta^2}{7a} - \frac{4\gamma^5}{105a} = \frac{4\gamma}{315a^5} + \frac{128\gamma^3}{315a^3} - \frac{4\gamma^5}{105a}$$

$$v = \frac{\sigma}{4a} + \frac{5\gamma^2\mu}{14a} + \frac{6\gamma\delta\varepsilon}{7a} + \frac{9\delta^3}{56a} - \frac{3\gamma^4\delta}{14a} = \frac{\gamma}{315a^6} + \frac{122\gamma^3}{315a^4} - \frac{11\gamma^5}{105a^2}$$

$$\eta = \frac{2v}{9a} + \frac{\gamma^2\varrho}{3a} + \frac{5\gamma\delta\mu}{6a} + \frac{4\gamma\varepsilon^2}{9a} + \frac{\varepsilon\delta^2}{2a} - \frac{2\gamma^4\varepsilon}{9a} - \frac{\gamma^3\delta^2}{2a} + \frac{2\gamma^7}{63a}$$

$$= \frac{2\gamma}{9 \cdot 315 \cdot a^7} + \frac{11 \cdot 32 \cdot \gamma^3}{945 \cdot a^5} - \frac{134\gamma^5}{945a^3} + \frac{2\gamma^7}{63a}$$

&c,

§. 110. Le coefficient  $\gamma$ , qui entre dans toutes les valeurs des autres, se détermine par les deux équations (§. 107.)

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{g}{k^2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 2\gamma + 6\delta x + 12\varepsilon x^2 + 20\mu x^3 + \&c.$$





Car, en posant  $x = 0$ , il doit être  $k = G$ : donc il sera

$$g: GG = 2\gamma$$

$$\gamma = \frac{g}{2GG}$$

§. III. En considérant ces coefficients tels que nous venons de les déterminer, on voit qu'ils procèdent suivant les dimensions impaires de  $\gamma$  & suivant les dimensions alternativement paires & impaires de  $a$ . Cette circonstance fait, que nous pourrons les exprimer d'une manière plus concise, en y substituant d'autres lettres. Faisons pour cet effet

$$2x: a = \xi$$

$$2y: a = \eta$$

$$\gamma = m: a$$

de sorte qu'il soit

$$2m = \frac{ag}{GG} = \frac{CC}{GG}$$

Et toutes les substitutions & réductions faites, nous aurons la suite

$$\begin{aligned} \eta = & \frac{m\xi^2}{2} + \frac{m}{2.3}\xi^3 + \frac{m}{2.3.4}\xi^4 + \frac{m}{2.3.4.5}\xi^5 + \frac{m}{2.3.4.5.6}\xi^6 \\ & + \frac{m^3}{2.3.4.5}\xi^5 + \frac{7m^3}{2.3.4.5.6}\xi^6 \\ & + \frac{m\xi^7}{2.3.4.5.6.7} + \frac{m\xi^8}{2.3.4.5.6.7.8} + \frac{m\xi^9}{2.3.4.5.6.7.8.9} + \&c. \\ & + \frac{4.8.m^3.\xi^7}{2.3.4.5.6.7} + \frac{2.61.m^3.\xi^8}{2.3.4.5.6.7.8} + \frac{11.24.m^3.\xi^9}{2.3.4.5.6.7.8.9} + \&c. \\ & - \frac{3.m^5.\xi^7}{2.3.4.5.6.7} - \frac{3.11.m^5.\xi^8}{2.3.4.5.6.7.8} - \frac{3.67.m^5.\xi^9}{2.3.4.5.6.7.8.9} + \&c. \\ & + \frac{5.9.m^7.\xi^9}{2.3.4.5.6.7.8.9} + \&c. \end{aligned}$$

§. III 2.



§. 112. Cette suite est assez remarquable. Nous voyons que la première ligne, qui n'est affectée que de  $m$ , est la même suite que celle qui exprime le nombre par son logarithme, & que pour la compléter, on n'a qu'à y joindre les deux premiers termes. Nous aurons donc, en faisant.

$$Y = \eta + m + m\xi,$$

$$Y = me^{\frac{1}{2}} + \left( \frac{m^3 \xi^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{7 \cdot m^3 \cdot \xi^6}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{4 \cdot 8 \cdot m^3 \cdot \xi^7}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \&c. \right) \\ - \frac{3 \cdot m^5 \cdot \xi^7}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7} + \&c. )$$

§. 113. Or, en faisant  $\xi = 0$ , il est  $\eta = 0$ , & partant  $Y = m$ . Ensuite le terme  $\xi$  étant également multiplié par  $m$ , il s'ensuit que  $m$  est la tangente d'un angle, & nommément de celui d'une asymptote logarithmique dont l'équation est

$$s = me^{\frac{1}{2}},$$

& qui par conséquent a une position oblique, de sorte qu'elle ressemble à la courbe AE de la septième figure, que nous avons déterminée ci-dessus (§. 80.). Mais cette asymptote n'est pas celle de la courbe CAB. Car puisqu'il est (§. 111.)

$$2m = \frac{CC}{GG},$$

& que, l'angle AFE étant fait  $= \psi$ , il doit être (§. 96.)

$$\frac{CC}{GG} - \cos \psi : \sin \psi^2 - \log. \text{tang } \frac{1}{2} \psi = 0,$$

il s'ensuit, qu'il est

$$2m = \frac{\cos \psi}{\sin \psi^2} - \log. \text{tang } \frac{1}{2} \psi,$$



& que partant le parametre de la parabole  $cab$  restant  $= 4$ , (§. 97.) il est

$$2m = \text{arc. } ae.$$

Mais l'arc  $\frac{1}{2}ae$  n'est égal à la tangente de l'angle  $fep$  que dans un seul cas; donc ce n'est aussi que dans un seul cas que l'asymtote  $FE$  a la même position, ou la même inclinaison que l'asymtote de la logarithmique, qu'exprime l'équation  $s = me^x$ .

§. 114. La suite que nous venons de trouver, ne commence à différer d'une suite logarithmique que dans la cinquieme dimension de l'abscisse  $\xi$ , où il s'y joint encore un *appendix*, dont on ne connoit point la loi de la progression des coefficients. On y voit les multiplicateurs 61, 67, &c. qui sont nombres premiers, & par là même les plus intraitables de tous. Mais, quoiqu'il en soit, c'est un avantage pour la pratique que cet *appendix* ne commence que dans la cinquieme dimension de  $\xi$ . Car l'équation

$$\xi = 2x : a$$

nous fait voir, que  $\xi$  est presque toujours une fraction assez petite, à moins qu'on ne veuille déterminer des points de la courbe  $CAB$ , qui sont très proches des asymtotes. Cette opportunité fait, qu'on peut presque toujours omettre les termes  $\xi^5$ , & les suivans, d'autant que leurs diviseurs sont considérablement grands.

§. 115. Je remarquerai encore, que la suite telle que nous venons de la trouver est pour la branche de la courbe par laquelle le corps descend. Pour l'appliquer à l'autre branche, par laquelle le corps monte, on n'a qu'à prendre l'abscisse  $\xi$  négative.

§. 116. Mais, comme il est assez ordinaire, qu'on ne calcule que ces cas où le corps retombe au niveau de l'endroit d'où il a été jetté, il sera plus convenable d'exprimer les abscisses  $\xi$  par les ordonnées  $\eta$ . Faisons pour cet effet

$$2\eta : m = i^2 = 4y : am.$$

Et



Et prenons la suite

$$\xi = i + ai^2 + bi^3 + ci^4 + di^5 + ei^6 + \&c.$$

les coefficients  $a, b, c, d, \&c.$  se déterminent en substituant cette valeur de  $\xi$  dans la suite du §. 111. & en égalant les termes. Par là on trouvera

$$a = -\frac{1}{6}$$

$$b = +\frac{1}{36}$$

$$c = -\frac{1}{270} - \frac{m^2}{120}$$

$$d = +\frac{1}{4320}$$

$$e = +\frac{1}{17010} + \frac{m^2}{7560} + \frac{m^4}{1680}$$

&c.

& partant

$$\xi = i - \frac{1}{6}i^2 + \frac{1}{36}i^3 - \frac{1}{270}i^4 + \frac{1}{4320}i^5 + \frac{1}{17010}i^6 + \&c.$$

$$- \frac{mm}{120}i^4 + \frac{m^2}{7560}i^5$$

$$+ \frac{m^4}{1680}i^6$$

§. 117. Cette suite est pareillement fort convergente. Elle donne la valeur de  $\xi$  pour la branche par laquelle le corps descend, & pour l'autre branche il faut prendre  $i$  négative, ce qui peut se faire, parce que  $i$  est la racine quarrée de  $4y:am.$  On aura donc

$$\xi' = -i - \frac{1}{6}i^2 - \frac{1}{36}i^3 - \frac{1}{270}i^4 - \&c.$$

$$- \frac{mm}{120}i^4$$

Car cette abscisse se comptant en arriere, elle est par elle-même négative.



§. 118. Quand on ne cherche que le jet horizontal, ou la somme des deux abscisses  $\xi$ ,  $\xi'$ , la suite se réduit à la moitié des termes, & nous aurons

$$\xi + \xi' = 2i + \frac{1}{18}i^3 + \frac{1}{2160}i^5 + \&c.$$

§. 119. Mais, quelque convergentes que soient ces suites, elles ne servent que d'une manière fort vague à calculer le jet horizontal, sans nous indiquer directement les angles que fait la courbe avec les droites verticales ou horizontales. Je vais donc en chercher une autre, qui dépende de l'angle d'élevation sous lequel le corps est jetté.

Fig. 11.

§. 120. Soit cet angle QAP, la ligne horizontale AB, la courbe que le mobile parcourt AMB. Tirons une ordonnée verticale quelconque QMP, & nommons

$$AP = x$$

$$PM = y.$$

Exprimons le rapport entre  $x$  &  $y$  par la suite

$$y = \epsilon x - \gamma x^2 - \delta x^3 - \epsilon x^4 - \mu x^5 - \&c.$$

les deux premiers coefficients se détermineront aisément. Car  $\epsilon$  sera la tangente de l'angle d'élevation QAP, de sorte qu'il sera

$$\epsilon = \text{tang QAP.}$$

Et  $\gamma$  se définit par la vitesse horizontale en A, que nous nommons K. Car si l'on prend l'abscisse  $x$  infiniment petite, la quantité  $x:K$  dénotera le petit tems que le mobile emploieroit à la parcourir, & le second terme  $\gamma x x$  marquera l'espace par lequel le corps tomberoit dans le même tems. Nous aurons donc, conformément aux loix de la pesanteur,

$$15\frac{1}{2} \cdot \frac{xx}{KK} = \gamma xx,$$



& partant

$$\gamma = \frac{1000}{64KK} = \frac{g}{2KK} \quad (\S. 14.)$$

§. 121. Ces deux coefficients devoient être déterminés d'avance parce que tous les autres en dépendent. Afin donc de les déterminer, nous nous servirons de l'équation trouvée ci-dessus (§. 107.)

$$\frac{d^3y}{2d^2y} = \frac{dv}{a}.$$

Car il fera, en prenant les différentielles, & en posant  $dx$  constante:

$$\begin{aligned} dy &= dx(\delta - 2\gamma x - 3\delta x^2 - 4\epsilon x^3 - 5\mu x^4 - \&c.) \\ -ddy &= dx^2(2\gamma + 6\delta x + 12\epsilon x^2 + 20\mu x^3 + \&c.) \\ -d^3y &= dx^3(6\delta + 24\epsilon x + 60\mu x^2 + \&c.) \end{aligned}$$

D'où l'on aura

$$\begin{aligned} \frac{d^3y}{2d^2y} &= dx \left( \frac{3\delta}{2\gamma} + \frac{6\epsilon}{\gamma} x + \frac{15\mu}{\gamma} x^2 + \frac{30\ell}{\gamma} x^3 + \&c. \right) \\ &\quad - \frac{9\delta\delta}{2\gamma\gamma} \dots + \frac{27\delta\epsilon}{\gamma\gamma} \dots - \frac{90\mu\delta}{\gamma\gamma} \dots \\ &\quad + \frac{27\delta^3}{2\gamma^3} \dots - \frac{36.\epsilon\epsilon}{\gamma\gamma} \dots \\ &\quad + \frac{108.\epsilon\delta\delta}{\gamma^3} \dots \\ &\quad - \frac{81.\delta^4}{\gamma^4} \dots \end{aligned}$$



Et en posant  $1 + \epsilon\epsilon = a\alpha$ , il sera  $\alpha = \sec QAP$ , &

$$\begin{aligned} \frac{dv}{a} = dx \left( \frac{a}{a} - \frac{2\gamma\epsilon}{a\alpha} x - \frac{3\epsilon\delta}{a\alpha} x^2 - \frac{4\epsilon\epsilon}{a\alpha} x^3 - \&c. \right) \\ + \frac{2\gamma\gamma}{a\alpha} \dots + \frac{6\gamma\delta}{a\alpha} \dots \\ - \frac{2\gamma^2\epsilon^2}{a^3\alpha} \dots + \frac{6\gamma\epsilon^2\delta}{a^3\alpha} \dots \\ + \frac{4\gamma^3\epsilon}{a^3\alpha} \dots \\ - \frac{4\gamma^3\epsilon^3}{a^5\alpha} \dots \end{aligned}$$

Egalant donc les termes de ces deux suites, on aura

$$\frac{a}{a} = \frac{3\delta}{2\gamma} \quad \text{ce qui donne } \delta = \frac{2a\gamma}{3a}$$

$$- \frac{2\gamma\epsilon}{a\alpha} = \frac{6\epsilon}{\gamma} - \frac{9\delta\delta}{2\gamma\gamma} \quad \text{ce qui donne } \epsilon = \frac{a\alpha\gamma}{3a\alpha} - \frac{\gamma\gamma\epsilon}{3a\alpha}$$

$$\begin{aligned} \mu = \frac{2a^3\gamma}{15a^3} - \frac{8\gamma\gamma\epsilon}{15a\alpha} + \frac{2\gamma^3}{15a\alpha} - \frac{2\gamma^3\epsilon^2}{15a\alpha^3} \\ \&c. \end{aligned}$$





§. 122. Ces valeurs étant substituées, nous aurons

$$y = \zeta x - \gamma x^2 - \frac{2\alpha\gamma}{3a} x^3 - \frac{\alpha\alpha\gamma}{3aa} x^4 - \frac{2\alpha^3\gamma}{15a^3} x^5 - \&c.$$

$$+ \frac{\gamma^2\zeta}{3.a\alpha} \dots + \frac{8\gamma\gamma\zeta}{15aa} \dots$$

$$- \frac{2\gamma^3}{15a\alpha} \dots$$

$$+ \frac{2\gamma^3\zeta^2}{15a\alpha^3} \dots$$

Dans cette suite il est (§. 120. 121.)

$$\zeta = \text{tang QAP}$$

$$a = \text{sec. QAP}$$

$$\gamma = \frac{1000}{64.KK}$$

Et par là on voit, que le premier terme de cette suite ne dépend que de l'angle d'élévation QAP, le second de la vitesse horizontale en A & de la gravité, & que les autres dépendent des deux premiers & de la résistance du milieu, puisque la lettre  $a$  entre dans la détermination des coefficients.

§. 123. Nommons maintenant la vitesse tangentielle en A  $= V$ , l'abscisse AQ  $= w$ , l'angle d'élévation QAP  $= \omega$ , & nous aurons

$$x = w. \text{cosin } \omega$$

$$K = V. \text{cosin } \omega$$

$$\gamma = \frac{1000. \text{sec } \omega^2}{64. VV} = \frac{g \text{ sec } \omega^2}{2 VV}$$

$$\zeta x = w. \text{sin } \omega.$$



Donc, en substituant ces valeurs, il sera

$$y = w \sin \omega - \frac{g \cdot w^2}{2 V^2} - \frac{w^3 g}{3 a V^2} - \frac{g w^4}{6 a^2 V^2} - \frac{g w^5}{15 V^2 a^3} - \&c.$$

$$+ \frac{g^2 w^4 \sin \omega}{12 a V^4} + \frac{2 g g w^5 \sin \omega}{15 V^4 a^2}$$

$$- \frac{g^3 w^5 \cos \omega^2}{60 a V^6}$$

Voilà donc la suite qu'il s'agissoit de trouver, & qui exprime l'ordonnée PM par l'abscisse AQ, la vitesse initiale V, l'angle d'élévation  $\omega$ , la gravité  $g$  & l'effet de la résistance  $a$ .

§. 124. Mais, pour comparer cette suite à celle que nous avons trouvée ci-dessus (§. 111.) nous ferons des substitutions tout à fait analogues. Nommons donc

$$\frac{2 w}{a} = \xi$$

$$\frac{2 y}{a} = \eta$$

$$\frac{g}{V V} = \frac{2 m}{a}.$$

Ces valeurs étant substituées, nous aurons

$$\eta = \xi \sin \omega - \frac{m \xi^2}{2} - \frac{m \cdot \xi^3}{2 \cdot 3} - \frac{m \xi^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{m \xi^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \&c.$$

$$+ \frac{m^2 \cdot \xi^4 \sin \omega}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{2 \cdot \sin \omega \cdot m^2 \xi^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$$

$$- \frac{\cos \omega^2 \cdot m^3 \xi^5}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$$

D'où



D'où l'on voit qu'on n'aura qu'à faire  $\omega = 0$ , pour que cette suite se change en celle du §. 111, & que ce n'est que cet angle qui la rend plus compliquée. En effet on voit ici, que cet *appendix* dont nous avons parlé au §. 114. commence à la quatrième dimension de  $\xi$ , mais qu'il en dispaît, dès qu'on fait  $\omega = 0$ .

§. 125. Cherchons maintenant la corde horizontale AB. L'ordonnée au point B étant  $= 0$ , nous aurons

$$0 = \sin \omega - \frac{m\xi}{2} - \frac{m\xi^2}{2 \cdot 3} - \frac{m\xi^3}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \frac{m\xi^4}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} - \&c.$$

$$+ \frac{m^2 \sin \omega \xi^3}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{2 \sin \omega \cdot m^2 \xi^4}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$$

$$- \frac{\cos \omega^2 \cdot m^3 \xi^4}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$$

De là en faisant

$$\frac{2 \sin \omega}{m} = \zeta,$$

il fera

$$\zeta = \xi + \frac{\xi^2}{3} + \frac{\xi^3}{3 \cdot 4} + \frac{\xi^4}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \&c.$$

$$- \frac{m \cdot \sin \omega \cdot \xi^3}{3 \cdot 4} - \frac{2 \sin \omega \cdot m \xi^4}{3 \cdot 4 \cdot 5}$$

$$+ \frac{\cos \omega^2 \cdot m^2 \xi^4}{3 \cdot 4 \cdot 5}.$$

Soit donc la suite

$$\xi = \zeta + a\zeta^2 + b\zeta^3 + c\zeta^4 + \&c.;$$



& en substituant cette valeur dans la suite précédente, il fera

$$\begin{aligned} \zeta = & \zeta + a\zeta^2 + b\zeta^3 + c\zeta^4 + \&c. \\ & + \frac{1}{3}\zeta^2 + \frac{2}{3}a\zeta^3 + \frac{2}{3}b\zeta^4 \\ & + \frac{1}{12}\zeta^3 + \frac{1}{4}a\zeta^4 \\ & - \frac{m \sin \omega \cdot \zeta^3}{12} - \frac{m a \sin \omega \zeta^4}{4} \\ & + \frac{1}{80} \cdot \zeta^4 \\ & - \frac{1}{30} \cdot m \sin \omega \cdot \zeta^4 \\ & + \frac{1}{80} \cdot m^2 \cos^2 \omega \cdot \zeta^4 \end{aligned}$$

Or les termes étant égaux à zéro, il fera

$$\begin{aligned} 0 = a + \frac{1}{3}, \text{ ce qui donne } a = -\frac{1}{3}, \\ b = \frac{2}{9} - \frac{1}{12} + \frac{m \sin \omega}{12} = \frac{5}{36} + \frac{1}{12} m \sin \omega \\ c = \frac{1}{720} - \frac{1}{180} m \sin \omega - \frac{1}{80} m^2 \cdot \cos^2 \omega. \\ \&c. \end{aligned}$$

& partant

$$\begin{aligned} \xi = \zeta - \frac{1}{3}\zeta^2 + \frac{5}{36}\zeta^3 + \frac{1}{720} \cdot \zeta^4 - \&c. \\ + \frac{1}{12} m \sin \omega \cdot \zeta^3 - \frac{1}{180} m \sin \omega \cdot \zeta^4 \\ - \frac{1}{80} m^2 \cos^2 \omega \cdot \zeta^4 \end{aligned}$$

Cette suite est fort peu convergente. Car, puisqu'il est

$$\zeta = \frac{2 \sin \omega}{m} = \frac{4 V V \cdot \sin \omega}{a g} = \frac{4 V V \sin \omega}{C C},$$



il faut que la vitesse initiale  $V$  soit considérablement plus petite que  $C$ , ou que l'angle d'élévation ne soit que de quelques degrés. Elle sera donc principalement applicable aux coups de canon, qui se tirent presque horizontalement. Mais, si le canon est absolument horizontal, cette suite donne  $\xi = 0$ , puisqu'en effet alors la corde  $AB$  est  $= 0$ .

§. 126. Lorsqu'il ne s'agit que de construire la courbe, ou d'en calculer autant de points qu'il en faut pour une construction fort exacte, la suite trouvée au §. 124. pourra être employée de manière qu'elle sera très convergente en tous les cas. On prendra d'abord une abscisse initiale  $AQ = \xi$ , qui soit assez petite pour qu'on n'ait besoin que des premiers termes de la suite du §. 124. Or, l'angle  $QAP = \omega$  étant donné, on trouvera l'ordonnée  $PM = \eta$ . Ensuite on prendra une seconde abscisse sur la tangente  $qM$ , & il est clair qu'on trouvera également l'ordonnée  $mp$ , en employant l'angle  $qMp$ , & la vitesse de la boule en  $M$ . Cet angle se trouve en ce qu'il est

$$d\eta : d(\xi \cdot \cos \omega) = \text{tang. } qMp.$$

En prenant donc les différences, il sera

$$\begin{aligned} \text{tang. } qMp = \frac{d\eta}{d\xi \cdot \cos \omega} = \text{tang. } \omega - \frac{m\xi}{\cos \omega} - \frac{m\xi^2}{2 \cos \omega} - \frac{m\xi^3}{2 \cdot 3 \cdot \cos \omega} - \frac{m\xi^4}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \cos \omega} - \&c. \\ + \frac{m^2 \xi^3 \text{ tang. } \omega}{2 \cdot 3} + \frac{2m^2 \xi^4 \text{ tang. } \omega}{2 \cdot 3 \cdot 4} \\ - \frac{m^3 \cdot \cos \omega \cdot \xi^4}{2 \cdot 3 \cdot 4}. \end{aligned}$$

On appliquera pareillement en  $m$  une nouvelle tangente, & ayant trouvé l'angle qu'elle fait avec l'horizon, on déterminera un troi-



sième point de cette courbe. On voit aisément qu'il convient de prendre toutes les abscisses égales, puisque de cette manière on n'aura d'autres substitutions à faire que celles des angles, & des valeurs de  $m$ .

§. 127. Comme dans cette façon de procéder on a le choix de prendre les abscisses aussi petites que l'on voudra, il sera bon de les prendre assez petites pour que dans les deux suites qu'il faut employer (§. 124. 126.) les termes multipliés par  $m^2$ ,  $m^3$ , &c. puissent être omis, de sorte qu'on puisse faire

$$\eta = \xi \sin \omega - \frac{m\xi^2}{2} - \frac{m\xi^3}{2 \cdot 3} - \frac{m\xi^4}{2 \cdot 3 \cdot 4} - \&c.$$

$$\text{tang } qMp = \text{tang } \omega - \frac{m}{\text{col } \omega} \left( \xi + \frac{\xi^2}{2} + \frac{\xi^3}{2 \cdot 3} + \&c. \right)$$

Car de cette manière, en faisant  $\log e = 1$ , nous aurons

$$\eta = \xi \sin \omega + m + m\xi - m e^{\xi}.$$

$$\text{tang } qMp = \text{tang } \omega + \frac{m}{\text{col } \omega} - \frac{m}{\text{col } \omega} \cdot e^{\xi} = \text{tang } \omega + \text{sec } \omega \cdot m(1 - e^{\xi}).$$

§. 128. La valeur de  $m$  étant (§. 124.)

$$m = \frac{ag}{2VV} = \frac{CC}{2VV}.$$

on voit qu'elle dépend des vitesses, & que par conséquent elle varie d'un point de la courbe à l'autre. Mais elle se trouve aisément par les angles, moyennant la dernière équation du §. 96. Car, faisant l'arc parabolique

$$p = \frac{\text{col } \phi}{\sin \phi^2} - \log. \text{tang } \frac{1}{2} \phi = \text{tang } \omega \cdot \text{sec } \omega + \log. \text{tang } (45^\circ + \frac{1}{2} \omega),$$

on



on aura pour la branche AG, par laquelle le corps monte

$$\frac{K}{G} = \frac{C:G}{V(C^2:G^2-p)},$$

d'où l'on tire

$$\frac{C^2}{K^2} = \frac{C^2}{G^2} - p.$$

Mais il est

$$K = V. \cos \omega.$$

Donc, en substituant

$$\frac{C^2}{V^2} \cdot \sec \omega^2 = \frac{C^2}{G^2} - p,$$

& partant

$$m = \frac{\cos \omega^2}{2} \left( \frac{C^2}{G^2} - p \right),$$

de sorte que la vitesse G étant donnée, ou trouvée par la vitesse initiale, on trouvera la lettre m moyennant les angles.

§. 129. Sous la même condition on trouvera facilement le tems que le corps a employé pour parcourir chacun de ces petits arcs. Car il est en général

$$-dy = g d\tau^2.$$

Or nous avons (§. 127. 124.)

$$\eta = \frac{2y}{a} = m + (\sin \omega + m) \xi - me^{\xi};$$

donc

$$\frac{2dy}{a} = (\sin \omega + m) d\xi - me^{\xi} d\xi$$

$$\frac{2ddy}{a} = -me^{\xi} d\xi^2 = -\frac{2gd\tau^2}{a},$$





& en prenant les racines quarrées,

$$d\tau = \sqrt{\frac{ma}{2g}} \cdot e^{\xi:2} d\xi$$

dont l'intégrale est

$$\tau = \sqrt{\frac{2ma}{g}} \cdot (e^{\xi:2} - 1) = \frac{a}{V} (e^{\xi:2} - 1).$$

§. 130. Mais, si sans omettre les termes multipliés par  $m$  (§. 127.) on veut employer l'expression générale du tems  $\tau$ , on trouvera de la même maniere, qu'il est

$$\begin{aligned} \tau = \frac{a}{2V} & \left( \xi + \frac{\xi^2}{4} + \frac{\xi^3}{24} + \frac{\xi^4}{192} + \&c. \right) \\ & + \frac{m \sin \omega \cdot \xi^3}{12} - \frac{m \sin \omega \cdot \xi^4}{96} \\ & + \frac{m^2 \cos \omega^2 \xi^4}{48}. \end{aligned}$$



M É M O I R E S  
D E  
L'ACADÉMIE ROYALE  
D E S  
S C I E N C E S  
E T  
B E L L E S - L E T T R E S.

---

*C L A S S E D E M A T H É M A -  
T I Q U E.*

\* \*  
\*





S U R  
LA PROBABILITÉ  
DES SÉQUENCES DANS LA LOTTERIE GÉNOISE  
P A R M. E U L E R.

---

**D**epuis l'établissement d'une telle Lotterie dans cette ville, tous les arrangemens en sont si généralement connus, qu'il seroit tout à fait superflu d'en donner une description. Aussi la plupart des questions qu'on peut former sur la probabilité des événemens qui ont lieu dans cette Lotterie, ne sont plus inconnues, vu que leur solution se déduit aisément des principes établis dans la science des probabilités. Mais, quand on demande la probabilité des *séquences*, qui peuvent se trouver dans les cinq nombres qu'on tire chaque fois, la question est si difficile qu'on rencontre les plus grands obstacles pour parvenir à la solution. Or on nomme *séquence*, quand deux ou plusieurs des cinq nombres qu'on tire chaque fois, se suivent immédiatement selon l'ordre naturel des nombres: d'où l'on comprend ce qu'il faut entendre sous une séquence de deux ou trois, ou quatre, ou de tous les cinq nombres. Ainsi, quand parmi les cinq nombres tirés il y a, par exemple, ces deux 7 & 8, c'est une séquence de 2: s'il y avoit ces trois nombres 25, 26, 27, ce seroit une séquence de trois: & ainsi de plusieurs. On pourroit penser que, puisqu'il n'y a dans cette Lotterie que 90 nombres, il conviendrait de regarder ces deux 90 & 1 comme une séquence de deux, mais il est plus naturel de les en exclure, & de s'en tenir uniquement à l'ordre naturel des nombres.

Or



Or il est bon de rendre cette question plus générale, & partant je supposerai, qu'au lieu de 90 billets il y a en tout  $n$  billets marqués des nombres 1, 2, 3, 4, . . . .  $n$ , & qu'on en tire au hasard un nombre quelconque qui soit  $= m$ . Cela posé, on demande qu'elle est la probabilité qu'il se trouve parmi ces  $m$  nombres tirés, ou une séquence de deux, ou une de trois, ou une de quatre, &c. ou même à la fois deux séquences de deux, ou une de deux ou une de trois, &c. ou enfin qu'il ne s'y trouve point du tout de séquences? Voilà donc plusieurs questions que chaque cas fournit, dont le nombre sera d'autant plus grand, que le nombre des billets tirés  $m$  sera grand. Mais, pour parvenir à la solution de toutes ces questions, il est absolument nécessaire de commencer par le cas  $m = 2$ , où l'on ne tire des  $n$  billets que deux: de là je passerai à celui où l'on en tire 3, de sorte que  $m = 3$ , ensuite à ceux où  $m = 4$ , &  $m = 5$ , &  $m = 6$ , &c. jusques où les difficultés du calcul me permettront de pousser ces recherches.

## P R O B L E M E    I.

I. *Le nombre des billets marqués des nombres 1, 2, 3, 4, &c. étant  $= n$ , quand on en tire deux billets, quelle est la probabilité, qu'il y aura une séquence, ou non?*

## S O L U T I O N.

On sait que le nombre de tous les cas possibles, qui peuvent avoir lieu dans les deux nombres tirés, est  $= \frac{n(n-1)}{1.2}$ , où l'on ne regarde point à l'ordre de ces deux nombres, de sorte que, par exemple, les nombres tirés 7 & 10 font le même cas que s'ils étoient tirés 10 & 7. Dans ce nombre des cas  $\frac{n(n-1)}{1.2}$  sont compris tant ceux où il y a une séquence, que ceux où il n'y en a point. Or il est aisé de faire le dénombrement de tous les cas qui ren-



renferment une séquence, qui sont: 1, 2; 2, 3; 3, 4; 4, 5; &c. jusqu'au dernier ( $n - 1$ ),  $n$ ; dont le nombre est évidemment  $= n - 1$ . Mais la probabilité d'un événement quelconque est exprimée par une fraction, dont le numérateur est le nombre des cas où cet événement arrive, & le dénominateur est le nombre de tous les cas possibles, d'où l'on tire la probabilité, que les deux nombres tirés renferment une séquence  $= \frac{2(n - 1)}{n(n - 1)} = \frac{2}{n}$ . Donc, qu'il n'y ait point de séquence, la probabilité sera  $= \frac{n - 2}{n}$ .

#### C O R O L L A I R E I.

2. Donc la multitude des nombres qui se suivent dans leur ordre naturel, étant  $= n$ , si l'on en tire deux, de sorte que le nombre de tous les cas possibles est  $\frac{n(n - 1)}{1. 2}$ , le nombre des cas qui contiennent une séquence est  $= n - 1$ , & le nombre des cas, qui n'en ont point  $= \frac{(n - 1)(n - 2)}{1. 2}$ .

#### C O R O L L A I R E II.

3. Et partant la probabilité que les deux nombres tirés renferment une séquence, est  $= \frac{2(n - 1)}{n(n - 1)} = \frac{2}{n}$ ; & la probabilité que les deux nombres tirés ne donnent point de séquence, est  $= \frac{(n - 1)(n - 2)}{n(n - 1)} = \frac{n - 2}{n}$ .

#### C O R O L L A I R E III.

4. Donc, si le nombre des billets  $n$  étoit 90, & qu'on n'en tirât que deux, la probabilité d'une séquence seroit  $= \frac{2}{45}$ ; & celle qu'il



qu'il n'y eût point de séquence  $\equiv \frac{44}{3}$ . Ou bien on pourroit parier 1 contre 44, qu'il n'y aura point de séquence.

#### R E M A R Q U E.

5. Il est évident que le nombre des cas qui donnent une séquence, étant ajouté au nombre des cas qui n'en donnent point, doit produire le nombre de tous les cas possibles, qui est  $\equiv \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2}$ :

& de là j'ai conclu que, puisque le nombre des cas d'une séquence étoit  $\equiv n-1$ , le nombre des cas contraires devoit être  $\equiv \frac{(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2}$ . Mais on peut aussi trouver le même nombre

par le dénombrement actuel: qu'on suppose l'un des nombres tirés  $a$ , & puisque l'autre ne sauroit être, ni  $a-1$ , ni  $a+1$ , il doit être un des autres dont le nombre est  $\equiv n-3$ , de sorte que chaque nombre donne  $n-3$  cas, d'où le nombre de tous les cas seroit  $\equiv n(n-3)$ ; mais il faut considérer que, si l'on prend pour  $a$ , ou le premier 1, ou le dernier  $n$ , le nombre des cas devient d'une unité plus grand, puisque dans le premier cas le nombre  $a-1$ , & dans l'autre le nombre  $a+1$  ne donne point d'exclusion. Par conséquent le nombre trouvé  $n(n-3)$  doit être augmenté de deux, d'où il devient  $\equiv nn-3n+2 \equiv (n-1)(n-2)$ . Mais ici chaque cas est compté deux fois, puisque posant les deux nombres tirés  $a$  &  $b$ , ce même cas est rapporté tant au nombre  $a$  qu'au nombre  $b$ : d'où je conclus que le nombre des cas exempts de séquence n'est que la moitié de  $(n-1)(n-2)$ , & partant  $\equiv \frac{(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2}$ . J'ai

ajouté exprès cette opération pour mieux faire connoître les précautions qu'il faut prendre dans la suite.





## PROBLEME II.

6. *Le nombre des billets marqués des nombres naturels 1, 2, 3, 4, &c. étant quelconque  $= n$ , si l'on en tire trois au hazard, trouver toutes les probabilités à l'égard des séquences.*

## SOLUTION.

Il y a ici trois cas à développer par rapport aux séquences, que je représenterai de la manière suivante :

I.  $a, a + 1, a + 2$ , ce qui est une séquence de trois.

II.  $a, a + 1, b$ , ce qui marque une séquence de deux, le troisième nombre  $b$  n'étant ni  $a + 2$  ni  $a - 1$ .

III.  $a, b, c$  où les nombres  $a, b, c$ , ne renferment aucune séquence.

Ces trois cas ensemble doivent produire tous les cas possibles, dont le nombre est  $= \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$ . Faisons donc le dénombrement de tous les cas de chacune de ces trois espèces.

Pour la première  $a, a + 1, a + 2$ , le dénombrement est le plus aisé, puisque tous ces cas sont

$(1, 2, 3), (2, 3, 4), (3, 4, 5)$  &c. jusqu'au dernier  $(n-2, n-1, n)$  dont le nombre est  $= n-2$ ; & partant la probabilité qu'une séquence de trois ait lieu  $= \frac{2 \cdot 3}{n(n-1)}$ .

Pour la seconde espèce  $a, a + 1, b$  nous n'avons qu'à considérer toutes les séquences de deux, qui sont au nombre de  $n-1$ ; & à remarquer que chacune reçoit encore un des autres nombres à l'exception des quatre  $a-1, a, a+1, a+2$ , de sorte que le nombre des valeurs de  $b$  seroit  $n-4$ . Mais il faut considérer que pour la première séquence  $1, 2$  & la dernière  $n-1, n$  le nombre

des valeurs de  $b$  est  $n - 3$ , & partant le nombre de tous les cas est  $(n-1)(n-4) + 2 = nn - 5n + 6 = (n-2)(n-3)$ ; lequel nombre est déjà juste, puisqu'aucun de ces cas ne se rencontre deux fois. Donc la probabilité que cette espece arrive est 
$$= \frac{2 \cdot 3 (n-3)}{n(n-1)}.$$

Pour la troisieme espece  $a, b, c$ , prenant le nombre  $a$  à volonté, les deux autres  $b$  &  $c$  doivent être pris de cette série interrompue de nombres:

$$1, 2, 3, \dots, a-2 \quad | \quad a+2, a+3, a+4, \dots, n$$

où le nombre des termes de la premiere partie est  $= a-2$ , & de l'autre  $= n-a-1$ ; mais en sorte que  $b$  &  $c$  ne fassent pas une séquence. Supposons que tous les deux soient pris de la premiere partie, dont le nombre de termes est  $= a-2$ ; & puisque la série des nombres  $1, 2, 3, 4, \dots, n$  fournit  $\frac{(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2}$  combinaisons de deux sans séquence, le nombre de ces cas est 
$$= \frac{(a-3)(a-4)}{1 \cdot 2}.$$
 De la même maniere, si tous les deux sont pris de l'autre partie  $a+2, a+3, \dots, n$ , dont le nombre de termes est  $= n-a-1$ , le nombre des cas est 
$$= \frac{(n-a-2)(n-a-3)}{1 \cdot 2}.$$

Or, si l'on prend l'un de la premiere, & l'autre de la seconde partie, chaque combinaison est exemte de séquence, & partant le nombre des cas fera  $= (a-2)(n-a-1)$ , d'où le nombre de tous les cas pour chaque nombre  $a$  fera:

$$\frac{(a-3)(a-4) + (n-a-2)(n-a-3) + 2(a-2)(n-a-1)}{1 \cdot 2}$$

qui se réduit à  $\frac{nn - 9n + 22}{2}$ . Mais ce dénombrement n'a pas

lieu



lieu lorsque le nombre  $a$  est ou 1, ou 2, ou  $n$  ou  $n-1$ , qu'il faut considérer séparément. Ayant donc lieu pour  $n-4$  valeurs de  $a$ , le nombre des cas sera  $= \frac{(n-4)(nn-9n+22)}{2}$ . Or

les deux cas  $a=1$  &  $a=n$  donnent chacun tant de cas  $\frac{(n-3)(n-4)}{2}$ , & les deux cas  $a=2$  &  $a=n-1$  donnent

chacun  $\frac{(n-4)(n-5)}{2}$ : donc le nombre des cas qui répondent à ces quatre valeurs ensemble sera

$$\frac{2(n-3)(n-4)}{2} + \frac{2(n-4)(n-5)}{2} = \frac{2(n-4)(2n-8)}{2} = \frac{(n-4)(4n-16)}{2}$$

qui étant joint au nombre précédent produit

$$\frac{(n-4)(nn-5n+6)}{2} = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{1. 2.}$$

Enfin il faut observer que chaque triade de nombres  $a, b, c$ , est comptée ici trois fois, puisque chacun peut tenir lieu de  $a$ , & partant le juste nombre de tous les cas de cette troisième espèce se réduit à  $\frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{1. 2. 3.}$ . D'où la probabilité que, parmi les trois nombres tirés il n'y ait aucune séquence,

$$\text{fera} = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{n(n-1)(n-2)} = \frac{(n-3)(n-4)}{n(n-1)}.$$

#### C O R O L L. I.

7. Ayant donc trois espèces à considérer, quand on tire trois de  $n$  billets, qui sont I.  $a, a+1, a+2$  II.  $a, a+1, b$   
Bb 3 &



& III.  $a, b, c$ , le nombre des cas pour chacune de ces especes est :

Pour la premiere,  $a, a + 1, a + 2 \dots n - 2$

Pour la seconde,  $a, a + 1, b \dots \frac{2(n-2)(n-3)}{1.2}$

Pour la troisieme,  $a, b, c \dots \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{1.2.3}$

#### C O R O L L. II.

8. Donc, pour qu'il se trouve dans les trois nombres tirés une séquence de trois  $a, a + 1, a + 2$ , la probabilité est  $= \frac{2.3}{n(n-1)}$ .

Pour qu'il ne s'y trouve qu'une séquence de deux, la probabilité est  $= 2. \frac{3(n-3)}{n(n-1)}$ , & pour qu'il n'y ait aucune séquence, la probabilité est  $= \frac{(n-3)(n-4)}{n(n-1)}$ .

#### C O R O L L. III.

9. Si l'on demande les cas où il se trouve au moins une séquence de deux dans les trois nombres tirés, le nombre des cas favorables est  $= n-2 + (n-2)(n-3) = (n-2)^2$ , & partant la probabilité  $= \frac{2.3(n-2)}{n(n-1)}$ .

#### R E M A R Q U E.

10. Il est ici évident que les nombres des cas, qui conviennent à chacune de nos trois especes, étant ajoutés ensemble, produisent



duisent le nombre de tous les cas possibles, qui est  $\frac{n(n-1)(n-2)}{1. 2. 3}$ ,  
 tout comme la nature de la question le demande, puisqu'il est en effet:  

$$n-2 + \frac{2(n-2)(n-3)}{1. 2} = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{1. 2. 3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{1. 2. 3}$$

& de la même manière, la somme des probabilités qui répondent à ces trois espèces devient égale à l'unité, qui est le caractère d'une certitude complète. Par cette raison j'aurois bien pu me passer du raisonnement embarrassant, par lequel j'ai fait le dénombrement des cas de la troisième espèce. Mais je l'ai ajouté exprès pour en mieux faire voir la justesse, vu qu'il porte ouvertement l'empreinte de la vérité, afin qu'il ne paroisse point suspect, quand je serai obligé d'y recourir dans la suite. Cependant, puisque je suis enfin parvenu à une expression fort simple, on ne sauroit presque douter qu'il n'y eût aussi une autre route assez simple, qui conduise à la même conclusion, ce qui mérite principalement l'attention de ceux qui s'appliquent à cette espèce de recherches.

### P R O B L E M E III.

11. *Le nombre des billets marqués des nombres naturels 1, 2, 3, 4 &c. étant = n, si l'on en tire 4 au hazard, trouver toutes les probabilités qui y peuvent avoir lieu à l'égard des séquences.*

### S O L U T I O N.

Parmi les quatre nombres tirés, il faut distinguer 5 espèces différentes par rapport aux séquences, dont la nature peut être représentée de la manière suivante,

- I.  $a, a+1, a+2, a+3$ ; II.  $a, a+1, a+2, b$ ; III.  $a, a+1, b, b+1$ ;  
 IV.  $a, a+1, b, c$ ; V.  $a, b, c, d$ .

de sorte que la première contient une séquence de 4, la seconde une de 3, la III. deux séquences de 2, la IV. une seule séquence de 2.

&



& la V ne contient aucune séquence. Il s'agit donc de faire le dénombrement des cas pour chacune de ces espèces, dont la somme doit être égale au nombre de tous les cas possibles qui est 
$$= \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1.2.3.4}.$$

I. Le nombre des cas où la première espèce a lieu, est  $= n-3$ , puisque ces cas sont

$$(1, 2, 3, 4), (2, 3, 4, 5) \dots (n-3)(n-2)(n-1)n$$

& partant la probabilité que cette espèce arrive sera  $= \frac{2.3.4}{n(n-1)(n-2)}.$

II. Pour l'espèce  $a, a+1, a+2, b$ , le nombre de toutes les séquences possibles de trois étant  $= n-2$ , le nombre  $b$  doit être pris, ou de cette progression  $1, 2, 3 \dots (a-2)$ , ou de celle-ci  $(a+4), (a+5) \dots n$ : donc le nombre des valeurs convenables pour  $b$  est  $= a-2 + n-a-3 = n-5$ , pourvu que  $a$  ne soit ni 1, ni  $a+2 = n$ . Mettons à côté ces deux cas, & le nombre des autres étant  $= n-4$  dont chacun peut exister en  $n-5$  diverses manières différentes, le nombre des cas est  $= (n-4)(n-5) + 2(n-4) = (n-3)(n-4)$  dont tous sont différents, & partant la probabilité que cette espèce existe est  $= 2. \frac{3.4(n-3)(n-4)}{n(n-1)(n-2)(n-3)} = 2. \frac{3.4(n-4)}{n(n-1)(n-2)}.$

III. Pour la troisième espèce  $a, a+1, b, b+1$ , la première séquence  $a, a+1$  étant prise à volonté, ce qui se peut faire en  $n-1$  manières différentes, la seconde séquence  $b, b+1$  doit être prise ou de cette progression  $1, 2, 3 \dots (a-2)$ , ce qui peut arriver en  $a-3$  manières, ou de celle-ci  $(a+3), (a+4), (a+5) \dots n$ ,  
ce



ce qui peut arriver en  $n - a - 3$  manieres, pourvu que le nombre  $a$  ne soit 1 ou 2, &  $a + 1$  ni  $n$  ni  $n - 1$ ; mettons à côté ces 4 cas, & le nombre des autres étant  $\equiv n - 5$ , dont chacun peut arriver en  $n - 6$  manieres, le nombre des cas sera  $\equiv (n - 5)(n - 6)$ . Mais la premiere séquence 1, 2, peut être combinée avec  $n - 4$ , autres semblables séquences, de même que la dernière  $(n - 1)$ ,  $n$  & la seconde 2, 3 avec  $n - 5$ , de même que l'avant dernière  $(n - 2)$ ,  $(n - 1)$ ; donc, au nombre des cas déjà trouvé, il faut encore ajouter  $2(n - 4) + 2(n - 5) \equiv 4n - 18$ , de sorte que le nombre entier de ces cas est

$$nn - 11n + 30 + 4n - 18 \equiv nn - 7n + 12 \equiv (n - 3)(n - 4).$$

Mais ici chaque cas se rencontre deux fois, selon qu'on considere en premier lieu ou l'une ou l'autre séquence. Par conséquent le juste nombre des cas qui produisent cette troisieme espece est

$$\begin{aligned} &= \frac{(n - 4)(n - 4)}{1 \cdot 2} \quad \& \text{ la probabilité que ce cas existe} \\ &= \frac{3 \cdot 4 (n - 3)(n - 4)}{n(n - 1)(n - 2)(n - 3)} = \frac{3 \cdot 4 (n - 4)}{n(n - 1)(n - 2)}. \end{aligned}$$

IV. Pour la quatrieme espece  $a, a + 1, b, c$ , la séquence  $a, a + 1$  étant prise à volonté, ce qui se peut faire en  $n - 1$  manieres différentes, les deux autres nombres  $b$  &  $c$  doivent être pris de ces deux progressions:

$$1, 2, 3 \dots a - 2 \quad | \quad a + 3, a + 4, \dots n$$

en sorte qu'ils ne renferment point de séquence. Donc, prenant tous les deux de la premiere progression, dont le nombre de termes est  $a - 2$ , cela peut se faire en  $\frac{(a - 3)(a - 4)}{1 \cdot 2}$  manieres diffé-

rentes : de même, si l'on prend tous les deux de l'autre progression, dont le nombre de termes est  $n - a - 2$ , cela peut arriver en





autant de manieres  $\frac{(n-a-3)}{1} \frac{(n-a-4)}{2}$ . Or, prenant

$b$  de la premiere, &  $c$  de la seconde progression, le nombre des cas est  $\equiv (n-a-2) \frac{(n-a-2)}{2}$ , pourvu qu'on excepte les deux premieres & les deux dernieres sequences. Le nombre donc de celles où ce dénombrement a lieu étant  $\equiv n-5$ , dont chacun peut arriver autant de fois

$$\frac{(n-3)(n-4)}{1.2} + \frac{(n-a-3)(n-a-4)}{1.2} + (n-2)(n-a-2),$$

ce qui se réduit à  $\frac{nn-11n+32}{1.2}$  qu'il faut multiplier par

$n-5$ . Or la premiere sequence 1, 2 donne tant de cas,

$$\frac{(n-4)(n-5)}{1.2}, \text{ \& autant la derniere } (n-1)n; \text{ \& la se-}$$

conde 2, 3 donne  $\frac{(n-5)(n-6)}{1.2}$  cas, & autant l'avant-der-

niere, de sorte que le nombre de ces 4 cas est  $\equiv (n-4)(n-5) + (n-5)(n-6) \equiv (n-5)(2n-10) \equiv 2nn-20n+50$ , qui étant ajoutés aux précédens donnent

$$\frac{n-5}{2} (nn-11n+32+4n-20) \equiv \frac{(n-5)(n-4)(n-3)}{1.2},$$

pour le nombre de tous les cas, qui produisent cette espece, & par-

$$\text{tant la probabilité qu'elle existe est } \equiv \frac{3.4}{n} \frac{(n-4)}{(n-1)} \frac{(n-5)}{(n-2)}.$$

V. La cinquieme espece n'a pas besoin d'être développée séparément, puisque le nombre des cas de routes les cinq especes doit être  $\equiv \frac{n}{1.2.3.4} \frac{(n-1)}{3} \frac{(n-2)}{4} \frac{(n-3)}{5}$ : ajoutons donc ensemble

ble

ble les cas trouvés pour les quatre espèces, dont la somme est

$$n-3 + (n-3)(n-4) + \frac{(n-3)(n-4)}{1.2} + \frac{(n-3)(n-4)(n-5)}{1.2.3} \\ = \frac{(n-3)(nn-6n+10)}{1.2},$$

qui étant retranchée de  $\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1.2.3.4}$ , laisse

$$\frac{n-3}{24}(n(n-1)(n-2)-12(nn-6n+10)) = \frac{(n-3)(n-4)(n-5)(n-6)}{1.2.3.4}$$

pour le nombre de tous les cas où il n'y a point de fréquence parmi les 4 nombres tirés, d'où la probabilité que cette espèce existe

$$\text{est} = \frac{(n-4)(n-5)(n-6)}{n(n-1)(n-2)}.$$

### C O R O L L A I R E I.

12. Voilà donc les nombres des cas qui produisent chacune des cinq espèces rapportées.

nombre des cas

I. Espèce  $a, a+1, a+2, a+3 \dots \frac{n-3}{1},$

II. Espèce  $a, a+1, a+2, b \dots \frac{2(n-3)(n-4)}{1.2},$

III. Espèce  $a, a+1, b, b+1 \dots \frac{(n-3)(n-4)}{1.2},$

IV. Espèce  $a, a+1, b, c \dots \frac{3(n-3)(n-4)(n-5)}{1.2.3},$

V. Espèce  $a, b, c, d \dots \frac{(n-3)(n-4)(n-5)(n-6)}{1.2.3.4}.$

C c 2

J'ai



J'ai exprimé ces nombres en sorte qu'on en puisse peut-être former bientôt une induction pour des questions compliquées.

### COROLLAIRE II.

13. De la même manière j'exprimerai la probabilité que chacune de ces cinq espèces existe.

la probabilité

$$\text{I. Espèce } a, a+1, a+2, a+3 \dots \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{n(n-1)(n-2)},$$

$$\text{II. Espèce } a, a+1, a+2, b \dots 2 \cdot \frac{3 \cdot 4 \cdot (n-4)}{n(n-1)(n-2)},$$

$$\text{III. Espèce } a, a+1, b, b+1 \dots \frac{3 \cdot 4 \cdot (n-4)}{n(n-1)(n-2)},$$

$$\text{IV. Espèce } a, a+1, b, c \dots 3 \cdot \frac{4(n-4)(n-5)}{n(n-1)(n-2)},$$

$$\text{V. Espèce } a, b, c, d \dots \frac{(n-4)(n-5)(n-6)}{n(n-1)(n-2)}.$$

### PROBLEME IV.

14. Le nombre des billets marqués des nombres naturels 1, 2, 3, &c. étant quelconque  $= n$ , si l'on en tire 5 au hazard, trouver toutes les probabilités qui y peuvent avoir lieu à l'égard des séquences.

### SOLUTION.

Parmi les 5 nombres tirés il faut distinguer les espèces suivantes auxquelles tous les cas possibles, dont le nombre est  $=$

$$\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \text{ se réduisent.}$$



- I. Espece  $a, a+1, a+2, a+3, a+4$ , où il y a une séquence de 5.
- II. Espece  $a, a+1, a+2, a+3, b$ , où il n'y a qu'une séquence de 4.
- III. Espece  $a, a+1, a+2, b, b+1$ , où il n'y a qu'une séquence de trois, & une de deux.
- IV. Espece  $a, a+1, a+2, b, c$ , où il n'y en a qu'une de trois.
- V. Espece  $a, a+1, b, b+1, c$ , où il n'y en a que deux de deux.
- VI. Espece  $a, a+1, b, c, d$ , où il n'y en a qu'une seule de 2.
- VII. Espece  $a, b, c, d, e$ , où il n'y a aucune séquence.

Parcourons séparément chacune de ces 7 especes.

I. La premiere ne contient que ces cas :

$(1,2,3,4,5), (2,3,4,5,6)$  &c. jusques à  $(n-4, n-3, n-2, n-1, n)$ , dont le nombre est  $= n - 4$ , & partant la probabilité  $= \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$ .

II. Dans la seconde espece la séquence  $a, a+1, a+2, a+3$ , peut varier en  $n - 3$  manieres différentes, & le nombre  $b$  devant être pris de l'une de ces deux progressions

$1, 2, 3 \dots a-2$ , ou  $(a+5), (a+6) \dots n$ ,

le nombre de ses valeurs est  $= a-2 + (n-a-4) = n-6$ , à l'exception de la premiere & derniere séquence. Mettant donc ces deux à part, le nombre des autres étant  $n-5$ , celui des cas sera  $= (n-5)(n-6)$ . Or, pour la premiere séquence  $1, 2, 3, 4$ , le nombre des valeurs de  $b$  est  $= n-5$ , & aussi pour la derniere. Ajoutons donc encore ces  $2(n-5)$  cas au



nombre trouvé  $(n - 5)(n - 6)$ , & nous aurons le nombre de tous les cas qui conviennent à cette espèce  $= (n - 5)(n - 4) = 2 \frac{(n - 4)(n - 5)}{1. 2}$ , d'où l'on tire la probabilité  $=$

$$2. \frac{3. 4. 5 (n - 5)}{n (n - 1) (n - 2) (n - 3)}.$$

III. Dans la troisième espèce,  $a, a + 1, a + 2, b, b + 1$ , la première séquence de trois  $a, a + 1, a + 2$  peut avoir lieu en  $n - 2$  manières différentes, & l'autre séquence de deux  $b, b + 1$  doit être prise ou de cette progression  $1, 2, 3 \dots (n - 2)$ , d'où leur nombre sera  $= a - 3$ , ou de cette progression  $(a + 4)(a + 5) \dots n$ , d'où le nombre des cas devient  $= n - n - 4$ ; & partant le nombre des valeurs de  $b$  est  $= n - 7$ , excepté les deux premières & les deux dernières séquences de trois. Le nombre des autres étant donc  $= n - 2 - 4 = n - 6$ , & chacune recevant  $n - 7$  cas, le nombre des cas est  $= (n - 6)(n - 7)$ . Mais la première  $1, 2, 3$  admet  $n - 5$  cas, & la seconde  $n - 6$ : d'où les deux premières & les deux dernières fournissent encore  $2(n - 5) + 2(n - 6) = 4n - 22$  cas, qui étant ajoutés à  $(n - 6)(n - 7)$  produisent le nombre de tous les cas de cette espèce  $= nn - 9n + 20 = (n - 4)(n - 5) = 2 \frac{(n - 4)(n - 5)}{1. 2}$  comme dans l'espèce précédente, d'où la probabilité est aussi  $= 2. \frac{3. 4. 5 (n - 5)}{n (n - 1) (n - 2) (n - 3)}.$

IV. Dans la quatrième espèce  $a, a + 1, a + 2, b, c$ , la séquence de trois a lieu en  $n - 2$  cas, & les deux nombres  $b$  &  $c$  doivent être pris de ces deux progressions

$$1, 2, 3 \dots (n - 2) \quad | \quad (a + 4), (a + 5) \dots n,$$

en



en forte pourtant qu'ils ne fassent point de séquence. Prenons d'abord tous les deux de la première progression, & le nombre des cas est  $\frac{(a-3)(a-4)}{1 \cdot 2}$ : mais, si nous les prenons de l'autre, le nombre des cas est  $\frac{(n-a-3)(n-a-4)}{1 \cdot 2}$ : enfin, prenant l'un de l'une & l'autre de l'autre, le nombre des cas est  $\frac{(a-2)(n-a-3)}{1 \cdot 2}$ . Ainsi, pour chaque séquence de trois, nous avons tant de cas  $\frac{(a-3)(a-4)}{1 \cdot 2} + \frac{(n-a-4)(n-a-5)}{1 \cdot 2} + \frac{(a-2)(n-a-3)}{1 \cdot 2} = \frac{nn-13n+44}{1 \cdot 2}$  excepté, les deux premières & les deux dernières séquences: donc le nombre de celles où ce denombrement est juste étant  $n-2-4 = n-6$ , le nombre des cas qui leur convient est  $\frac{(n-6)(nn-13n+44)}{2}$ . Or la première & la dernière séquence donnent chacune  $\frac{(n-5)(n-6)}{2}$  cas, & la seconde & l'avant-dernière chacune  $\frac{(n-6)(n-7)}{2}$ ; donc, au nombre des cas trouvés, il faut encore ajouter  $(n-6)(2n-12)$ , d'où résulte la somme  $\frac{(n-6)(nn-9n+20)}{2} = \frac{(n-4)(n-5)(n-6)}{1 \cdot 2}$ , qui exprime le nombre des cas pour cette espèce, & partant la probabilité est  $= 3 \cdot \frac{4 \cdot 5 \cdot (n-5)(n-6)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$ .

V. Pour la cinquième espèce  $a, a+1, b, b+1, c$ , considérons le nombre  $c$ , & les deux séquences de deux doivent être tirées de ces deux progressions

$$1, 2, 3 \dots c-2 \quad | \quad c+2, c+3 \dots n$$

Si



Si l'on prend toutes les deux de la première, le nombre des cas est  $= \frac{(c-5)(c-6)}{2}$ , & si on les prend de l'autre il est  $= \frac{(n-c-4)(n-c-5)}{2}$ . Mais, l'une étant prise de la première & l'autre de la dernière, le nombre des cas sera  $= (c-3)(n-c-2)$ : donc, pour chaque nombre  $c$ , le nombre des cas sera:

$$\frac{(c-5)(c-6)}{2} + \frac{(n-c-4)(n-c-5)}{2} + (c-3)(n-c-2) = \frac{nn-15n+62}{2}.$$

Mais il en faut exclure les 4 premiers & derniers nombres  $c$ , de sorte que ce dénombrement n'a lieu que pour  $n-8$  valeurs de  $c$ , auxquelles convient ce nombre de cas  $\frac{(n-8)(nn-15n+62)}{2}$ .

Soyent maintenant les autres valeurs qui admettent les cas suivans:

$$\begin{array}{l} \text{nombre des cas} \\ \text{si } c = 1, \text{ ou } c = n \dots\dots\dots \frac{(n-5)(n-6)}{2}, \end{array}$$

$$\text{si } c = 2, \text{ ou } c = n-1 \dots\dots\dots \frac{(n-6)(n-7)}{2},$$

$$\text{si } c = 3, \text{ ou } c = n-2 \dots\dots\dots \frac{(n-7)(n-8)}{2},$$

$$\text{si } c = 4, \text{ ou } c = n-3 \dots\dots\dots \frac{(n-8)(n-9)}{2} + n-6,$$

dont la somme est  $= 2nn - 27n + 94$ , & dont le double  $4nn - 54n + 188$  doit être ajouté au nombre précédent  $\frac{n^3 - 23nn + 182n - 496}{2}$ , pour avoir le nombre des





$$\text{cas} \frac{n^3 - 15n^2 + 74n - 120}{2} = \frac{(n-4)(n-5)(n-6)}{1. 2},$$

$$\& \text{ partant la probabilité} = 3. \frac{4. 5. (n-5)(n-6)}{n(n-1)(n-2)(n-3)},$$

qui est précisément la même que celle de l'espece précédente.

VI. Pour la sixieme espece  $a, a+1, b, c, d$ , je tracerai une autre route en considérant le plus petit des nombres  $a, b, c, d$ . Soit donc premierement  $a$  le plus petit, & les trois solitaires  $b, c, d$ , seront pris de cette progression  $a+3, a+4, \dots n$ , dont le nombre des termes est  $= n - a - 2$ , & partant le nombre des cas  $= \frac{(n-a-4)(n-a-5)(n-a-6)}{1. 2. 3}$ ,

d'où nous aurons pour chaque nombre  $a$  les cas suivans

| si $a$   | le nombre des cas sera            | or la somme de cette progression se trouve  |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1        | $\frac{(n-5)(n-6)(n-7)}{1. 2. 3}$ |                                             |
| 2        | $\frac{(n-6)(n-7)(n-8)}{1. 2. 3}$ | $= \frac{(n-4)(n-5)(n-6)(n-7)}{1. 2. 3. 4}$ |
| 3        | $\frac{(n-7)(n-8)(n-9)}{1. 2. 3}$ |                                             |
| $\vdots$ |                                   |                                             |
| $n-7$    | $\frac{3. 2. 1}{1. 2. 3}$         |                                             |

Ensuite, si un des nombres solitaires  $d$  est le plus petit, les quatre autres  $a, a+1, b, c$ , seront pris de la progression  $d+2, d+3, \dots n$ , dont le nombre de termes est  $= n - d - 1$ . Or alors le nombre des cas est  $= \frac{3(n-d-4)(n-d-5)(n-d-6)}{1. 2. 3}$ .



Par conséquent

| si $d$ est le nombre des cas sera |                                    |  |  | La somme de cette progression se trouve      |  |  |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|
| 1                                 | $\frac{3(n-5)(n-6)(n-7)}{1. 2. 3}$ |  |  |                                              |  |  |  |
| 2                                 | $\frac{3(n-6)(n-7)(n-8)}{1. 2. 3}$ |  |  | $= \frac{3(n-4)(n-5)(n-6)(n-7)}{1. 2. 3. 4}$ |  |  |  |
| ...                               |                                    |  |  |                                              |  |  |  |
| $n-7$                             | $\frac{3. 2. 1}{1. 2. 3}$          |  |  |                                              |  |  |  |

Par conséquent la somme de tous les cas qui produisent cette espèce est  $= 4 \cdot \frac{(n-4)(n-5)(n-6)(n-7)}{1. 2. 3. 4}$ , & partant

$$\text{la probabilité} = 4 \cdot \frac{5(n-5)(n-6)(n-7)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$$

VII. Enfin, pour la septième espèce, le nombre de tous les cas qui la produisent, est  $= \frac{(n-4)(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{1. 2. 3. 4. 5}$ , & partant la probabilité  $= \frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$ .

### C O R O L L A I R E I.

15. Mettons devant les yeux à la fois les nombres des cas & les probabilités que nous venons de trouver pour les sept espèces de tirages, quand on tire cinq nombres de  $n$ .

nombre



|                                                                                                | Nombre des cas                                                        | Probabilité                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| I. $a, a+1, a+2, a+3, a+4 \dots \dots \frac{n-4}{1}$                                           | $\frac{n-4}{1}$                                                       | $\frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$       |
| II. $a, a+1, a+2, a+3, b \dots \dots 2 \cdot \frac{(n-4)(n-5)}{1 \cdot 2}$                     | $2 \cdot \frac{(n-4)(n-5)}{1 \cdot 2}$                                | $2 \cdot \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 (n-5)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$ |
| III. $a, a+1, a+2, b, b+1 \dots \dots 2 \cdot \frac{(n-4)(n-5)}{1 \cdot 2}$                    | $2 \cdot \frac{(n-4)(n-5)}{1 \cdot 2}$                                | $2 \cdot \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 (n-5)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$ |
| IV. $a, a+1, a+2, b, c \dots 3 \cdot \frac{(n-4)(n-5)(n-6)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$                | $3 \cdot \frac{(n-4)(n-5)(n-6)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$                   | $3 \cdot \frac{4 \cdot 5 (n-5)(n-6)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$    |
| V. $a, a+1, b, b+1, c \dots 3 \cdot \frac{(n-4)(n-5)(n-6)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$                 | $3 \cdot \frac{(n-4)(n-5)(n-6)}{1 \cdot 2 \cdot 3}$                   | $3 \cdot \frac{4 \cdot 5 (n-5)(n-6)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$    |
| VI. $a, a+1, b, c, d \dots 4 \cdot \frac{(n-4)(n-5)(n-6)(n-7)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$     | $4 \cdot \frac{(n-4)(n-5)(n-6)(n-7)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$      | $4 \cdot \frac{5 (n-5)(n-6)(n-7)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$       |
| VII. $a, b, c, d, e \dots \frac{(n-4)(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$ | $\frac{(n-4)(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$ | $\frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$            |

## COROLLAIRE II.

15. Si l'on demande la probabilité qu'il y ait au moins une séquence de deux dans les 5 nombres tirés, toutes les espèces, hormis la dernière, satisfont : & puisque la somme de toutes les probabilités est  $= 1$ , la probabilité cherchée est

$$= 1 - \frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}$$

## COROLLAIRE III.

16. Si l'on demande la probabilité, qu'il y ait parmi les 5 nombres tirés au moins deux séquences de deux, puisqu'une séquence de 3 en contient deux de 2, toutes les espèces sans les



deux dernières satisfont, & partant la probabilité cherchée sera =

$$1 - \frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-12)}{n(n-1)(n-2)(n-3)},$$

#### COROLLAIRE IV.

17. Or la probabilité qu'il se trouvera parmi les 5 nombres tirés une séquence de trois, sera

$$\frac{3 \cdot 4 \cdot 5 (2 + 4(n-5) + (n-5)(n-6))}{n(n-1)(n-2)(n-3)} = \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 (n-4)}{n(n-1)(n-2)},$$

& qu'il y ait une séquence de 4 la probabilité sera

$$= \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 (n-4)}{n(n-1)(n-2)(n-3)}.$$

Enfin, qu'il y ait une séquence de tous les cinq, la probabilité est

$$= \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{n(n-1)(n-2)(n-3)}.$$

#### *Application à la Lotterie de Genes.*

18. Pour appliquer ces formules à la Lotterie de Genes, où l'on tire chaque fois 5 *numeros* de 90, nous aurons  $n = 90$ , & pour marquer plus distinctement les différens cas par rapport aux séquences, j'employerai les caractères suivans.

- (1) marque un nombre solitaire hors de toute séquence,
- (2) marque une séquence de deux,
- (3) marque une séquence de trois,
- (4) marque une séquence de quatre,
- (5) marque une séquence de tous les cinq.

Cela



Cela posé, nous aurons pour chacune des sept différentes espèces les probabilités suivantes.

| Espec                                      | Probabilité                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. . . (5) . . . . .                       | $\frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87} = \frac{1}{311638}$            |
| II. . . (4), (1) . . . . .                 | $\frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 85}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87} = \frac{1}{311638}$   |
| III. . . (3), (2) . . . . .                | $\frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 85}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87} = \frac{1}{311638}$   |
| IV. . . (3), (1), (1) . . . . .            | $\frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 85 \cdot 84}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87} = \frac{1}{311638}$  |
| V. . . (2), (2), (1) . . . . .             | $\frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 85 \cdot 84}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87} = \frac{1}{311638}$  |
| VI. . . (2), (1), (1), (1) . . . . .       | $\frac{4 \cdot 5 \cdot 85 \cdot 84 \cdot 83}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87} = \frac{1}{311638}$ |
| VII. . . (1), (1), (1), (1), (1) . . . . . | $\frac{85 \cdot 84 \cdot 83 \cdot 82}{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87} = \frac{1}{311638}$        |

De là je tire les conclusions suivantes :

1°. Que, parmi les 5 nombres tirés, il se trouve au moins une séquence de deux, la probabilité est  $= \frac{1}{311638}$  : donc, si l'on permettoit de mettre sur ce cas, le gain devoit être fixé à  $418000$  fois la mise : & si l'on n'accordoit que 4 fois la mise, la Lotterie y gagneroit 17 pour cent.

2°. Que, parmi les 5 nombres tirés, il se trouve au moins deux séquences de 2, ou une de trois, ou plusieurs, la probabilité est  $= \frac{1}{311638}$  : & partant, en permettant de mettre sur ce cas, le gain doit être fixé à 6910 fois la mise, donc, si l'on n'accordoit que 50 fois la mise, la Lotterie gagneroit 199 sur 699, ou 28½ pour cent.



3°. Que, parmi les 5 nombres tirés, il se trouve une séquence de trois, ou plusieurs, la probabilité est  $\frac{1}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$ , & partant en permettant de mettre sur ce cas, le gain devrait être fixé à 136  $\frac{4}{5}$  fois la mise; donc, si l'on n'accordoit que 90 fois la mise, on gagneroit 466 sur 1366, ou bien 34  $\frac{1}{2}$  pour cent.

4°. Que, parmi les 5 nombres tirés, il se trouve une séquence de 4, ou de tous les cinq, la probabilité est  $\frac{1}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}$ , & partant si l'on mettoit sur ce cas, le gain devrait être fixé à 5940 fois la mise: donc, si la Lotterie n'accordoit que 3000 fois la mise, elle gagneroit 2940 sur 5940, ou bien 49  $\frac{1}{2}$  pour cent.

#### R E M A R Q U E.

19. Quelque difficile qu'il ait paru d'abord d'étendre ces recherches à des plus grands nombres de billets tirés, la route particulière que j'ai employée dans la solution de ce problème pour l'espèce VI, rend ces recherches fort aisées, de sorte qu'on sera en état de les étendre à un aussi grand nombre de billets tirés qu'on voudra. Toute cette méthode revient à trouver la somme d'une telle progression descendante:

$$\frac{k(k-1)(k-2) \dots (k-m+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m} + \frac{(k-1)(k-2) \dots (k-m)}{1 \cdot 2 \dots m} \&c.$$

jusques à ce que les termes évanouissent. Or on sait que la somme de cette progression s'exprime fort simplement en sorte

$$\frac{(k+1)k(k-1)(k-2) \dots (k-m+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (m+1)}$$

Je me servirai donc de cette méthode pour résoudre le problème suivant.

#### P R O B L E M E V.

20. Le nombre des billets marqués des nombres naturels 1, 2, 3; &c. étant quelconque  $= n$ , si l'on en tire six au hazard, trou-



trouver toutes les probabilités, qui y peuvent avoir lieu à l'égard des séquences.

### S O L U T I O N .

Il est aisé d'établir toutes les espèces différentes qui peuvent se rencontrer parmi les six nombres tirés, que je développerai l'une après l'autre.

*I Espèce.*  $a, a+1, a+2, a+3, a+4, a+5.$

Le nombre des cas est ici ouvertement  $= \frac{n-5}{1}$  : donc, puisque le nombre de tous les cas possibles est

$$= \frac{n}{1} \cdot \frac{(n-1)}{2} \cdot \frac{(n-2)}{3} \cdot \frac{(n-3)}{4} \cdot \frac{(n-4)}{5} \cdot \frac{(n-5)}{6},$$

la probabilité que cette espèce ait lieu, est

$$= \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}.$$

*II Espèce.*  $a, a+1, a+2, a+3, a+4, b,$

Soit  $a$  le plus petit des nombres tirés, &  $b$  doit être pris de cette progression  $a+6, a+7, a+8, \dots, n$ , dont le nombre de termes est  $= n - a - 5$ , qui donne le nombre des valeurs de  $b$  pour chaque nombre  $a$ . Mais, si  $b$  est le plus petit des nombres tirés, la séquence de cinq  $a, a+1, a+2, a+3, a+4$ , doit être prise de cette progression  $b+2, b+3, \dots, n$  dont le nombre de termes est  $= n - b - 1$ , ce qui par le problème IV. peut arriver en  $\frac{n-b-5}{1}$  manières différentes. Ain-

si, pour trouver le nombre des cas, nous n'avons qu'à sommer les deux progressions suivantes :





| si $a$ est | valeurs de $b$            | si $b$ est | valeurs de $a$              |
|------------|---------------------------|------------|-----------------------------|
| 1          | $\frac{n-5}{1}$           | 1          | $\frac{n-6}{1}$             |
| 2          | $\frac{n-7}{1}$           | 2          | $\frac{n-7}{1}$             |
| 3          | $\frac{n-8}{1}$           | 3          | $\frac{n-8}{1}$             |
| &c.        |                           | &c.        |                             |
| somme      | $\frac{(n-5)(n-6)}{1. 2}$ | somme      | $= \frac{(n-5)(n-6)}{1. 2}$ |

Donc le nombre des cas est  $= 2 \frac{(n-5)(n-6)}{1. 2}$ , & la pro-

babilité  $= 2. \frac{3. 4. 5. 6}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)} \frac{(n-6)}{(n-4)}$ .

*III Espect.*  $a, a+1, a+2, a+3, b, b+1$ .

Si  $a$  est le plus petit des nombres tirés, la séquence de deux  $b, b+1$ , doit être prise de cette progression:  $a+5, a+6, a+7 \dots n$ , dont le nombre des termes  $= n - a - 4$ . Donc, par le pro-

bleme I. le nombre des valeurs de  $b$  est  $= \frac{n - a - 5}{1}$ . Si  $b$

est le plus petit des 6 nombres tirés, la séquence de quatre  $a, a+1, a+2, a+3$ , doit être prise de cette progression  $b+3, b+4 \dots n$ , dont le nombre de termes  $= n - b - 2$ . Donc, par le probleme III, le nombre des valeurs de  $a$  est  $=$

$$\frac{n - b - 5}{1}.$$

Voilà



Voilà donc les deux progressions que avons à sommer.

| si $a$ est                        | valeurs de $b$  | si $b$ est                        | valeur de $a$   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1                                 | $\frac{n-6}{1}$ | 1                                 | $\frac{n-6}{1}$ |
| 2                                 | $\frac{n-7}{1}$ | 2                                 | $\frac{n-7}{1}$ |
| 3                                 | $\frac{n-8}{1}$ | 3                                 | $\frac{n-8}{1}$ |
| &c.                               |                 | &c.                               |                 |
| somme = $\frac{(n-5)(n-6)}{1. 2}$ |                 | somme = $\frac{(n-5)(n-6)}{1. 2}$ |                 |

Donc le nombre des cas est = 2.  $\frac{(n-5)(n-6)}{1. 2}$ , & la probabilité = 2.  $\frac{3. 4. 5. 6 (n-6)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$ .

*IV Espece.*  $a, a+1, a+2, a+3, b, c,$

Soit  $a$  le plus petit des nombres tirés, & les deux solitaires  $b, c$ , doivent être pris de cette progression  $a+5, a+6 \dots n$ , dont le nombre de termes =  $n - a - 4$ . Donc, par le problème I. le nombre des cas est =  $\frac{(n-a-5)(n-a-6)}{1. 2}$ .

Soit l'un des nombres solitaires  $c$  le plus petit, & la séquence de 4 avec l'autre solitaire  $a, a+1, a+2, a+3, b$ , doit être prise de cette progression:  $c+2, c+3 \dots n$ , dont le nombre de termes =  $n - c - 1$ . Donc, par le problème IV. le

nombre des cas est = 2.  $\frac{(n-c-5)(n-c-6)}{1. 2}$ .



Nous aurons donc à sommer les deux progressions suivantes :

| si $a$ est                                | le nombre des cas         | si $c$ est                                  | le nombre des cas           |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 1                                         | $\frac{(n-6)(n-7)}{1. 2}$ | 1                                           | $2 \frac{(n-6)(n-7)}{1. 2}$ |
| 2                                         | $\frac{(n-7)(n-8)}{1. 2}$ | 2                                           | $2 \frac{(n-7)(n-8)}{1. 2}$ |
| 3                                         | $\frac{(n-8)(n-9)}{1. 2}$ | 3                                           | $2 \frac{(n-8)(n-9)}{1. 2}$ |
| &c.                                       |                           | &c.                                         |                             |
| somme $= \frac{(n-5)(n-6)(n-7)}{1. 2. 3}$ |                           | somme $= 2 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)}{1. 2. 3}$ |                             |

Donc le nombre des cas est  $= 3 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)}{1. 2. 3}$ ,

& la probabilité  $= 3 \frac{4. 5. 6 (n-6)(n-7)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$ .

*V Espec.*  $a, a+1, a+2, b, b+1, b+2$ .

Puisqu'il y a ici deux séquences semblables de trois, il est indifférent lequel des deux nombres  $a$  &  $b$  soit le plus petit, & la séquence de trois,  $a, a+1, a+2$ , doit être prise de cette progression  $b+4, b+5, \dots, n$  dont le nombre de termes est  $= n-b-3$ .

Donc, par le problème II, le nombre des cas est  $= \frac{n-b-5}{1}$ ,

& la progression à sommer  $\frac{n-6}{1}, \frac{n-7}{1}, \frac{n-8}{1}$  &c.

Donc le nombre des cas est  $= \frac{(n-5)(n-6)}{1. 2}$ , & la proba-

bilité  $= \frac{3. 4. 5. 6 (n-6)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$ .



*VI Espece.*  $a, a+1, a+2, b, b+1, c.$

Si  $a$  est le plus petit des nombres tirés, les autres  $b, b+1, c$ , doivent être pris de cette progression  $a+4, a+5 \dots n$ , dont le nombre de termes  $= n - a - 3$ , d'où le problème II.

le nombre des cas est  $= 2 \frac{(n - a - 5)}{1.} \frac{(n - a - 6)}{2.}$ ,

& posant  $a = 1$ , on a  $2 \frac{(n - 6)}{1.} \frac{(n - 7)}{2.}$

Si  $b$  est le plus petit des nombres tirés, les autres  $a, a+1, a+2, c$ , doivent être pris de cette progression  $b+3, b+4 \dots n$ , dont le nombre des termes est  $n - b - 2$ , d'où par le problème III. le nombre des cas est  $=$

$$2 \frac{(n - b - 5)}{1.} \frac{(n - b - 6)}{2.},$$

& posant  $b = 1$  on a  $2 \frac{(n - 6)}{1.} \frac{(n - 7)}{2.}$

Si  $c$  est le plus petit, les autres  $a, a+1, a+2, b, b+1$ , doivent être tirés de cette progression  $c+2, c+3 \dots n$ , dont le nombre de termes  $= n - c - 1$ , d'où par le problème IV.

le nombre des cas est  $= 2 \frac{(n - c - 5)}{1.} \frac{(n - c - 6)}{2.}$ ,

& posant  $c = 1$ , on a  $2 \frac{(n - 6)}{1.} \frac{(n - 7)}{2.}$

Les trois progressions à sommer se réduisent donc à cette seule

$$6 \frac{(n - 6)}{1.} \frac{(n - 7)}{2.} + 6 \frac{(n - 7)}{1.} \frac{(n - 8)}{2.} + \&c.$$



Donc le nombre des cas est  $= 6 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)}{1. 2. 3},$

& la probabilité  $= 6. \frac{4. 5. 6 (n-6)(n-7)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}.$

*VII Espece.*  $a, a+1, a+2, b, c, d.$

Si  $a$  le plus petit des nombres tirés, au lieu duquel on peut d'abord prendre l'unité, les autres  $b, c, d,$  doivent être pris de cette progression:  $5, 6, 7 \dots n,$  dont le nombre des termes  $= n-4.$

Donc, par le probleme II, le nombre des cas est

$$= \frac{(n-6)(n-7)(n-8)}{1. 2. 3}.$$

Si un des solitaires est le plus petit, comme  $d = 1,$  les autres  $a, a+1, a+2, b, c,$  doivent être pris de cette progression  $3, 4, 5 \dots n,$  dont le nombre des termes  $= n-2.$

Donc, par le probleme IV, le nombre des cas

$$= 3 \frac{(n-6)(n-7)(n-8)}{1. 2. 3}.$$

Il s'agit donc de sommer la progression descendante qui commence

par  $4 \frac{(n-6)(n-7)(n-8)}{1. 2. 3}.$

Donc le nombre de tous les cas  $= 4 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{1. 2. 3. 4},$

& la probabilité  $= 4. \frac{5. 6 (n-6)(n-7)(n-8)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}.$



VIII *Especce.*  $a, a+1, b, b+1, c, c+1.$

Ici il n'y a qu'un seul cas à considérer. Soit donc  $c = 1$ , & les autres  $a, a+1, b, b+1$ , doivent être tirés de cette progression:  $4, 5, 6 \dots n$ , dont le nombre des termes  $= n-3$ , d'où par le probleme III. le nombre des cas  $= \frac{(n-6)(n-7)}{1.2}$ , qui donne la progression à sommer.

Donc le nombre de tous les cas est  $= \frac{(n-5)(n-6)(n-7)}{1.2.3}$ ,

& la probabilité  $= \frac{4.5.6(n-6)(n-7)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$ .

IX *Especce.*  $a, a+1, b, b+1, c, d.$

Soit  $a = 1$  & les autres  $b, b+1, c, d$ , doivent être tirés de cette progression:  $4, 5, 6 \dots n$ , dont le nombre des termes  $= n-3$ .

Donc par le probleme III. le nombre des cas

$$= 3 \frac{(n-6)(n-7)(n-8)}{1.2.3},$$

& dans cette formule est déjà comprise la position  $b = 1$ .

Soit  $d = 1$ , où est déjà comprise la lettre  $c$ , les autres:  $a, a+1, b, b+1$ , doivent être tirés de cette progression:  $3, 4 \dots n$ , dont le nombre de termes  $= n-2$ .

Donc, par le probleme IV. le nombre des cas

$$= \frac{3(n-6)(n-7)(n-8)}{1.2.3},$$

& partant on n'a qu'à sommer la progression descendante qui commence par le terme  $6 \frac{(n-6)(n-7)(n-8)}{1.2.3}$ .

Et 3

D'où



D'où le nombre de tous les cas  $\equiv 6 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{1. 2. 3. 4}$ ,

& la probabilité  $\equiv 6. \frac{5. 6 (n-6)(n-7)(n-8)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$ .

*X Espece.*  $a, a+1, b, c, d, e$ .

Soit premièrement  $a \equiv 1$ , & les quatre nombres solitaires  $b, c, d, e$ , doivent être tirés de cette progression: 4, 5, 6 . . . .  $n$ , dont le nombre des termes  $\equiv n - 3$ , & par le probleme III. le

nombre des cas  $\equiv \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)}{1. 2. 3. 4}$ .

Soit ensuite un des solitaires  $e \equiv 1$ , & les autres  $a, a+1, b, c, d$ , doivent être tirés de cette progression: 3, 4, 5 . . . .  $n$ , dont le nombre des termes  $\equiv n - 2$ , & par le probleme IV. le

nombre des cas  $\equiv 4 \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)}{1. 2. 3. 4}$ ,

de sorte qu'il s'agit de sommer la progression descendante qui commence par le terme  $5 \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)}{1. 2. 3. 4}$ .

Donc le nombre de tous les cas

$\equiv 5 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)}{1. 2. 3. 4. 5}$ .

& la probabilité  $\equiv 5. \frac{6(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$ .

*XI Espece.*  $a, b, c, d, e, f$ .

Ici n'ayant qu'un cas à considérer, posons  $f \equiv 1$ , & les autres  $a, b, c, d, e$ , doivent être tirés de cette progression: 3, 4, 5 . . . .  $n$ , dont le nombre des termes  $\equiv n - 2$ .

Ainsi,



Ainsi, par le probleme IV. le nombre des cas

$$= \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5.}$$

Donc le nombre de tous les cas

$$= \frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5. \quad 6.},$$

& la probabilité

$$= \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}.$$

### C O R O L L A I R E I.

21. Pour mettre tout cela clairement devant les yeux, je ferai usage des mêmes caracteres pour marquer les différentes especes de séquences que j'ai exposées §. 18, & nous aurons pour chaque espece.

| Especes                     | Nombre des cas                                  | Probabilité                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| I. . . (6) . . . . .        | $\frac{n-5}{1}$                                 | $\frac{2. \quad 3. \quad 4. \quad 5. \quad 6}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$       |
| II. . . (5) + (1) . . . . . | $\frac{2(n-5)(n-6)}{1. \quad 2}$                | $2. \frac{3. \quad 4. \quad 5. \quad 6 \quad (n-6)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$ |
| III. (4) + (2) . . . . .    | $\frac{2(n-5)(n-6)}{1. \quad 2}$                | $2. \frac{3. \quad 4. \quad 5. \quad 6 \quad (n-6)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$ |
| IV. (4) + 2(1) . . . . .    | $3 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)}{1. \quad 2. \quad 3}$ | $3. \frac{4. \quad 5. \quad 6 \quad (n-6)(n-7)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$     |
| V. 2(3) . . . . .           | $\frac{(n-5)(n-6)}{1. \quad 2}$                 | $\frac{3. \quad 4. \quad 5. \quad 6 \quad (n-6)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$    |

Espe-



| Especes               | Nombre des cas                                                                           | Probabilité                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| VI. (3)+(2)+(1) . . . | $6 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)}{1. \quad 2. \quad 3}$                                          | $6. \frac{4. \quad 5. \quad 6 \quad (n-6)(n-7)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$ |
| VII. (3)+3(1) . . .   | $4 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4}$                            | $4. \frac{5. \quad 6 \quad (n-6)(n-7)(n-8)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$     |
| VIII. 3(2) . . . . .  | $\frac{(n-5)(n-6)(n-7)}{1. \quad 2. \quad 3}$                                            | $\frac{4. \quad 5. \quad 6 \quad (n-6)(n-7)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$    |
| IX. 2(2)+2(1) . . .   | $6 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4}$                            | $6. \frac{5. \quad 6 \quad (n-6)(n-7)(n-8)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$     |
| X. (2)+4(1) . . .     | $5 \frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5}$              | $5. \frac{6 \quad (n-6)(n-7)(n-8)(n-9)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$         |
| XI. 6(1) ..           | $\frac{(n-5)(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5. \quad 6}$ | $\frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)}{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}$              |

## COROLLAIRE II.

22. La loi de ces expressions pour le nombre des cas de chaque espece est assez évidente, puisque le nombre des facteurs dans les numérateurs est le même que celui des différentes lettres dont j'ai caractérisé auparavant les différentes especes, en commençant par  $n - 5$ , & les diminuant d'une unité: or le dénominateur contient toujours autant de facteurs en commençant par 1, 2, 3, &c. Mais la loi des coefficients numériques n'est pas si évidente; cependant elle le deviendra assez en représentant les nombres des cas de la maniere suivante.

Especes



Especies

Nombre des cas

$$1(6) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1}$$

$$1(5) + 1(1) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1} \cdot \frac{n-6}{1}$$

$$1(4) + 1(2) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1} \cdot \frac{n-6}{1}$$

$$1(4) + 2(1) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1} \cdot \frac{n-6}{1} \cdot \frac{n-7}{2}$$

$$2(3) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1} \cdot \frac{n-6}{2}$$

$$1(3) + 1(2) + 1(1) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1} \cdot \frac{n-6}{1} \cdot \frac{n-7}{1}$$

$$1(3) + 3(1) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1} \cdot \frac{n-6}{1} \cdot \frac{n-7}{2} \cdot \frac{n-8}{3}$$

$$3(2) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1} \cdot \frac{n-6}{2} \cdot \frac{n-7}{3}$$

$$2(2) + 2(1) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1} \cdot \frac{n-6}{2} \cdot \frac{n-7}{1} \cdot \frac{n-8}{2}$$

$$1(2) + 4(1) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1} \cdot \frac{n-6}{1} \cdot \frac{n-7}{2} \cdot \frac{n-8}{3} \cdot \frac{n-9}{4}$$

$$6(1) \dots \dots \dots \frac{n-5}{1} \cdot \frac{n-6}{2} \cdot \frac{n-7}{3} \cdot \frac{n-8}{4} \cdot \frac{n-9}{5} \cdot \frac{n-10}{6},$$

où les dénominateurs suivent manifestement les coefficients des séquences de chaque ordre, qui caractérisent chaque espèce.



## R E M A R Q U E.

23. Nous voilà donc maintenant en état de rendre ces recherches tout à fait générales: cependant on ne sauroit commencer par le problème général, puisque chaque nombre des billets tirés dépend de tous les précédens. Mais, quoique cette dernière méthode que je viens d'employer, ait de si grands avantages, il est pourtant à présumer, qu'on en découvrira encore une plus simple.

## P R O B L E M E   G É N É R A L.

24. *Le nombre des billets marqués des nombres naturels 1, 2, 3, 4, &c. étant quelconque  $\equiv n$ ; si l'on en tire  $m$  billets au hazard, déterminer toutes les probabilités, qui y peuvent avoir lieu à l'égard des séquences.*

## S O L U T I O N.

Pour distinguer les différentes sortes de séquences qui peuvent se trouver dans chaque tirage de  $m$  nombres, je me servirai de ces signes:

- (1) marque un nombre solitaire,
- (2) marque une séquence de deux nombres,
- (3) marque une séquence de trois nombres,
- (4) marque une séquence de quatre nombres.

&c.

Cela posé, chaque tirage sera caractérisé par une telle formule  $\alpha(a) + \xi(b) + \gamma(c) + \delta(d) \&c.$  ce qui signifie, qu'il y a  $\alpha$  séquences de  $a$  nombres,  $\xi$  séquences de  $b$  nombres,  $\gamma$  séquences de  $c$  nombres,  $\delta$  séquences de  $d$  nombres &c. & puisque la multitude des nombres tirés est  $\equiv m$ , il faut qu'il soit

$$\alpha a + \xi b + \gamma c + \delta d \&c. \equiv m.$$

Pofons



Pofons maintenant de plus  $\alpha + \xi + \gamma + \delta \&c. = k$ , & le nombre de tous les cas qui produifent ledit tirage  $\alpha(a) + \xi(b) + \gamma(c) + \delta(d) \&c.$  fera exprimé en forte

$$\frac{(n-m+1)(n-m)(n-m-1) \dots (n-m-k+2)}{1.2 \dots \alpha, \quad 1.2 \dots \xi, \quad 1.2 \dots \gamma, \quad 1.2 \dots \delta \&c.},$$

lequel nombre étant divifé par le nombre de tous les cas poffibles qui eft  $= \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-m+1)}{1.2.3 \dots m}$ ,

donnera la probabilité que ce même cas existe. C'eft en quoi confifte la folution complete de notre probleme.

#### C O R O L L A I R E I.

25. On aura donc autant d'efpeces de tirage, qu'il eft poffible de trouver de différentes formules  $\alpha(a) + \xi(b) + \gamma(c) \&c.$  dont la fomme  $\alpha a + \xi b + \gamma c + \&c.$  foit  $= m$ , c'eft à dire, autant qu'il eft poffible de partager le nombre  $m$  de différentes manieres en parties: ainfi, prenant pour  $m$  fuccelfivement les nombres 1, 2, 3, 4, &c. les nombres des efpeces formeront la progression fuivante:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 22, 30, 42, 56, 77, 101, 135, 176, &c.

dont j'ai expliqué la nature dans mes recherches fur la partition des nombres.

#### C O R O L L A I R E II.

26. Le nombre des facteurs qui compofent le nombre des cas pour chaque efpece  $\alpha(a) + \xi(b) + \gamma(c) + \&c.$  eft toujours égal au nombre  $k = \alpha + \xi + \gamma + \delta + \&c.$  qui marque en combien de parties le nombre  $m$  eft partagé. Et prenant toutes les efpeces enfemble, où  $k$  a la même valeur, leurs nombres de cas font conjointement cette fomme:

$$\frac{(m-1)(m-2) \dots (m-k+1)}{1.2 \dots k-1} \cdot \frac{(n-m+1)(n-m)(n-m-1) \dots (n-m-k+2)}{1.2.3 \dots k}.$$

F f 2

Ainfi

Ainsi les nombres des cas de toutes les especes, qui appartiennent à la  $k$  est cette valeur de  $k$  sont

$$\begin{array}{l|l}
 1 & \frac{n-m+1}{1} \\
 2 & \frac{m-1}{1} \cdot \frac{(n-m+1)(n-m)}{1 \cdot 2} \\
 3 & \frac{m-1}{1} \cdot \frac{m-2}{2} \cdot \frac{(n-m+1)(n-m)(n-m-1)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \\
 4 & \frac{m-1}{1} \cdot \frac{m-2}{2} \cdot \frac{m-3}{3} \cdot \frac{(n-m+1)(n-m)(n-m-1)(n-m-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} \\
 & \text{\&c.}
 \end{array}$$

& tous ces nombres de cas ajoutés ensemble doivent produire le nombre de tous les cas possibles, qui est

$$\frac{n(n-1)(n-2)(n-3) \dots (n-m+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots m}$$

### C O R O L L A I R E III.

27. La premiere espece étant  $1(m)$ , où tous les  $m$  nombres tirés forment une suite, on aura  $k = 1$ , & le nombre des cas est  $= \frac{n-m+1}{1}$ ; mais la derniere espece étant  $m(1)$  où il n'y a aucune séquence, il devient  $k = m$ , & le nombre des cas  $= \frac{(n-m+1)(n-m)(n-m-1) \dots (n-2m+2)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots m}$ .

Donc la probabilité qu'il n'y ait aucune séquence parmi les  $m$  nombres tirés est

$$\frac{(n-m+1)(n-m)(n-m-1) \dots (n-2m+2)}{n(n-1)(n-2) \dots (n-m+1)},$$

ou



ou bien  $\frac{(n-m)(n-m-1)(n-m-2) \dots (n-2m+2)}{n(n-1)(n-2) \dots (n-m+2)}$

Or cette même formule exprime aussi la probabilité, que de  $m-1$  nombres donnés il ne se trouve aucun parmi les  $m$  nombres tirés.

### EXEMPLE.

28. Faisons l'application, où de  $n$  billers marqués des nombres 1, 2, 3 . . . . .  $n$ , on tire 7 billers: & l'on trouvera le nombre des cas, qui produisent chacune des 15 espèces qui peuvent avoir lieu dans un tirage de 7 nombres.

| Espèces                       | nombre des cas                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| I. (7) . . . . .              | $\frac{n-6}{1},$                               |
| II. (6) + (1) . . . . .       | $\frac{(n-6)(n-7)}{1. \quad 1},$               |
| III. (5) + (2) . . . . .      | $\frac{(n-6)(n-7)}{1. \quad 1},$               |
| IV. (4) + (3) . . . . .       | $\frac{(n-6)(n-7)}{1. \quad 1},$               |
| V. (5) + 2(1) . . . . .       | $\frac{(n-6)(n-7)(n-8)}{1. \quad 1. \quad 2},$ |
| VI. (4) + (2) + (1) . . . . . | $\frac{(n-6)(n-7)(n-8)}{1. \quad 1. \quad 1},$ |
| VII. 2(3) + (1) . . . . .     | $\frac{(n-6)(n-7)(n-8)}{1. \quad 2. \quad 1},$ |
| VIII. (3) + 2(2) . . . . .    | $\frac{(n-6)(n-7)(n-8)}{1. \quad 1. \quad 2}.$ |





$$\text{IX. } (4) + 3(1) \dots \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)}{1. \quad 1. \quad 2. \quad 3.},$$

$$\text{X. } (3) + (2) + 2(1) \dots \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)}{1. \quad 1. \quad 1. \quad 2.},$$

$$\text{XI. } 3(2) + (1) \dots \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 1.},$$

$$\text{XII. } (3) + 4(1) \dots \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)}{1. \quad 1. \quad 2. \quad 3. \quad 4.},$$

$$\text{XIII. } 2(2) + 3(1) \dots \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)}{1. \quad 2. \quad 1. \quad 2. \quad 3.},$$

$$\text{XIV. } (2) + 5(1) \dots \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)(n-11)}{1. \quad 1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5.},$$

$$\text{XV. } 7(1) \dots \frac{(n-6)(n-7)(n-8)(n-9)(n-10)(n-11)(n-12)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5. \quad 6. \quad 7.},$$

Chacun de ces nombres divisés par le nombre de tous les cas possibles qui est  $\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)(n-6)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5. \quad 6. \quad 7.}$ , donne la probabilité que l'espèce correspondante existe.





S U R  
LES SUITES OU SÉQUENCES  
D A N S  
LA LOTTERIE DE GENES.  
*PREMIER MÉMOIRE.*  
P A R M. B E G U E L I N.

---

§. I.

**L**a doctrine des probabilités appartient à la Métaphysique autant, & plus peut-être, qu'à la Géométrie. Si celle-ci prête ses calculs, l'autre fournit le principe qui leur sert de base.

Mais n'est-ce pas au fond une discussion bien minutieuse, que celle qui roule sur le département des diverses sciences; & qu'importe-t-il à leur progrès de revendiquer à l'une, des matieres que l'autre a déjà traitées avec tant de sagacité? On peut répondre que le Métaphysicien employe la langue du vulgaire; qu'il se met autant qu'il est possible à la portée de tous, au lieu que l'Analyste se hâte dès les premières lignes de parler le langage le plus correct, le plus concis, le plus énergique à la vérité, mais qui n'est entendu que de ceux qui sont initiés dans les profondeurs de l'Algèbre, & cela n'est pas l'affaire de tout le monde.

§. 2. Il y a plus: dès que la discussion exacte d'une matiere exige le secours du calcul, le Métaphysicien & le Géomètre la traiteront différemment; & il est probable qu'aussi loin que le premier pourra aller, la clarté, l'évidence, & même la brièveté, seront préférablement de son côté. Qu'on me pardonne ce paradoxe en faveur de la Métaphysique. On exalte si souvent la Géométrie à ses dépens, qu'il



qu'il doit être permis aussi de relever les cas, où celle-là a quelque avantage sur l'autre: d'ailleurs la vanité n'entre ici pour rien, puisque cet avantage du Métaphysicien n'est dû qu'à la supériorité même de l'Algébriste. Ce sont deux voyageurs jettés sur une côte inconnue, qu'ils cherchent à reconnoître. L'un qu'aucun obstacle n'arrête, s'enfonce tête baissée dans l'épaisse forêt qui se présente devant lui, marche d'un pas sûr & ferme au milieu de l'obscurité du bois, écarte à droite & à gauche les épines qui lui ferment le passage, franchit les broussailles, saute les ravins, & à travers mille difficultés qu'il sait surmonter, il arrive enfin par une route sombre & ténébreuse au hut qu'il s'étoit proposé sans l'avoir auparavant ni vu, ni connu.

L'autre, moins vigoureux & plus timide, que l'aspect d'une forêt inconnue effraye, cherche à se placer sur quelque hauteur d'où il puisse à vue d'oiseau découvrir les routes les moins pénibles de ce bois, & voir d'un même coup d'oeil le point d'où il lui faut partir, & celui où il doit arriver. Il n'est pas douteux, que ce dernier parviendra au but, par un chemin plus court, moins raboteux & mieux éclairé, que le premier. Mais on ne trouve pas toujours de ces points de vues élevés; & il y a bien des forêts impénétrables au Métaphysicien: c'est ce dont je conviendrai à mon tour très volontiers.

§. 3. Une *séquence* dans la Lotterie de Genes seroit une suite de nombres sortis dans un même tirage, dont l'un n'excéderoit l'autre que de l'unité. Deux nombres tels seront une *séquence binaire*; trois une *ternaire*, &c. Au reste il n'est pas besoin que ces nombres sortent précisément dans l'ordre de séquence; il suffit que ceux d'un même tirage soient susceptibles d'un tel arrangement. Ainsi un tirage qui donnera successivement les nombres 7. 13. 17. 8. 24. contiendra la séquence binaire 7. 8.

§. 4. On peut considérer de deux façons les séquences que les numéros d'une Lotterie produisent: la première façon, c'est de ne s'attacher qu'à la suite naturelle des nombres. C'est ainsi que l'a fait M. Euler dans son excellent Mémoire sur ce sujet. La seconde manière,



niere, c'est de concevoir par fiction tous les numeros rangés en cercle, ce qui ajoute une séquence de plus, savoir celle que forment entr'eux le plus grand numero, & le plus petit, en fermant le cercle. C'est la supposition qu'a adopté Mr. Bernoulli. L'une & l'autre estimation a son avantage & son inconvénient, celle de Mr. Euler a plus de régularité dans le calcul abstrait, l'autre en a plus relativement au plan d'une lotterie, où tous les numeros doivent être indifférens au choix. Je me propose ici de les réunir; & d'envisager les séquences sous ce double aspect.

§. 5. En supposant que l'on veuille introduire le hazard des séquences de l'une ou de l'autre espece dans la Lotterie de Genes, la question qui se présente à résoudre c'est de savoir quelle probabilité il y a que dans un certain nombre de numeros tirés en un seul tirage il y aura séquence ou non; & par conséquent quelle seroit la proportion entre la mise & le gain à bénéfice égal?

§. 6. Puisqu'il s'agit de déterminer ici le degré de probabilité des événemens, il faut commencer par établir les regles de cette probabilité. Elles sont fondées sur le principe du besoin d'une raison suffisante. En effet les événemens qu'on considere ici étant tous possibles absolument parlant; le principe de la contradiction n'en sauroit exclure aucun, ni décider lesquels ont plus ou moins de prétension à l'existence. C'est au principe de la raison suffisante seul à faire cette décision. Ce principe nous dit que lorsqu'une opération unique, un tirage de lotterie, par exemple, peut faire naître plusieurs événemens différens, s'il n'y a point de raison pourquoi un de ces événemens doit plutôt résulter de cette opération qu'un des autres, la probabilité est égale pour chacun d'eux; mais que si, de deux événemens possibles, l'un peut exister par un plus grand nombre de cas que l'autre, & que tous ces cas soient également possibles, la probabilité de ces deux événemens sera exactement proportionnée aux nombres des cas qui les peuvent produire; d'où résultent les deux regles pour estimer la probabilité d'un événement quelconque. Voici la premiere: *Compa-*



rez le nombre des cas, où cet événement peut exister par l'opération, au nombre de tous les cas que cette opération peut produire, & le rapport de ces deux nombres exprimera le degré de probabilité de l'événement en question: que, par exemple, les numeros d'un tirage puissent donner en tout 50 combinaisons différentes: qu'entre ces combinaisons il y en puisse avoir 5, qui contiennent des séquences, la probabilité pour ces séquences sera exprimée par le rapport de 5 à 50, ou de 1 à 10, & par conséquent par la fraction  $\frac{1}{10}$ , rapportée à l'unité. C'est la règle qu'emploient ordinairement les Géomètres dans l'estimation de la probabilité d'un cas particulier, parce qu'ils considèrent ce cas hors de son rapport avec les cas opposés.

Voici la seconde règle, qui, quoiqu'elle revienne pour le fond à la précédente, est cependant plus d'usage dans la vie commune, & principalement dans les jeux de hazard: *Comparez le nombre des cas où un événement peut exister par une opération, avec le nombre des cas où cette opération ne sauroit le produire; & le rapport des deux nombres exprimera la probabilité pour & contre cet événement; ou, ce qui revient au même, ce rapport exprimera les sommes que l'on peut parier de part & d'autre à partie égale.* Ainsi, dans l'exemple précédent, les probabilités pour & contre la séquence seront, selon cette dernière règle, comme 5 à 45; & celui qui parie pour la séquence peut par conséquent mettre 1 écu contre 9. Car, tous les 50 cas étant également possibles, il n'y a point de raison pourquoi l'un seroit plus probable que l'autre: ils ont donc chacun le même degré de probabilité: donc celui qui parie pour la séquence a 5 degrés d'espérance, tandis que celui qui parie contre lui en a 45. Celui-ci peut par conséquent risquer 9 écus quand l'autre en hazarde un.

§. 7. Pour résoudre la question sur le degré de probabilité des séquences, il n'y a donc qu'à compter toutes les combinaisons qui peuvent résulter d'un tirage, & voir ensuite lequel est plus facile, ou de compter les combinaisons qui contiennent des séquences, ou celles qui n'en contiennent point. Comme l'une de ces sommes soustraite



soustraite de la somme des combinaisons totales, donne toujours l'autre, il est clair qu'il n'est besoin d'en chercher qu'une, & qu'il faut chercher celle qui se trouve le plus aisément. J'appellerai *combinaisons totales*, la somme de tous les cas possibles qu'un tirage peut produire; *combinaisons pures*, la somme des cas de ce tirage qui ne contiennent point de séquence; & *séquences*, la somme des cas du même tirage qui renferment des suites. On comprendra par là, ce que j'entends, par *ambes, ternes, quadermes, totaux. Ambes, ternes, quadermes purs. Séquences d'ambe, de terne, de quaderne, &c.*

§. 8. Quoique la Lotterie de Genes est assez connue, pour qu'on soit familiarisé avec la méthode de compter les combinaisons totales, je crois cependant qu'on peut répandre plus de clarté sur ce sujet en le représentant d'une manière plus sensible; les nombres abstraits fatiguent aisément l'imagination, qui n'a pas assez de prise sur eux. Quiconque a vu marcher des soldats, fait ce que c'est que *rangs & files*. Le nombre des files représente fort bien le nombre des numeros, qu'on tire dans un tirage, comme le nombre des rangs, ou des individus qui se suivent dans une file, représente le nombre total des numeros que la roue contient. Concevons donc d'après cette image qu'on ait à ranger plusieurs suites de médailles d'anciens Empereurs Romains, depuis *Auguste* jusqu'à *Trajan*, & plus loin, s'il le faut: chaque suite formera une file, & il y aura autant de ces files rangées sur même hauteur l'une à côté de l'autre qu'on aura de suites de ces Empereurs. Le premier rang contiendra les Augustes, le second les Tiberes, & le dernier les Trajans.

§. 9. Si l'on demande à présent en combien de façons on peut transposer ces médailles sans diminuer ni les files, ni les rangs, il est clair que chaque médaille de la première file peut faire ambe, avec chaque médaille de la seconde; & chacun de ces ambes former un terne avec chaque individu de la troisième; & chacun de ces ternes donner un quaderne avec chaque pièce de la quatrième file, & ainsi de suite aussi loin qu'on voudra, de sorte que pour avoir toutes les





transpositions, il n'y a qu'à multiplier les rangs par eux-mêmes, autant de fois qu'il y a de files, ou, (ce qui revient au même,) autant de fois qu'un rang contient d'individus. Ainsi cinq suites de médailles, chacune de 13 Empereurs, formant 13 rangs, sur 5 individus de front peuvent se transposer, sans diminuer, ni les rangs, ni les files, de 13 fois 13 fois 13 fois 13 fois 13 manières, c. a. d. autant de fois que le nombre 13, élevé à la cinquième puissance contient d'unités.

Mais dans ces transpositions entrent toutes les combinaisons de simple situation, où divers rangs ne contiennent que les mêmes individus autrement placés. Or cette diversité est comptée pour rien dans la Lotterie de Genes. *Auguste & Tibère*; *Tibère & Auguste*, n'y feroient qu'un même ambe. *Claude - Galba - Néron*; *Galba - Néron - Claude*; *Néron - Claude - Galba*, & les trois autres transpositions de ces trois noms n'y sont comptés que pour un seul terme. Ainsi, pour trouver les combinaisons sans répétition, il faut éviter d'allier plus d'une fois les mêmes individus.

Supposons donc d'abord deux seules files: l'*Auguste* de la première file peut se combiner avec tous les individus de l'autre file. Le *Tibère* de la première, ne peut plus se combiner avec l'*Auguste* de la seconde file, ce seroit une répétition; mais il se combinera avec tous les autres. *Claude*, par la même raison, se combinera avec tous à l'exception d'*Auguste* & de *Tibère*; en un mot chaque médaille de la première file se combine avec celle de la seconde qui se trouve au même rang qu'elle, & avec celles de tous les rangs qui suivent celui-là, à l'exclusion de toutes celles qui sont dans les rangs supérieurs. De sorte que si *Trajan* est le dernier de la première file, il ne se combine qu'avec le *Trajan* de la seconde. Le nombre des combinaisons augmente donc depuis *Trajan* jusqu'à *Auguste* selon la progression naturelle des nombres 1. 2. 3 . . . 13. Or on sait que la somme de cette progression arithmétique est la somme des deux nombres extrêmes multipliée par la moitié du plus grand, & par conséquent dans notre exemple elle sera  $14 \times 6\frac{1}{2} = 91$ , ou en général





si le nombre indéterminé des rangs s'appelle  $n$ , la somme des combinaisons de deux files sera  $(n + 1) \frac{1}{2} n = \frac{n(n + 1)}{2}$ .

Si nous ajoutons une troisième file, égale aux précédentes, on trouvera par les mêmes raisons, que l'*Auguste* de la première file, combiné avec l'*Auguste* de la seconde, forme autant de ternes, que la troisième file a d'individus; puis combiné avec le *Tibère* de la seconde file, il forme des ternes, avec le *Tibère* & tous les suivans de la troisième: ensuite combiné avec le *Claude* de la seconde file, il forme des ternes avec le *Claude*, & tous les suivans de la troisième file. On trouve une parfaite analogie dans tous les autres de la première file, d'où résulte pour chacun d'eux un nombre de combinaisons, égal à la somme d'une progression arithmétique naturelle,  $1 + 2 + 3$  &c. dont le plus grand terme est égal au nombre du rang de cet empereur à compter les rangs de bas en haut. Ainsi le *Trajan* ne forme qu'une combinaison de terne: le *Nerva*, en forme trois, *Domitien*, 6; *Tite*, 10; & ainsi de suite. Donc la somme des combinaisons des ternes est exprimée, par la suite des nombres qu'on nomme *triangulaires*,  $1 + 3 + 6 + 10 + 15$  &c. dont chaque terme est la somme de la suite ou progression naturelle, qui lui correspond. Or il y a ici autant de termes, qu'il y a de rangs à combiner, & l'on fait que la somme des nombres triangulaires pour un nombre quelconque de termes, que j'appellerai  $n$ , est  $= \frac{n(n + 1)}{1.} \frac{(n + 2)}{2.} \frac{(n + 3)}{3.}$

On trouve par la même méthode, que la somme des combinaisons de quatre files, s'exprime par la suite des *nombres pyramidaux premiers*, qui résultent de l'addition des triangulaires, comme ceux-ci résultoient de l'addition des nombres naturels. Cette suite est donc  $1 + 4 + 10 + 20$  &c. & la somme pour un certain nombre de rangs nommé  $n$  sera:  $\frac{n(n + 1)}{1.} \frac{(n + 2)}{2.} \frac{(n + 3)}{3.} \frac{(n + 4)}{4.}$



Si l'on ajoute une cinquieme file, les combinaisons qui en résultent, seront par conséquent exprimées par la somme des nombres *Pyramidaux seconds*, dont chaque terme représente la somme des nombres pyramidaux premiers jusqu'à ce terme là. Cette suite est donc  $1 + 5 + 15 + 35$  &c. & la somme pour un certain nombre de rangs, nommé  $n$ , est 
$$= \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}$$

Il n'est pas besoin de pousser cette discussion plus loin, on voit aisément que la même analogie subsiste jusqu'à l'infini, & je ne m'y serois pas même arrêté puisque dans le sujet que je vais traiter il m'étoit permis de supposer tout ceci connu, n'étoit que ces combinaisons vont servir de base à ce que j'ai à dire sur les séquences; par la même raison j'ajouterai encore quelques observations qui ne les concernent pas immédiatement.

§. 10. Ce calcul des combinaisons de nos médailles seroit précisément celui de la Lotterie de Genes, si le même numero pouvoit sortir plus d'une fois dans un même tirage. Mais comme cela n'a pas lieu, il faut faire un petit changement dans la disposition de nos files, que la premiere à gauche reste immobile, & que la seconde s'éleve d'un échellon; alors *Auguste* range avec *Tibère*; & *Nerva* avec *Trajan*. La troisieme file excédera de même la seconde d'un pas, l'on aura alors au premier rang complet, *Auguste*, *Tibère*, *Caligula*; & au dernier *Domitien*, *Nerva*, *Trajan*. La quatrieme file avancée pareillement, donnera au premier rang complet, *Auguste*, *Tibère*, *Caligula*, *Claude*, & au dernier *Tite*, *Domitien*, *Nerva*, *Trajan*. Il en fera encore de même des autres files qu'on voudra ajouter.

On voit aisément que le calcul des combinaisons reste toujours le même; la seule différence qui s'y trouve c'est que le nombre des rangs complets a diminué, il n'est plus égal au nombre des individus de la premiere file, comme il l'est lorsque toutes les files sont d'égale longueur. Ici le nombre des rangs complets est toujours égal au

nom-



nombre des individus de la plus courte file, qui est dans notre arrangement celle du flanc droit. Ainsi une suite de 13 médailles ne donne que 12 rangs à deux de front, 11 à trois de front, 10 à quatre de front; & les quines ne forment que 9 rangs complets. Si l'on demande donc combien ces 5 files de 13 médailles donneront de quines,

on a ici  $n = 9$ , par conséquent ce sera  $\frac{9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 1287$ .

§. 11. Comme nous avons évité les combinaisons ideotiques en faisant monter d'un pas chacune de nos files sur la voisine de la gauche; il nous sera tout aussi aisé d'éviter les combinaisons de séquence en faisant faire à ces files deux pas au lieu d'un. On aura alors au premier rang complet, *Auguste Caligula*, s'il n'y a que deux files; *Auguste, Caligula, Néron*, s'il y en a trois; le dernier rang sera dans le premier cas, *Domitien, Trajan*, & dans le second, *Vespasien, Domitien, Trajan*; & ainsi des autres files qu'on voudra ajouter.

Le calcul des combinaisons pures sera encore ici le même que celui des totales §. 10. & des identiques §. 9. seulement il y aura moins de rangs à combiner; leur nombre sera toujours égal à la plus courte file; & puisque chaque file excepté la première se raccourcit de deux nombres, le raccourcissement de la dernière sera deux fois le nombre des files diminué d'une unité. Ainsi notre suite de 13 empereurs donnera 11 rangs d'*ambes purs*, 9 rangs de *ternes purs*, 7 rangs de *quaternes purs*, & 5 rangs de quines sans séquences. Si l'on demande donc combien ces 5 files donneront de quines, sans qu'aucun Empereur soit rangé de front avec son successeur ou ses successeurs immédiats, on a ici  $n = 5$ , & par conséquent la somme de ces quines purs est  $= \frac{5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} = 126$ .

§. 12. Nous avons trouvé §. 10. les quines totaux pour le même nombre de 13 médailles  $= 1287$ , ôtant de cela les quines purs, reste le nombre des cas de séquences  $= 1161$ . Ainsi la probabilité





pour l'*Auguste* de la première file, le dernier rang où se trouve *Trajan*, & rétablir ce dernier rang pour tous les successeurs d'*Auguste* contenus dans la première file. De là il suit que le *Tibère*, & tous ses successeurs, se combineront avec autant de rangs que lorsqu'on compte les séquences à la manière de M. Euler, mais qu'*Auguste*, qui à cette manière-là se combinait avec un rang de plus, que son suivant *Tibère*, ne se combine ici qu'avec le même nombre de rangs que celui-ci. D'où il résulte encore, qu'*Auguste* & *Tibère* auront tous deux le même nombre de combinaisons. De sorte que les progressions de nombres naturels pour les ambes, de nombres triangulaires pour les ternes, de nombres pyramidaux premiers pour les quadernes, de nombres pyramidaux seconds pour les quines, &c. que toutes ces progressions, dis-je, commençant toujours par l'unité à *Trajan*, n'iront plus que jusqu'à la hauteur du rang de *Tibère* inclusivement, & qu'à leur somme il faudra ajouter la répétition du dernier terme, pour les combinaisons d'*Auguste*; ce qui donnera la somme des combinaisons pures, & par conséquent aussi les séquences dans le sens de M. Bernoulli.

Que par exemple le nombre des médailles de la première file soit toujours 13, la seconde file n'en aura que 11 à cette hauteur, & ne formera par conséquent que 11 rangs d'ambes. Mais *Auguste* ne pouvant pas se combiner avec *Trajan*, c'est comme s'il n'y avoit pour lui que 10 rangs. Or *Tibère* peut aussi se combiner avec 10 rangs; *Caligula* avec 9; *Claude* avec 8; &c. C'est donc comme si la progression naturelle n'avoit que 10 termes, & que le dixième fut répété. Mais la somme d'une progression naturelle de 10 termes, est  $(10 + 1) \times \frac{1}{2} = 55$ ; ajoutez-y encore une fois le dernier terme 10, pour les combinaisons pures de l'*Auguste*, & vous aurez la somme de toutes les combinaisons pures = 65. Selon Mr. Euler on l'auroit trouvée = 66. Les combinaisons totales sont ici 91; donc il y a selon Mr. Euler 25 cas de séquences, & selon Mr. Bernoulli, 26.



C'est le même procédé pour les ternes purs : la troisième file dans notre exemple ne range plus qu'à 9 de profondeur. On auroit donc 9 rangs complets, & par conséquent une progression de nombres triangulaires de 9 termes ; mais pour éviter la séquence circulaire, cette progression n'a plus que 8 termes avec redoublement du dernier : c'est donc  $n = 8$ , qui donne  $\frac{8 \cdot 9 \cdot 10}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 120$ .

Pour trouver le dernier ou huitième terme de cette progression à ajouter, il n'y a qu'à considérer que l'*Auguste* de la première file, dont on cherche les combinaisons, forme avec ces 8 rangs de deux files, précisément autant de ternes que ces 8 huit rangs donnent d'ambes ; or, si  $n$  est  $= 8$ , on a  $\frac{8 \times 9}{2} = 36$  ; pour la somme des ambes, & par conséquent pour la somme des combinaisons de l'*Auguste*, ou, ce qui est encore la même chose, pour le huitième terme de la progression triangulaire qu'on cherchoit, & qu'on auroit pu trouver aussi en se rappelant seulement que chaque terme des nombres triangulaires est la somme de la suite naturelle des nombres jusqu'à lui :  $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8$ . Ajoutant donc 36 à 120, on a la somme des ternes purs, dans notre cas, selon M. Bernoulli  $= 156$ . Selon M. Euler, on auroit eu une progression triangulaire de 9 termes dont la somme eût été  $= \frac{9 \times 10 \cdot 11}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 165$  ternes purs, les ternes totaux sont ici  $= \frac{11 \cdot 12 \cdot 13}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 286$  : donc il y a dans ce cas selon M. Euler 121 cas de séquences ; & 130 dans le sens de M. Bernoulli.

§. 15. Il seroit superflu, sans doute, de donner après cela des exemples de quaternes & de quines, dans cette seconde manière d'estimer les séquences. Nous en avons assez dit, pour qu'à l'aide du principe de la raison suffisante, & de l'analogie dont ce principe est la base, nous puissions généraliser les vérités contenues dans ces exemples





ples particuliers; & en retranchant successivement les déterminations individuelles, appercevoir dans un cas singulier les propriétés universelles des espèces & des genres sous lesquels ce cas étoit renfermé. Ici, par exemple, pour un nombre 13 de médailles, nous avons 13 — 3 rangs d'ambes; 13 — 5 rangs de ternes; 13 — 7 rangs de quadernes; &c. par la même raison nous aurons pour un nombre  $n$ , de numeros;  $n$  — 3 ambes;  $n$  — 5 ternes;  $n$  — 7 quadernes &c. Mais ces nombres à retrancher successivement 3. 5. 7. répondent aux nombres des files 2. 3. 4. que nous avons successivement considérées. C'est la même raison suffisante qui fonde le rapport de diminution de 3 sur deux files; & de 5 sur trois files, par conséquent aussi de  $2f$  — 1 sur  $f$  files.

Ainsi, dans le sens des séquences circulaires, si le nombre des numeros de la lotterie se nomme  $n$ , on aura

*Tirage*

*Combinaisons pures.*

$$\text{de 2 Nos.} \quad \therefore \quad \frac{(n-3)(n-2)}{1. \quad 2} + n-3 = \frac{(n-3)n}{1. \quad 2},$$

$$3 \text{ Nos.} \quad \therefore \quad \frac{(n-5)(n-4)(n-3)}{1. \quad 2. \quad 3} + \frac{(n-5)(n-4)}{1. \quad 2} = \frac{(n-5)(n-4)n}{1. \quad 2. \quad 3};$$

$$4 \text{ Nos.} \quad \frac{(n-7)(n-6)(n-5)(n-4)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4} + \frac{(n-7)(n-6)(n-5)}{1. \quad 2. \quad 3} = \frac{(n-7)(n-6)(n-5)n}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4};$$

$$5 \text{ Nos.} \quad \frac{(n-9)(n-8)(n-7)(n-6)(n-5)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5} + \frac{(n-9)(n-8)(n-7)(n-6)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4} = \frac{(n-9)(n-8)(n-7)(n-6)n}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5};$$



*Tirage**Séquences.*

$$\text{de 2 Nos.} \dots \dots \dots \frac{(n-1)n-(n-3)n}{1. \quad 2},$$

$$3 \text{ Nos.} \dots \dots \dots \frac{(n-2)(n-1)n-(n-5)(n-4)n}{1. \quad 2. \quad 3},$$

$$4 \text{ Nos.} \dots \dots \dots \frac{(n-3)(n-2)(n-1)n-(n-7)(n-6)(n-5)n}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4.},$$

$$5 \text{ Nos.} \dots \dots \dots \frac{(n-4)(n-3)(n-2)(n-1)n-(n-9)(\dots)(n-6)n}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4. \quad 5.},$$

& plus généralement encore pour un tirage de  $t$  numeros, la somme des combinaisons pures fera

$$= \frac{(n-2t+1)(n-2t+2)(\dots)(n-t-1)n}{1. \quad 2. \quad 3. \quad \dots \quad t},$$

& celle des séquences fera

$$= \frac{(n-t+1)(n-t+2)(\dots)(n-t+t)-(n-2t+1)(n-2t+2)(\dots)(n-t+1)n}{1. \quad 2. \quad 3. \quad \dots \quad t}.$$

§. 16. La formule générale des combinaisons totales, & des combinaisons pures, pour un nombre quelconque de numeros  $n$ , dont on suppose qu'on tire à chaque tirage un nombre quelconque de numeros  $t$ , étant trouvée §. 13. & 15. on a aussi la formule générale pour la probabilité qu'il n'y aura point de séquences, en divisant les combinaisons *pures* par les *totales*; cette probabilité fera selon Mr. Euler:

$$= \frac{(n-2t+2)(n-2t+3)(\dots)(n-t+1)}{(n-t+1)(n-t+2)(\dots)n}.$$

& selon Mr. Bernoulli

$$= \frac{(n-2t+1)(n-2t+2)(\dots)(n-t-1)}{(n-t+1)(n-t+2)(\dots)(n-1)}.$$

Or



Or, dès que je sai combien il y a de probabilité pour la non-séquence, je sai en même tems la probabilité qu'il y a pour la séquence; puisque je n'ai qu'à soustraire de l'unité la fraction qui exprime l'une de ces probabilités, pour avoir l'autre.

Ainsi la formule générale pour la probabilité des séquences dans le sens de M. Euler est

$$= 1 - \frac{(n-2t+2)(n-2t+3)(\dots)(n-t+1)}{(n-t+1)(n-t+2)(\dots)(n)},$$

& dans le sens de M. Bernoulli, cette probabilité est

$$= 1 - \frac{(n-2t+1)(n-2t+2)(\dots)(n-t-1)}{(n-t+1)(n-t+2)(\dots)(n-1)}.$$

§. 17. Nommant, pour abrégé, le produit des facteurs  $(n-2t+2)(n-2t+3)(\dots)(n-t-1) = a$ , & celui des facteurs  $(n-t+1)(n-t+2)(\dots)(n-1) = b$ , la probabilité des séquences sera selon M. Euler

$$= \frac{bn - a(n-t)(n-t-1)}{bn},$$

& selon M. Bernoulli

$$= \frac{b - a(n-2t+1)}{b}.$$

Ainsi la première est à la seconde ::  $bn - a(c+tt-t).bn - ac$ , en posant pour abrégé  $nn - 2nt + n = c$ .

Voilà tout ce qu'il y avoit à examiner à l'égard des séquences en général; je supprime nombre de conséquences & d'observations qu'on peut tirer de cette Théorie, pour passer à l'examen d'une seconde question.

§. 18. Si au lieu d'introduire simplement le jeu des séquences dans la Lotterie de Genes, on vouloit y mettre des prix différens



aux diverses especes de séquences de 2, de 3, ou de plusieurs nombres, il s'agiroit alors de trouver le nombre de chaque espece de séquence particuliere binaire, ternaire, quaternaire &c. qui composent la somme des séquences *totales*, que nous venons de trouver. Car, quoique M. Bernoulli nomme *suites binaires*, les séquences que je viens de déterminer, elles ne peuvent s'appeller ainsi qu'entant que toutes les séquences de plus de deux nombres sont nécessairement séquences de deux nombres en même tems; & c'est par cette considération que je les ai plutôt appelé *totales*, puisqu'elles renferment toutes les especes particulieres à la fois: par la même raison j'appellerai *binaires*, celles qui n'ont que deux nombres qui se suivent; *ternaires*, celles qui n'en ont que trois tels &c.

Si l'on veut donc déterminer le nombre des cas de chacune de ces especes particulieres, on pourra également le faire, en partant toujours du principe que j'ai suivi jusqu'ici; rien n'empêche même de débiter dans cette recherche par le Probleme général qui n'a point de difficultés. Cependant, pour répandre plus de clarté sur la méthode que j'y employe, je commencerai par les Problemes particuliers.

I. D'abord, si l'on ne tire que 2 numeros, c. à d. qu'on n'ait à combiner que 2 files, il est évident qu'on n'aura que des séquences *binaires*; & ainsi le cas est déjà résolu, puisqu'ici les séquences *totales* que nous avons trouvées pour un tirage de 2 numeros, ne renferment que des *binaires*. Mais, pour montrer l'usage de notre méthode, cherchons encore une fois le nombre de ces binaires.

Pour le trouver, il n'y a qu'à faire redescendre la seconde file d'un cran afin que chaque Empereur se trouve à côté de son successeur immédiat. Alors on aura au premier rang complet *Auguste, Tibère*; & au dernier *Nerva - Trajan*. Il est évident que cette position représente tous les cas des séquences binaires; & que le nombre de ces cas est précisément égal à celui des rangs. Or la premiere file contient  $n$  médailles, la seconde mise en position de séquence en contient une de moins; il y a donc  $n - 1$  rangs, & par conséquent  $n - 1$  séquen-



quences binaires selon M. Euler. Joignons y la séquence circulaire *Trajan-Auguste*, & nous aurons les binaires, selon M. Bernoulli  $\equiv n$ .

§. 19. II. Si l'on tire 3 numeros, le cas est aussi actuellement résolu. Car nous savons le nombre des séquences rotales. Or il ne peut y en avoir ici que des binaires, & des ternaires. Mais les ternaires sont connues, puisque c'est la plus grande séquence que le tirage de 3 numeros peut fournir. Cette séquence est constante pour tous les tirages dans le sens de Mr. Bernoulli, & toujours égale au nombre total des numeros  $\equiv n$ . Car, si je conçois 20 arbres plantés en cercle, & que j'en choisisse un à volonté pour le commencement de la premiere séquence, soit binaire, ou ternaire &c. le second fera le commencement de la seconde séquence; le troisieme de la troisieme; & par conséquent le vingtieme & dernier, de la vingtieme & derniere. Dans le sens de M. Euler, cette séquence est toujours égale au nombre total des numeros  $n$ , moins le nombre des files, ou des numeros qu'on tire, diminué de l'unité. Car la plus grande séquence suppose toutes les files rangées en séquences, ou en échelons d'un nombre; il y aura donc précisément autant de rangs complets, que la premiere file contient d'individus, moins le nombre des files suivantes.

Voyons cependant l'usage de notre méthode aussi pour ce cas ci. Les trois files mises en séquences donnent au premier rang complet *Auguste Tibere Caligula*, au dernier *Domitien Nerva Trajan*. Cette position représente d'un coup d'oeil tous les ternaires possibles; car, dès qu'on dérangerait l'une des trois files, il n'y pourroit plus avoir de séquences ternaires: le nombre de ces séquences est donc égal à celui des rangs complets, & celui-ci à la longueur de la plus courte file; elle est dans ce cas  $\equiv n - 2$ . Donc, selon l'estimation de M. Euler, il y aura  $n - 2$  ternaires.

Mais, selon M. Bernoulli, les deux rangs incomplets doivent être complétés à l'aide de la révolution circulaire: on a donc encore les deux rangs *Nerva Trajan Auguste*, & *Trajan Auguste Tibere*, à ajouter à la somme  $n - 2$ , qui par là devient  $\equiv n$ .

Pour



Pour trouver maintenant les binaires, il n'y a qu'à hauffer la troisieme file encore d'un échelon. Alors chaque séquence binaire que forment les deux premieres files se combine avec tous les individus de la troisieme qui n'est plus que de  $n - 3$  nombres. Le premier rang sera *Auguste Tibere Claude*, le dernier *Tite Domitien Trajan*. Comme les deux premieres files doivent rester immobiles pour former séquence, elle ne font qu'un seul faisceau, & on doit les considérer ici comme une seule file qui se combine avec la troisieme. Cela revient donc au calcul des ambes, que nous avons expliqué ci-dessus, & la somme de ces binaires, pour  $n - 3$  rangs, sera

$$= \frac{(n - 3)}{1} \frac{(n - 2)}{2}.$$

Dans la supposition de M. Bernoulli, la premiere séquence *Auguste Tibere*, ne sauroit se combiner avec le *Trajan*, dernier de la troisieme file, parce que cela donneroit un ternaire: ainsi, par les principes expliqués ci-dessus, la somme des combinaisons binaires sera

$$\frac{(n - 4)}{1} \frac{(n - 3)}{2} + (n - 4) = \frac{(n - 1)}{2} \frac{(n - 4)}{2}.$$

Nous avons supposé les deux premieres files immobiles dans leur position de séquence, en faisant glisser la troisieme. Mais rien n'empêche qu'on ne doive pareillement faire mouvoir la premiere, en posant les deux dernieres immobiles en état de séquence: il suffit pour cet effet de hauffer d'un échelon la seconde file: le premier rang sera *Auguste Caligula Claude*, & le dernier, *Tite Nerva Trajan*, & comme d'ailleurs le même nombre de rangs & de faisceaux subsiste, il n'y a point de raison pourquoi le résultat devroit différer dans les séquences rectilignes. Cette combinaison, faite en sens contraire, donnera

donc encore  $\frac{(n - 3)}{1} \frac{(n - 2)}{2}$  binaires.

Mais



Mais dans les séquences circulaires il y a pour cette position une séquence de plus à ajouter, savoir celle de *Trajan Auguste*, qui se combine aussi par  $n - 4$  nombres, c. à d. depuis son correspondant *Domitien*, en remontant jusqu'à *Caligula* inclusivement, ce qui joint au nombre des cas binaires trouvé dans la première combinaison donne  $\frac{(n - 1)(n - 4)}{2} + (n - 4) = \frac{n(n - 4)}{2}$ .

Ainsi, si de  $n$  numéros on en tire 3 au hasard, il y aura dans le sens de Mr. Euler

$n - 2$  cas de ternaires,

&  $(n - 3)(n - 2)$  cas de binaires.

Dans le sens de Mr. Bernoulli, on aura

$n$  cas de séquences ternaires,

&  $n(n - 4)$  cas de binaires.

§. 20. III. Que l'on tire maintenant 4 numéros, c'est le cas de 4 files, qui placées d'abord toutes en échelons de séquence, donnent  $n - 3$  rangs complets. C'est donc là le nombre des séquences quaternaires suivant la méthode de M. Euler.

Complétant les rangs imparfaits en faveur des séquences circulaires, on aura dans cette supposition  $n$  quaternaires.

Pour trouver les ternaires, il faut concevoir les trois premières files fixées dans leur état de séquence, & hausser la quatrième d'un nombre, le premier rang sera *Auguste Tibère Caligula, Néron*.

On aura en tout  $n - 4$  rangs complets, & deux faisceaux à combiner: la somme de la progression naturelle qui exprime cette combinaison est par conséquent  $\frac{(n - 4)(n - 3)}{2}$ .





Selon M. Bernoulli, par les raisons qu'il feroit tédieux de répéter, elle doit être 
$$= \frac{(n-5)(n-4)}{2} + n-5 = \frac{(n-2)(n-5)}{2}.$$

Renversant ensuite le procédé, en mettant les 3 dernières files en séquence, pour les combiner collectivement avec la première; les données étant d'ailleurs les mêmes, le résultat le fera aussi: donc la somme des ternaires sera selon M. Euler  $= (n-4)(n-3)$ , selon M. Bernoulli, elle seroit par conséquent  $= (n-2)(n-5)$ . Mais, à cause des séquences circulaires, après le dernier rang qui est ici *Vespasien Domitien Nerva Trajan*, on doit encore ajouter les rangs des deux ternaires *Nerva Trajan Auguste*, & *Trajan Auguste Tibère*, qui se combinent chacun  $n-5$  fois; donc la somme des cas ternaires devient  $= n(n-5)$ . Reste à trouver les binaires, dans les deux suppositions. On peut à la vérité les avoir tout d'un coup, en soustraisant les séquences trouvées, de la somme des séquences totales. Mais cela n'éclairciroit pas la méthode d'y procéder. Concevons donc d'abord les 4 files posées deux à deux en séquences séparées: le premier rang fera donc *Auguste Tibère*, *Claude Neron*, & le dernier *Vespasien Tite*, *Nerva Trajan*, la plus courte file sera élevée par conséquent de 4 échelons au dessus de la première, ce qui donne  $n-4$  rangs complets. Puisque chaque paire de files est censée immobile, & ne composer qu'un seul tout, ce sont deux faisceaux à combiner. La somme des combinaisons sera donc 
$$= \frac{(n-4)(n-3)}{2},$$

& comme ici la raison suffisante du renversement cesse, puisqu'après le renversement nous n'aurions que les mêmes individus dans chaque rang, qui y sont actuellement; voilà déjà toutes les séquences doubles binaires possibles dans l'estimation de M. Euler.

Dans celle de M. Bernoulli, on aura pour  $n-5$  rangs, avec la répétition 
$$\frac{(n-5)(n-4)}{2}:$$
 puis ajoutons aux dernie-

res





res files la séquence *Trajan Auguste*, qui se combine aussi  $n - 5$  fois, le total sera  $= \frac{n(n-5)}{2}$ .

Laisant maintenant les deux premières files en séquence, la troisième doit rester dans sa position actuelle, car en la descendant d'un échelon elle formeroit les ternaires que nous avons déjà. C'est donc la quatrième file qui doit hauffer d'un cran, pour rompre la séquence qu'elle formoit avec la troisième. Nous n'avons donc plus que  $n - 5$  rangs complets, & 3 faisceaux ou files à combiner. C'est le cas des ternes. La progression des nombres triangulaires qui a lieu ici, donne la somme de ces combinaisons  $= \frac{(n-5)(n-4)(n-3)}{1. 2. 3}$ .

Mais cette opération peut se répéter 3 fois, car le faisceau des files en séquence, peut occuper la droite, la gauche & le milieu des deux files isolées. On aura, ou *Auguste-Tibère*, *Claude Galba*, ou *Auguste Caligula-Claude Galba*; ou *Auguste Caligula Néron-Galba*; & il n'y a point de raison d'exclure l'un ou l'autre de ces trois cas: il faut donc tripler le résultat qui donne la somme des simples binaires selon M. Euler  $= \frac{(n-5)(n-4)(n-3)}{1. 2}$ .

Dans le sens de M. Bernoulli on aura donc aussi 3 fois

$$\frac{(n-6)(n-5)(n-4)}{1. 2. 3} + \frac{(n-6)(n-5)}{1. 2}$$

Mais ce n'est pas tout; dans la troisième opération où le faisceau des séquences est à la droite, composé des deux plus courtes files, il faut encore ajouter la séquence circulaire *Trajan-Auguste*; qui se combine aussi avec  $n - 6$  rangs, ce qui donne  $\frac{(n-6)(n-5)}{1. 2}$ , à ajouter

à ce que dessus; la somme totale des binaires simples sera donc en



$$\begin{aligned} \text{ce fens} &= \frac{(n-6)(n-5)(n-4)}{1} + \frac{4(n-6)(n-5)}{2} \\ &= \frac{n(n-6)(n-5)}{1 \cdot 2} \end{aligned}$$

Résumons ces résultats.

Si de  $n$  numeros on en tire 4 au hazard, le nombre des cas possibles de séquences dans le fens ou M. Euler les prend fera

$n - 3$  séquences quaternaires,

$\frac{(n-3)(n-4)}{1}$  séquences ternaires,

$\frac{(n-3)(n-4)(n-4)}{1 \cdot 2}$  séquences binaires.

Dans le fens des séquences circulaires on a

$n$  séquences quaternaires,

$n(n-5)$  séquences ternaires,

$n(n-5)(n-5)$  séquences binaires.

§. 21. Expédions encore le cas d'un tirage de 5 numeros; & pour éviter la confusion, réservons les séquences circulaires, pour la méthode inverse de celle que j'ai suivie jusqu'ici.

I. Toutes les files en séquence donnent  $n - 4$  rangs complets, donc  $n - 4$  cas de séquences quaternaires.

II. Les 4 premières files en séquence de quaderne, & la dernière élevée d'un cran plus haut qu'elle n'étoit, donnent  $n - 5$  rangs complets, il n'y a ici que deux faisceaux; ainsi l'on a  $\frac{(n-5)(n-4)}{2}$  combinaisons, cette opération renversée en donne encore autant: donc en tout  $(n-5)(n-4)$  cas de séquences quaternaires.



III. A. Les trois premières files en séquence, & la quatrième élevée d'un échelon pour faire avec la cinquième une séquence binaire séparée, il y aura encore  $(n - 5)$  rangs complets: ce sont deux faisceaux à combiner, & l'opération peut se renverser en mettant le faisceau des binaires à gauche, & les ternaires à droite; on a donc deux fois  $\frac{(n - 5)(n - 4)}{2}$  combinaisons: donc  $(n - 5)(n - 4)$  cas de ternaires binaires.

B. Les trois premières files restant en séquence, & les deux autres hors de séquence en élevant la dernière d'un échelon de plus, donnent  $n - 6$  rangs à combiner, on a ici 3 faisceaux: c'est le cas des combinaisons de ternes; l'opération peut varier en trois manières, en faisant la séquence ternaire, à gauche, à droite, & au milieu des deux files isolées: on a donc en tout  $\frac{(n - 6)(n - 5)(n - 4)}{1. \quad 2}$  cas de ternaires simples.

IV. A. Les binaires ternaires sont déjà compris sous les ternaires.

B. Les doubles binaires peuvent exister en 3 façons. Car la file isolée peut être à gauche, à droite, ou au milieu des deux séquences: dans les trois cas il y a  $n - 6$  rangs, & 3 faisceaux à combiner; cela donne pour la triple combinaison  $\frac{(n - 6)(n - 5)(n - 4)}{1. \quad 2}$  cas de doubles binaires.

C. Enfin les simples binaires supposent 3 files élevées hors de séquence, & par conséquent  $n - 7$  rangs; dont le premier sera *Auguste Tibère, Claude, Galba, Vitellius*. Mais la séquence qui est ici à la gauche, peut aussi occuper la droite, ou les deux places intermédiaires, ce qui fait 4 dispositions différentes; & comme on a



4 faisceaux à combiner, cela donne en tout  $\frac{(n-7)(n-6)(n-5)(n-4)}{1. 2. 3}$  pour tous les cas de binaires simples.

§. 22. Cherchons encore ces mêmes résultats pour les séquences circulaires, toujours dans le cas de 5 files; & commençons par les séquences binaires.

I. A. Les binaires simples supposent  $n - 7$  rangs, 4 faisceaux à combiner, & 4 dispositions différentes; on a donc dans ce calcul-ci, 4 fois  $\frac{(n-8)(n-7)(n-6)(n-5)}{1. 2. 3. 4}$

$$+ \frac{(n-8)(n-7)(n-6)}{1. 2. 3} = \frac{(n-1)(n-8)(n-7)(n-6)}{1. 2. 3},$$

& lorsque la séquence est formée par les deux plus courtes files, il s'y joint encore celle de *Trajan Auguste*, qui combinée par  $n - 8$  rangs de 3 files donne  $\frac{(n-8)(n-7)(n-6)}{1. 2. 3}$ : donc la somme

$$\text{des cas de simples binaires est} = \frac{n(n-8)(n-7)(n-6)}{1. 2. 3}.$$

B. Les doubles binaires supposent  $n - 6$  rangs complets, & 3 transpositions des trois faisceaux, ce qui donne trois fois

$$\frac{(n-7)(n-6)(n-5)}{1. 2. 3} + \frac{(n-7)(n-6)}{1. 2} = \frac{(n-2)(n-7)(n-6)}{1. 2}.$$

Mais il y a deux dispositions où les deux dernières files sont en séquence, savoir lorsque la file isolée est à gauche, & lorsqu'elle se trouve au milieu des deux faisceaux; dans chacun de ces cas on a la séquence *Trajan Auguste* à ajouter, & à combiner avec  $n - 7$  rangs de deux files, ce qui donne  $\frac{2(n-7)(n-6)}{1. 2}$ : donc le total des cas de doubles bi-

$$\text{naires est} = \frac{n(n-7)(n-6)}{1. 2}.$$



II. A. Les ternaires simples sont représentés par le rang, *Auguste-Tibère-Caligula*, *Néron*, *Othon*, trois faisceaux, trois transpositions, &  $n - 6$  rangs; à quoi s'ajoute, lorsque le ternaire est aux dernières files, les deux ternaires, *Nerva-Trajan-Auguste*, *Trajan-Auguste-Tibère*, à combiner par deux files de  $n - 7$  rangs:

$$\text{la somme des ternaires simples doit donc être ici } \frac{(n-7)(n-6)(n-5)}{1. \quad 2} \\ + \frac{3(n-7)(n-6)}{1. \quad 2} + \frac{2(n-7)(n-6)}{1. \quad 2} = \frac{n(n-7)(n-6)}{1. \quad 2}.$$

B. Les ternaires binaires n'ont que deux positions, *Auguste-Tibère-Caligula*, *Néron Galba*, & *Auguste-Tibère*, *Claude Néron Galba*. Chacune à  $n - 5$  rangs, & par conséquent ici  $n - 6$  avec la répétition, il y a 2 faisceaux à combiner; dans la première position on doit ajouter la séquence binaire *Trajan Auguste*, & dans la seconde position les deux ternaires, *Nerva Trajan Auguste*, & *Trajan Auguste Tibère*: on a donc en tout,

$$(n-6)(n-5) + 2(n-6) + (n-6) + 2(n-6) = n(n-6).$$

III. Restent les quaternaires à trouver: C'est deux faisceaux à combiner par  $n - 5$  rangs complets, il n'y a non plus que deux positions différentes: quand le quaternaire est à la droite de la file isolée, il s'allonge des trois quaternaires, *Domitien-Nerva-Trajan-Auguste*, *Nerva-Trajan-Auguste-Tibère*, & *Trajan-Auguste-Tibère-Caligula*, qui se combinent avec  $n - 6$  rangs: le total des ces quaternaires est donc

$$(n-6)(n-5) + 2(n-6) + 3(n-6) = n(n-6).$$

V. Le nombre des quinares est  $= n$ , c'est ce qu'on fait déjà.



Résumant encore ces résultats; il consiste que si de  $n$  numeros, on en tire 5 au hazard, le nombre des cas possibles de séquences sera dans la supposition de M. Euler:

$$\begin{aligned}
 & n - 4 \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad \text{séquences quinaires,} \\
 & \frac{(n-4)(n-5)}{1} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad \text{séquences quaternaires.} \\
 & \frac{(n-4)(n-4)(n-5)}{1. \quad 2} \quad . \quad . \quad . \quad \text{séquences ternaires,} \\
 & \frac{(n-4)(n-4)(n-5)(n-6)}{1. \quad 2. \quad 3} \quad . \quad \text{séquences binaires.}
 \end{aligned}$$

Et dans le sens de M. Bernoulli.

$$\begin{aligned}
 & n \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad \text{séquences quinaires} \\
 & \frac{n(n-6)}{1} \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad \text{séquences quaternaires.} \\
 & \frac{n(n-5)(n-6)}{1. \quad 2} \quad . \quad . \quad . \quad \text{séquences ternaires,} \\
 & \frac{n(n-5)(n-6)(n-7)}{1. \quad 2. \quad 3} \quad . \quad \text{séquences binaires.}
 \end{aligned}$$

Ce Mémoire étant déjà trop étendu, je réserve pour le suivant les formules du Probleme général, & les observations curieuses qui en résultent.





S U R  
**LES SUITES OU SÉQUENCES**  
 D A N S  
 LA LOTTERIE DE GENES.  
 S E C O N D M É M O I R E.

---

§. 1.

**J'**ai dit dans mon premier Mémoire sur ce sujet, qu'il étoit indifférent en suivant ma méthode de débiter par la Solution du Problème général, ou par celle des cas particuliers. C'est-ce que je me propose de prouver aujourd'hui par la recherche des deux formules générales pour toutes les espèces de séquences quelconques, prises dans les deux sens différens sous lesquels Mrs. Euler & Bernoulli les ont envisagées. Mais ce que je me propose principalement ici, & ce que je crois plus important que la découverte de ces formules, c'est de montrer l'utilité des principes métaphysiques dans l'emploi des calculs de l'algèbre, & de donner un échantillon de la Philosophie spéculative appliquée à l'analyse.

§. 2. Qu'est-ce que l'on cherche lorsqu'on veut parvenir en algèbre à une formule générale? C'est de trouver une règle qui puisse servir à décider tous les cas particuliers qu'elle doit renfermer; de même qu'en Jurisprudence une loi générale sur la manière de succéder, par exemple, doit s'appliquer à tous les cas de succession qui se présentent tous les jours à décider dans un État.

Les lois se forment, ou de l'induction des cas particuliers, c'est ce qu'on nomme en droit civil la Jurisprudence des arrêts, ou bien le législateur tire ces lois de la nature même de l'objet général qu'elles concernent; on trouve dans le droit romain des exemples fré-





quens de l'une & de l'autre espece de ces loix. Toutes les diverses branches des sciences nous en offrent également des deux sortes; mais presque dans toutes, la premiere espece est celle qu'on rencontre le plus souvent. La Médecine, l'Astronomie, la Physique, la Chymie, la Botanique, ne sont devenues des sciences qu'à force de comparer des observations individuelles, & d'en former des regles plus ou moins générales, à proportion du nombre plus ou moins grand de cas particuliers auxquels ces loix sont applicables. La Philosophie spéculative, & la Géométrie ont en commun le double avantage de remonter des cas individuels aux loix générales, & de voir dans les notions générales, les loix qui conviennent à chaque individu renfermé sous ces notions.

§. 3. Soit que l'on remonte du particulier au général, ou que l'on descende du général au particulier; le passage de l'un à l'autre est fondé sur le principe de la raison suffisante, & de l'analogie qui n'est qu'une application répétée de ce principe. Pourquoi concluons-nous du particulier au général? si notre conclusion est légitime, ce n'est que parce que la même raison qui décide l'état d'un cas individuel, décide également de l'état de tous les autres. Ce n'est qu'autant que les divers cas particuliers sont déterminés par un même principe, que nous les pouvons ranger sous une même regle générale.

Pourquoi concluons-nous du général au particulier? C'est parce que nous voyons que la raison de la détermination générale doit être commune à tous les individus. Ce n'est qu'autant que les sujets individuels ont, nonobstant leur diversité, quelque qualité commune à tous, qu'ils peuvent être soumis à une même & seule loi.

§. 4. Appliquons cette théorie aux séquences. Qu'ont-elles de commun? C'est d'être des suites de 2 ou de plusieurs nombres consécutifs. En quoi peuvent elles différer? C'est d'être d'une seule ou de plusieurs espèces à la fois, par exemple, ou composées de *quinaires* seuls, ou composées à la fois de *quinaires*, & de *ternaires*, & de telle autre espece qu'on voudra. La premiere espece renferme donc toutes



toutes les *séquences homogènes*, & la seconde toutes les *séquences mixtes*. Chacune de ces deux espèces peut encore être ou *simple*, ou *multiple*; c. à d. répétée plusieurs fois: une *séquence simple*, sera par exemple un *quinnaire*, ou un *quinnaire binaire*; une *séquence multiple*, sera par exemple un *triple quinnaire*, ou un *double quinnaire* accompagné d'un *triple binaire*.

§. 5. Toutes les *séquences* possibles sont évidemment comprises sous l'une de ces quatre classes. Mais, pour leur prescrire une règle unique, il faut réduire ces quatre classes à une seule qui les renferme toutes; sans cela il faudra autant de règles différentes, qu'il y aura de classes irréductibles.

Or nous ne saurions ranger les *séquences multiples*, dans la classe des *séquences simples*, car le simple ne sauroit contenir ce qui ne l'est pas. Mais nous pouvons très bien ranger les *séquences simples* sous la classe des multiples. Car la multiplicité n'est qu'une simplicité ou unité prise un certain nombre de fois; & puisque ce nombre n'est point déterminé, il peut être aussi bien 1, ce qui est le cas des *séquences simples*, que 2, 3, 4, &c. ce qui est le cas des *séquences multiples*. Voilà donc nos quatre classes réduites à deux; savoir aux *séquences multiples homogènes*, & aux *séquences multiples mixtes*. Or les *mixtes* ne sauroient être contenues sous les *homogènes*, car ce qui est homogène ne sauroit être *mixte*. Mais le mixte peut très bien représenter l'homogène, car la *mixture* peut aussi bien être le mélange de *séquences homogènes*, que celui de *séquences hétérogènes*. Si donc nous trouvons la formule des *séquences multiples mixtes*, nous aurons la loi générale de toutes les espèces de *séquences*.

§. 6. Or le nombre des cas d'une *séquence* quelconque dépend du nombre des combinaisons des files par les rangs complets, & des transpositions différentes dont chaque combinaison est susceptible; & il ne sauroit dépendre que de ces deux éléments. Ainsi, si nous nommons le nombre des combinaisons C, & le nombre des transpositions



diverses que chaque combinaison peut avoir  $T$ , la formule générale des cas de séquences sera  $\equiv T \times C$ .

§. 7. Mais quels sont les éléments qui déterminent le nombre des combinaisons? Ce sont la quantité des rangs, & celle des files à combiner. Nommant donc le nombre des rangs  $R$ , & celui des faisceaux à combiner  $F$ ;  $\frac{(R) (R + 1) \dots (R + F - 1)}{1. 2 \dots F}$ , exprimera plus précisément, ce que  $C$  exprimait d'une manière plus vague; & substituant l'expression plus précise à l'autre, notre formule devient  $\equiv T \times \frac{(R) (R + 1) (\dots) (R + F - 1)}{1. 2 \dots F}$ .

§. 8. Chacun de ces deux éléments,  $R$ ,  $F$ , a de nouvelles parties intégrantes qui constituent son tout; & c'est ici où la formule qui jusqu'à présent concerne également les séquences de M. Euler, & celles de M. Bernoulli, doit se séparer en deux formes différentes, parce que le nombre des rangs diffère dans ces deux manières d'évaluer les cas des mêmes séquences. Je déterminerai d'abord la formule dans le sens de M. Euler.

Le nombre des rangs  $R$ , est ici égal à la longueur de la dernière file, comme on l'a vu dans mon premier Mémoire. Or cette dernière file est égale à la longueur de la première  $n$ , moins le raccourcissement qui résulte de l'arrangement des files suivantes mises en séquence, ou hors de séquence, c. à d. du nombre d'échelons  $E$ , dont chaque file surpasse la précédente: on peut donc substituer à  $R$ , qui marquoit les rangs complets, l'expression  $n - E$ , & la formule devient  $\equiv T \frac{(n - E) (n - E + 1) (\dots) (n - E + F - 1)}{1. 2. 3 \dots F}$ .

§. 9. Nous voici arrivés à un élément  $n$ , qui n'est plus susceptible de décomposition; car puisqu'il marque le nombre total des numéros de la lotterie, ou la longueur totale de chaque file, on  
ne



ne sauroit le déterminer plus précisément sans le rendre un nombre individuel, & sans restreindre par conséquent la formule à ne servir de règle que pour une lotterie d'un nombre déterminé de numeros.

§. 10. L'autre élément E, qui désigne le nombre des échelons dont chaque file surpasse la précédente, est déterminé par le nombre des séquences joint à celui des files isolées; les files en séquences ne peuvent s'élever l'une sur l'autre, que d'un seul échelon; les files isolées doivent s'élever de deux, pour être hors de séquence; & pareillement les faisceaux des diverses séquences s'élevant de deux échelons, sans quoi ils ne formeroient qu'une seule séquence plus nombreuse. Donc, nommant  $t$  le nombre des files, il est clair que si elles étoient toutes isolées hors de séquence, E seroit le double de  $t - 1$ . Car la première file n'a point d'élévation. Mais, puisqu'il y a des séquences, il faut retrancher pour chaque séquence autant d'échelons que la séquence contient de files, moins la première, qui excède de deux crans le faisceau précédent. Or les séquences mixtes dont nous cherchons ici la formule, peuvent contenir toutes les espèces de séquences, depuis la plus nombreuse que j'appellerai S, jusqu'à la moins nombreuse qui est le binaire 2. Ainsi la séquence mixte est représentée par la progression arithmétique descendante

$$S + S - 1 + S - 2 + \dots + 2.$$

Ce n'est pas tout, notre formule doit contenir les multiples de chacune de ces séquences, car chacune d'elle peut être répétée plus ou moins de fois, nous nommerons donc M, le nombre qui exprime la répétition d'une séquence, en nous souvenant que ce nombre peut être le même pour chaque séquence, & qu'il peut aussi varier d'une séquence à l'autre en plus & en moins, au moyen de quoi l'expression des séquences mixtes multiples sera

$$SM + (S - 1)M + (S - 2)M + \dots + 2M,$$

& par conséquent l'expression plus déterminée, à substituer à E, sera

$$= 2t - 2 - (S - 1)M - (S - 2)M - \dots - M,$$



par cette substitution l'expression des rangs complets devient

$$R = n - 2t + 2 + (S-1)M + (S-2)M + \dots + M,$$

Et comme elle est réduite à quatre élémens  $n$ ,  $t$ ,  $S$ ,  $M$ , qui ne peuvent plus recevoir de décomposition ultérieure, sans y substituer les nombres individuels qu'ils représentent, elle a toute la précision dont elle est susceptible. Mais, pour l'abréger, posant  $n - 2t + 2 = N$ , & la progression arithmétique  $S - 1 + S - 2 + S - 3 + \dots + 1 = P$ , on aura  $R = N + PM$ , & par conséquent la formule cherchée

$$\text{devient } \frac{T(N+PM)(N+PM+1)(\dots)(N+PM+F-1)}{1. \quad 2. \quad \dots \quad (F-1)}.$$

§. 11. Cherchons maintenant, pour achever l'article des combinaisons, à nous faire une idée plus précise de l'expression  $F$ , qui désigne le nombre des faisceaux à combiner. Or ce nombre est composé de celui des séquences multiples mixtes, & de celui des files isolées qui ne forment point de séquence. Mais nous venons de voir que le nombre des séquences multiples s'exprime par  $M$ , & si nous nommons celui des files isolées  $I$ , nous aurons pour  $F$ , l'expression moins vague  $M + I$ .

§. 12. Le terme  $I$  est susceptible encore d'une plus grande précision, car il y aura toujours autant de files isolées, qu'il y a de files en tout, moins les files employées à former des séquences, le nombre de ces dernières est exprimé par la progression  $SM + (S-1)M + \dots + 2M$ , ou comme nous venons de l'abréger par  $(P+1)M$ , & le nombre total des files étant  $t$ , on peut substituer à l'expression  $I$  celle-ci  $t - (P+1)M$ , & alors on a  $F = t - PM$ , dont tous les élémens sont aussi simples & aussi déterminés qu'ils peuvent l'être. Ainsi notre formule qui d'abord étoit  $T \times C$ , est présentement

$$T \frac{(N+PM)(N+PM+1)(\dots)(N+t-1)}{1. \quad 2. \quad \dots \quad (t-PM)},$$

dans



dans laquelle il ne reste plus, qu'à apprécier plus clairement les transpositions T.

§. 13. Les regles des transpositions sont connues & faciles à trouver; *une* chose n'a qu'une position, *deux* choses peuvent être transposées de *deux* façons; *trois* choses de 2 fois *trois* façons, *quatre* choses de 2 fois 3 fois *quatre* façons, & ainsi de suite. Si parmi les choses à transposer il y en a deux de semblables, leur transposition ne donneroit aucun résultat différent; il faut donc diviser le produit par 2; s'il y en a 3 semblables, le produit se divisera par 2 fois *trois* &c.

Cela supposé connu, quelle sera la transposition de chaque rang composé de séquences mixtes multiples, & de files isolées? Ce sera le produit des nombres naturels jusqu'à celui qui exprime la somme des choses à transposer contenue dans ce rang divisé par le produit de ces mêmes nombres naturels pour chaque chose qui ne sera pas susceptible de transposition. Ainsi T doit être exprimé par une fraction, dont nous nommerons le dénominateur D, & le numérateur est 1. 2. 3 (. . .) F, & substituant pour F son expression précise que nous venons de déterminer, on aura

$$T = \frac{1. 2. 3 . . . (t - PM)}{1. 2 . . . . D}.$$

§. 14. Le dénominateur D représente les choses qui ne sont pas susceptibles de transpositions; or ces choses ce sont 1°. les multiples de chaque espece particuliere de séquences, qui entr'eux ne se peuvent pas transposer, quoiqu'ils se transposent fort bien avec les séquences d'une autre espece, & avec les files isolées. 2°. Ces mêmes files isolées, qui entr'elles ne se transposent point, quoiqu'elles se transposent très bien avec les séquences. On peut donc substituer à D, son expression précise M, pour les multiples des séquences, &





$t - (P + 1) M$ : pour les files isolées, & alors nous aurons la formule que nous cherchions dans toute sa précision,

$$\frac{1.2.3(\dots)(t-PM)}{(1.2\dots(t-(P+1)M)(1.2\dots M)} \frac{(N+PM)(N+PM+1)(\dots)(n-t+1)}{1.2\dots(t-PM)}$$

§. 15. Si l'on veut confondre les transpositions avec les combinaisons, on pourra effacer de la formule le numérateur entier des transpositions, & le dénominateur entier des combinaisons, & la règle générale deviendra

$$= \frac{(N + PM) (N + PM + 1) (\dots) (n - t + 1)}{(1.2\dots(t - (P + 1) M) (1.2\dots M)}.$$

§. 16. Mais, en conservant pour la régularité du développement chaque élément en sa nature, on peut retrancher des transpositions tous les facteurs qui se détruisent mutuellement, & alors la formule générale pour les séquences quelconques dans le sens de M. Euler est

$$\frac{(t - (P + 1) M + 1) (t - (P + 1) M + 2) (\dots) (t - PM)}{(1.2\dots M)} \times \frac{(N + PM) (N + PM + 1) (\dots) (n - t + 1)}{1.2\dots(t - PM)}.$$

§. 17. Il ne fera pas mal aisé de transformer cette formule en celle qui donnera tous les cas de séquence quelconque dans le sens de M. Bernoulli.

Les combinaisons ne diffèrent, comme je l'ai montré dans mon premier Mémoire, qu'en deux articles. 1°. qu'à égal nombre de files il y a toujours un rang de moins, avec la répétition du plus grand terme, de sorte que, quand la formule pour les séquences de M. Euler est

$$T \frac{(R) (R + 1) (\dots) (R + F - 1)}{1.2\dots F}, \text{ celle de}$$

M. Bernoulli sera à cet égard,

$$T \frac{(R-1)(R)(R+1)(\dots)(R+F-2)}{1.2.3.(\dots)(F)} + T \frac{(R-1)(R)(\dots)(R+F-3)}{1.2.(\dots)(F-1)},$$

qui





qui réduite à un même dénominateur est,

$$T \frac{(R + 2F - 2)}{1.} \frac{(R - 1)}{2.} (R) \frac{(R + 1)}{3.} (\dots) \frac{(R + F - 3)}{F},$$

& comme les transpositions sont ici les mêmes, il n'y a rien à changer à l'expression trouvée pour T.

§ 18. 2°. Le second article en quoi les deux méthodes diffèrent, c'est que dans celle de M. Bernoulli, toutes les fois que les séquences occupent les plus courtes files, où par conséquent se trouvent les derniers numeros, le nombre de ces séquences est augmenté d'un pour les *binaires*, de 2 pour les *ternaires*, & en général de  $S - 1$ , pour la séquence quelconque S, & par conséquent aussi de P, pour toutes les séquences mixtes quelconques, ce qui donne autant de combinaisons à ajouter, de  $R - 1$  rangs, par  $F - 1$  faisceaux: cette addition à la formule sera donc

$$+ T' \times P \frac{(R - 1)}{1.} \frac{(R)}{2.} \frac{(R + 1)}{3.} (\dots) \frac{(R + F - 3)}{(F - 1)}.$$

§. 19. Reste à déterminer la valeur de la transposition T'. On voit bien qu'elle n'est pas la même que nous avons déjà appréciée; mais il est aisé d'apercevoir en quoi elle diffère. La séquence que nous combinons ici est fixée à cette dernière place, par conséquent elle ne se transpose pas; il y a donc une chose de moins à transposer, ce qui retranche le plus grand facteur du numérateur de T: par la même raison il faut retrancher du dénominateur, le facteur M qui est le multiple de cette séquence; ainsi la transposition, en laissant subsister

l'ancienne valeur de T, doit être  $\frac{T M}{F}$ , & l'addition à faire sera

$$\frac{T \times PM}{F} \frac{(R - 1)}{1.} \frac{(R)}{2.} \frac{(R + 1)}{3.} (\dots) \frac{(R + F - 3)}{(F - 1)},$$



ce qui joint réellement, & mis sous un même dénominateur, donne la formule générale,

$$\frac{(T \times (R + PM + 2F - 2)(R - 1)(R)(R + 1)(\dots)(R + F - 3))}{1. \quad 2. \quad 3 \quad . \quad . \quad . \quad F},$$

& substituant à T, R, & F, leurs expressions plus précises que nous avons déterminées (§. 10. 12. 16) cette formule devient

$$\frac{(t - (P + 1)M + 1)(t - (P + 1)M + 2)(\dots)(t - PM)}{(1. \quad 2 \quad . \quad . \quad M)} \times$$

$$\frac{(n)(N + PM - 1)(N + PM)(\dots)(n - t - 1)}{1. \quad 2. \quad 3 \quad . \quad . \quad . \quad (t - PM)}.$$

Ou, si nous voulons confondre les transpositions avec les combinaisons, elle sera dans cette forme plus concise,

$$\frac{n(N + PM - 1)(N + PM)(\dots)(n - t - 1)}{(1. \quad 2 \quad . \quad . \quad (t - (P + 1)M)(1. \quad 2 \quad . \quad . \quad M)}.$$

§. 20. Reste à montrer l'application de ces formules à des cas particuliers.

Que le nombre total des numéros de la lotterie soit toujours  $n$ , & qu'à chaque tirage on en tire 7, on demande combien il y aura de cas possibles pour chaque espèce de séquences, prises dans le sens de Mr. Euler.

La formule générale pour ces séquences (§. 16) devient, en substituant 7 à  $t$ , &  $n - 12$  à  $N$ ,

$$\frac{(8 - (P + 1)M)(9 - (P + 1)M)(\dots)(7 - PM)}{(1. \quad 2 \quad . \quad . \quad M)} \times$$

$$\frac{(n - 12 + PM)(n - 11 + PM)(\dots)(n - 6)}{1. \quad 2 \quad . \quad . \quad . \quad (7 - PM)}.$$

I. Pour



I. Pour les séquences homogènes *simples* on a  $M = 1$ .

a, pour les VII<sup>naires</sup>  $P = S - 1 = 6$ , ce qui donne  $\frac{1}{1} \times \frac{n-6}{1}$ ,

b, pour les VI<sup>naires</sup>  $P = 5$ , ce qui donne  $\frac{2}{1} \times \frac{(n-7)}{1} \frac{(n-6)}{2}$ ,

c, pour les V<sup>naires</sup>  $P = 4$ , ce qui donne  $\frac{3}{1} \times \frac{(n-8)}{1} \frac{(n-7)}{2} \frac{(n-6)}{3}$ ,

d, pour les IV<sup>naires</sup>  $P = 3$ , ce qui donne  $\frac{4}{1} \times \frac{(n-9)}{1} \frac{(n-8)}{2} \frac{(n-7)}{3} \frac{(n-6)}{4}$ ,

e, pour les III<sup>naires</sup>  $P = 2$ , ce qui donne

$$\frac{5}{1} \times \frac{(n-10)}{1} \frac{(n-9)}{2} \frac{(n-8)}{3} \frac{(n-7)}{4} \frac{(n-6)}{5},$$

f, pour les II<sup>naires</sup>  $P = 1$ , ce qui donne

$$\frac{6}{1} \times \frac{(n-11)}{1} \frac{(n-10)}{2} \frac{(n-9)}{3} \frac{(n-8)}{4} \frac{(n-7)}{5} \frac{(n-6)}{6}.$$

II. Pour les séquences homogènes *multiplés*

a, pour les *doubles*, on a  $M = 2$ ,

Les ternaires doubles;  $P = 2$ , ce qui donne

$$\frac{2.3}{1.2} \times \frac{(n-8)}{1} \frac{(n-7)}{2} \frac{(n-6)}{3}.$$

Les II<sup>naires</sup> doubles;  $P = 1$ , ce qui donne

$$\frac{4.5}{1.2} \times \frac{(n-10)}{1} \frac{(n-9)}{2} \frac{(n-8)}{3} \frac{(n-7)}{4} \frac{(n-6)}{5}.$$

b. pour les *triples*, on a  $M = 3$ .

Les II<sup>naires</sup> triples,  $P = 1$ , ce qui donne

$$\frac{2.3.4}{1.2.3} \times \frac{(n-9)}{1} \frac{(n-8)}{2} \frac{(n-7)}{3} \frac{(n-6)}{4},$$

LI 2

III.



III. Pour les *séquences mixtes simples*,

on a  $M = 1$ .

a, pour les  $V^n + II^n$ , on a  $\left. \begin{array}{l} P = 4 + 1 = 5 \\ (P + 1) = 5 + 2 = 7 \end{array} \right\}$  ce qui

$$\text{donne, } \frac{1.2}{1} \frac{(n-7)(n-6)}{1.2}.$$

b, pour les  $IV^n + III^n$ , on a  $\left. \begin{array}{l} P = 3 + 2 = 5 \\ (P + 1) = 4 + 3 = 7 \end{array} \right\}$  ce qui

$$\text{donne, } \frac{1.2}{1} \frac{(n-7)(n-6)}{1.2},$$

c, pour les  $IV^n + II$ , on a  $\left. \begin{array}{l} P = 3 + 1 = 4 \\ (P + 1) = 4 + 2 = 6 \end{array} \right\}$  ce qui

$$\text{donne } \frac{2.3}{1} \frac{(n-8)(n-7)(n-6)}{1.2.3}.$$

d, pour les séquences de  $III + II$ , on a  $\left. \begin{array}{l} P = 2 + 1 = 3 \\ (P + 1) = 3 + 2 = 5 \end{array} \right\}$

$$\text{ce qui donne } \frac{3.4}{1} \frac{(n-9)(n-8)(n-7)(n-6)}{1.2.3.4}.$$

IV. Pour les *séquences mixtes multiples*.

a, les doubles, on aura  $M = 2$ ;  $M = 1$ .

pour les séquences  $III + II + II$ , on a  $P = 2$ ,  $P = 1$ ,

$$\begin{array}{l} PM = 2 \times 1 + 1 \times 2 = 4 \\ (P+1)M = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7, \end{array} \text{ ce qui donne } \frac{1.2.3}{1.1.2} \times \frac{(n-8)(n-7)(n-6)}{1.2.3}.$$

§. 21. Puisque le développement de la formule pour les séquences circulaires seroit parfaitement semblable, il seroit bien superflu d'en montrer ici l'application. Mais ce qui mérite d'être observé,

&



& qui fournit un paradoxe assez singulier c'est que le développement de ces formules montre qu'on peut entièrement s'en passer & qu'en observant un certain ordre on peut écrire tout de suite les nombres des transpositions, & des combinaisons de chaque espèce de séquence, grâces à l'harmonie exacte qui régné entr'elles.

C'est ce que je vai montrer en cherchant les séquences dans le sens de M. Bernoulli pour un tirage de 7 numeros.

### I. Les séquences simples.

$$a, \text{ séquences de VII. } \dots \frac{1}{1} \times \frac{n}{1},$$

$$b, \text{ séquences de VI. } \dots \frac{2}{1} \times \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2},$$

$$c, \text{ donc séquences de V. } \dots \frac{3}{1} \times \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3},$$

$$d, \text{ donc séquences de IV. } \dots \frac{4}{1} \times \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4},$$

$$e, \text{ donc séquences de III. } \dots \frac{5}{1} \times \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5},$$

$$f, \text{ donc séquences de II. } \dots \frac{6}{1} \times \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)(n-5)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6}.$$

Or toutes les combinaisons des séquences mixtes sont contenues dans les limites des combinaisons des séquences simples, & n'iront ni jusqu'à la plus grande ni jusqu'au binaire; elles seront précisément égales à la combinaison de la séquence simple qui a le même nombre de faisceaux à combiner.

Ainsi la séquence simple de 5 nombres, & les séquences mixtes, ou multiples de 4 + 2, de 3 + 3, de 3 + 2 + 2, auront précisément la même combinaison. Les combinaisons des séquen-



ces 5 + 2; 4 + 3, sont les mêmes que celle de la séquence simple 6, &c.

Les transpositions des séquences mixtes multiples sont celle de la séquence simple correspondante multipliée par celles des supérieures autant qu'il y a de séquences mixtes, ou multiples, & divisée par le produit des nombres de cette multiplicité.

Donc

II On a les séquences homogènes multiples.

$$\begin{aligned}
 a, \text{ séquences de III + III} & \dots \frac{2 \cdot 3}{1 \cdot 2} \cdot \frac{(n)(n-9)(n-8)}{1 \cdot 2 \cdot 3}, \\
 b, \text{ séquences de II + II} & \dots \frac{4 \cdot 5}{1 \cdot 2} \cdot \frac{n(n-11)(n-10)(n-9)(n-8)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}, \\
 c, \text{ séquences de II + II + II} & \dots \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{n(n-10)(n-9)(n-8)}{1 \cdot 2 \cdot 3}.
 \end{aligned}$$

Donc encore on a

III. Les séquences mixtes simples.

$$\begin{aligned}
 a, \text{ les séquences V + II} & \dots \frac{1 \cdot 2}{1} \cdot \frac{(n)(n-8)}{1 \cdot 2}, \\
 b, \text{ les séquences de IV + III} & \dots \frac{1 \cdot 2}{1} \cdot \frac{n(n-8)}{1 \cdot 2}, \\
 c, \text{ les séquences de IV + II} & \dots \frac{2 \cdot 3}{1} \cdot \frac{n(n-9)(n-8)}{1 \cdot 2 \cdot 3}, \\
 d, \text{ les séquences de III + II} & \dots \frac{3 \cdot 4}{1} \cdot \frac{n(n-10)(n-9)(n-8)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4},
 \end{aligned}$$

Donc



Donc enfin on a

IV. les *séquences mixtes multiples*.

$$\text{de III} \vdash \text{II} \vdash \text{II} \dots \frac{1.2.3}{1.2} \frac{n(n-9)(n-8)}{1.2.3}.$$

§. 22. Cette affinité des séquences entr'elles, & la manière de les déduire les unes des autres seroit encore plus sensible, si nous avions conservé la fraction qui exprime les transpositions dans sa forme originale (§. 14), où le numérateur exprime tous les facteurs depuis 1 jusqu'au nombre total des faisceaux ou des choses à combiner, & où le dénominateur contient tous les facteurs depuis 1 jusqu'au nombre des files isolées, & jusqu'à celui de chaque multiple des séquences.

Cherchons, par exemple, de cette manière toutes les espèces de séquences dans le sens de M. Bernoulli, pour un tirage de 5 numéros.

I. Les *séquences simples*

$$\text{de V. feront } \frac{1}{1} \times \frac{n}{1},$$

$$\text{de IV} \dots \frac{1.2}{1.1} \times \frac{n(n-6)}{1.2},$$

$$\text{de III} \dots \frac{1.2.3}{1.2.1} \times \frac{n(n-7)(n-6)}{1.2.3},$$

$$\text{de II} \dots \frac{1.2.3.4}{1.2.3.1} \times \frac{n(n-8)(n-7)(n-6)}{1.2.3.4}.$$

II. Les *séquences homogènes multiples*,

$$\text{de II} \vdash \text{II} \dots \frac{1.2.3}{1.1.2} \frac{n(n-7)(n-6)}{1.2.3}.$$

III.





### III. Les séquences mixtes

$$\text{de III} \div \text{II} . . . \frac{1. 2}{1. 1} \quad \frac{n (n - 6)}{1. 2},$$

§. 23. Enfin cette même affinité subsiste encore dans les séquences développées sur les formules abrégées, (§. 15. 19.) qui ne conservent que le numérateur des combinaisons, & le dénominateur des transpositions. C'est-ce que je vai montrer en deduisant les cas de toutes les séquences pour la Lotterie de Gènes; dans le sens de Mr. Bernoulli.

I. *a*, Les plus hautes *séquences simples* sont les quinaires donc

$$\text{il y en a} . . . . . \frac{90}{1},$$

$$b, \text{ Des quaternaires} . . . . . \frac{90. 84}{1. 1},$$

$$c, \text{ les ternaires} . . . . . \frac{90. 83. 84}{1. 2. 1},$$

$$d, \text{ les binaires} . . . . . \frac{90. 82. 83. 84}{1. 2. 3. 1}.$$

$$\text{II. les doubles binaires} . . . . . \frac{90. 83. 84}{1. 2. 1}.$$

$$\text{III. Les ternio-binaires} . . . . . \frac{90. 84}{1. 1}.$$

Comme le nombre total des combinaisons d'un tirage de 5 numeros est  $\frac{90. 89. 88. 87. 86}{1. 2. 3. 4. 5},$



$$\begin{aligned}
 \text{La probabilité des séquences quinaires est} &= \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}, \\
 \text{des quaternaires} &= \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 84}{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}, \\
 \text{des ternaires simples} &= \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 83 \cdot 84}{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}, \\
 \text{des binaires simples} &= \frac{4 \cdot 5 \cdot 82 \cdot 83 \cdot 84}{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}, \\
 \text{des doubles binaires} &= \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 83 \cdot 84}{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}, \\
 \text{des ternio-binaires} &= \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 84}{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86},
 \end{aligned}$$

Or c'est la somme des probabilités de ces 6 espèces différentes de séquences, que M. Bernoulli a calculée sous le nom de séquences binaires. Mais, si l'on veut tenir compte, & admettre des mises sur toutes les séquences inférieures qui résultent des supérieures, comme chaque séquence supérieure renferme autant d'inférieures, qu'il y a de différence dans leur nombre, & une au delà, que, par exemple, le quinaire contient 2 quaternaires, 3 ternaires, 4 binaires, on aura

$$\begin{aligned}
 \text{Probabilité de séquence quinaire} & \frac{1 \cdot 120}{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}, \\
 \text{de séquence quaternaire} & \frac{2 \cdot 120 + 1 \cdot 120 \cdot 84}{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}, \\
 \text{de séquence ternaire} & \frac{3 \cdot 120 + 3 \cdot 120 \cdot 84 + 1 \cdot 60 \cdot 83 \cdot 84}{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}, \\
 \text{de séquence binaire} & \frac{4 \cdot 120 + 6 \cdot 120 \cdot 84 + 4 \cdot 60 \cdot 83 \cdot 84 + 1 \cdot 20 \cdot 82 \cdot 83 \cdot 84}{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}.
 \end{aligned}$$



D'où l'on voit que la somme des seules séquences binaires est beaucoup plus grande que la somme des six espèces des séquences séparées.

§. 24. Pour montrer encore par un seul exemple l'ordre frappant qui régné dans les cas de diverses séquences, & la facilité de les déduire toutes d'un même principe, je vais développer le cas d'un tirage de 6 numéros dans le sens de M. Euler

### I. La séquence simple

de 6 n'a qu'une chose à combiner . .  $\frac{n-5}{1}$ ,

1 séquence

de 5, a 2 faisceaux . .  $\frac{(n-6)(n-5)}{1.1}$ ,

1 séquence, 1 file isolée.

de 4, a 3 faisceaux . .  $\frac{(n-7)(n-6)(n-5)}{1.1.2}$ ,

une séquence, 2 files isolées.

de 3, a 4 faisceaux . .  $\frac{(n-8)(n-7)(n-6)(n-5)}{1.1.2.3}$ ,

1 séquence, 3 files isolées.

de 2, a 5 faisceaux . .  $\frac{(n-9)(n-8)(n-7)(n-6)(n-5)}{1.1.2.3.4}$ .

1 séquence, 4 files isolées.



## II. Les séquences homogènes multiples

de  $2 + 2$ , a 4 faisceaux . . .  $\frac{(n-8)(n-7)(n-6)(n-5)}{1. 2. 1. 2}$ ,  
2 séquences, 2 files isolées.

de  $2 + 2 + 2$ , a 3 faisceaux . . .  $\frac{(n-7)(n-6)(n-5)}{1. 2. 3}$ ,  
3 séquences homogènes.

de  $3 + 3$ , a 2 faisceaux . . .  $\frac{(n-6)(n-5)}{1. 2}$ .  
2 séquences homogènes.

## III. Les séquences mixtes

celle de  $3 + 2$ , a 3 faisceaux . . .  $\frac{(n-7)(n-6)(n-5)}{1. 1. 1}$ ,  
1 séquence de 3, 1 séquence de 2, 1 file isolée.

celle de  $4 + 2$ , a 2 faisceaux . . .  $\frac{(n-6)(n-5)}{1. 1}$ ,  
1 séquence de 4, 1 séquence de 2,

§. 25. Ce seroit s'appesantir sur ce sujet, que de montrer tous les rapports qu'on y peut observer. J'ai eu beaucoup moins en vue la solution du problème, que d'indiquer une méthode lumineuse d'y procéder qui conservât l'ordre dans les résultats, & qui montrât l'application des principes de la Philosophie spéculative aux questions de calcul.

C'est par cette considération qu'après avoir fait voir comment dans les notions générales on doit démêler les règles qui conviennent aux notions moins générales, & aux individuelles, je vai montrer par la route opposée de quelle maniere il faut s'élever de la connoissance des déterminations individuelles d'un cas singulier, à la connoissance des loix générales de toutes les diverses especes, & de tous les genres sous lesquels ce cas singulier est contenu.



Choisissons pour cet effet l'arrangement unique *Auguste Tibère Caligula, Neron Galba, Vitellius Vespasien; Domitien*. Il contient un ternaire, un double binaire, & une file isolée: cet exemple doit renfermer les loix de routes les séquences simples, multiples & mixtes; un plus compliqué ne feroit que rendre la recherche plus difficile sans nécessité, puisqu'il ajouteroit des déterminations superflues; un exemple moins chargé limiteroit la recherche à des cas moins généraux, qui ne contiendroient que les séquences mixtes, sans leurs multiples, ou les homogènes sans les mixtes, ou les simples sans multiples, ni mixtes.

Voyons donc combien de séquences ternaires & de doubles binaires ce cas unique peut fournir dans le sens de M. Euler, & pour éviter la prolixité substituons les nombres aux médailles, tous les cas possibles se trouveront successivement être les suivans.

(1, 2, 3), (5, 6), (8, 9), 11.

(1, 2), (4, 5, 6), (8, 9), 11.

(1, 2), (4, 5), (7, 8, 9), 11.

1, (3, 4, 5), (7, 8); (10, 11).

1; (3, 4), (6, 7, 8); (10, 11).

1; (3, 4); (6, 7); (9, 10, 11).

(1, 2, 3), 5, (7, 8); (10, 11).

(1, 2, 3), (5, 6), 8; (10, 11).

(1, 2), 4, (6, 7, 8), (10, 11).

(1, 2), 4, (6, 7), (9, 10, 11).

(1, 2), (4, 5, 6), 8, (10, 11).

(1, 2), (4, 5), 7, (9, 10, 11).

Le nombre total des numeros est ici 11, le nombre des files est 8, la dernière file est raccourcie de 10, sa longueur est réduite à 1, & elle ne



ne fournit aussi qu'un seul rang complet: si elle étoit plus longue, il y auroit évidemment plus de rangs dans la même proportion de cette longueur. Ainsi la dernière file étant  $l$ , au lieu de  $1$ , le nombre des rangs seroit  $l$ , au lieu d'être  $1$ , la diminution résulte de l'élevation des files l'une sur l'autre; & celle-ci des faisceaux & des séquences; il y a 4 faisceaux, chacun s'élève sur l'autre de 2 numeros sur son précédent, le premier faisceau n'a point de précédent, ainsi il n'en faut compter que 3, ce qui fait un raccourcissement de 6: s'il y avoit 4 faisceaux, le raccourcissement seroit par conséquent de 8, & en général, s'il y avoit  $F$  faisceaux, ils produiroient un raccourcissement de  $2(F - 1)$ . Ici les deux binaires, & le ternaire sont un raccourcissement de 3; la raison est en est que les files dans les séquences ne s'élèvent que d'un numero, chacune sur la précédente, la première file d'une séquence n'a point de précédente, ainsi il y a pour chaque séquence autant de nombres à raccourcir que la séquence contient de files moins une. Si donc il y avoit  $m$  binaires, cela feroit un raccourcissement de  $m$  nombres; s'il y avoit  $m$  ternaires, ils produiroient un raccourcissement de  $2m$  nombres; enfin si la séquence étoit  $S$ , le raccourcissement qu'elle produiroit seroit  $S - 1$ ; & s'il y avoit  $m$  pareilles séquences elles raccourceroient par conséquent la dernière file de  $m$  fois  $S - 1$  nombres: or on peut concevoir des séquences depuis la plus grande  $S$ , jusqu'au binaire 2, & chacune d'elle peut être multiple; ainsi le raccourcissement de la dernière file peut être  $= 2(F - 1) + m(S - 1) + m(S - 2) + \dots + m$ , & nommant pour abrégér la progression descendante  $(S - 1) + (S - 2) + \dots + 1 = P$ , & le nombre total des numeros  $n$ , au lieu de  $11$ , on aura  $l = n - 2(F - 1) - mP$ .

Il y dans notre cas 8 files, & cependant elles ne forment que 4 choses, ou faisceaux à combiner. C'est que chaque séquence n'est qu'un seul tout, & qu'elle absorbe deux ou plusieurs files. Chaque binaire en prend 2, & ne fait qu'un faisceau; le ternaire en prend 3, & n'est compté que pour  $m$ : par la même raison une séquence quelconque de  $S$  nombres, occupera  $S$  files, & ne donnera qu'un



faisceau; &  $m$  S séquences absorberont  $m$  S files, pour fournir  $m$  faisceaux. Donc, puisqu'il peut y avoir toute la progression descendante de séquences, depuis la plus nombreuse S, jusqu'à la binaire 2, & que chacune peut être répétée  $m$  fois, le nombre des faisceaux sera égal au nombre total des files, moins  $m$  fois cette progression, plus  $m$ : ainsi si le nombre des files est  $t$ , celui des faisceaux F, sera

$$= t - (P + 1) m + m = t - P m,$$

donc le nombre des rangs à combiner l sera

$$= n - 2 t + 2 + P m,$$

Les quatre faisceaux de notre cas donnent 12 transpositions, la file isolée occupe 3 fois la gauche, 3 fois la droite, 3 fois elle sépare la première séquence des deux dernières, & 3 fois elle sépare la dernière des deux premières. Quatre choses se transposent régulièrement en 24 façons, la file isolée devrait occuper 6 fois chaque position; pourquoi ne l'occupe-t-elle que 3 fois? C'est qu'il y a deux choses semblables, deux binaires dont les transpositions avec les deux autres dissemblables donnent toujours par conséquent deux fois le même résultat; s'il y avait 3 choses semblables, on pourroit les transposer entr'elles de 1. 2. 3 façons, & par conséquent elles donneroient 6 fois le même résultat. Donc, puisque le nombre des transpositions est ici,  $\frac{1. 2. 3. 4}{1 \times 2}$ , s'il y avait F faisceaux, tous différens entr'eux

à l'exception de deux, le nombre des transpositions seroit  $\frac{1. 2. 3 \dots F}{1 \times 2}$ ,

& s'il y a  $m$  faisceaux semblables au lieu de 2, les transpositions seront

$$\frac{1. 2. 3 \dots F}{1. 2 \dots m}, \text{ ou mettant au lieu de F, sa valeur trouvée,}$$

$$\text{les transpositions seront } \frac{1. 2. 3 \dots (t - P m)}{1. 2 \dots m}.$$





Je puis m'arrêter ici. Parvenus à l'expression générale des transpositions, des rangs & des faisceaux à combiner, il ne reste plus rien à chercher : nous sommes arrivés du cas singulier à la connoissance de la loi générale de toutes les séquences possibles ; qui sera

$$\frac{1.2.3 \dots (t-Pm)}{1.2 \dots m} \frac{(n-2t+2+Pm)(n-2t+2+Pm+1)(\dots)(n-t+1)}{1. \quad 2. \quad \dots \quad (t-Pm)},$$

si les séquences finissent au plus grand nombre, &

$$\frac{1.2.3 \dots (t-Pm)}{1.2 \dots m} \frac{(n)(n-2t+1+Pm)(n-2t+1+Pm+1)(\dots)(n-t-1)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad \dots \quad (t-Pm)},$$

si le plus grand nombre est censé faire séquence avec le plus petit.

Cependant on peut encore aller plus loin. Le cas individuel que j'ai pris pour exemple, ayant quatre faisceaux à combiner & un seul rang, cette combinaison s'exprimerait comme on fait par la fraction

$$\frac{1 \times 2 \times 3 \times 4}{1 \times 2 \times 3 \times 4}, \text{ les transpositions sont comme nous venons de le voir}$$

$$\frac{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4.}{1. \quad 2. \quad 1.}, \text{ ainsi le nombre de séquences de III} \vdash \text{II} \vdash \text{II}$$

$$\text{sera } \frac{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4.}{1. \quad 2. \quad 1.} \times \frac{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4.}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4.}, \text{ où je remarque que le numérateur}$$

des transpositions est précisément égal au dénominateur des combinaisons, & qu'ils s'entredétruisent. Mais, quelle est la raison suffisante de cette égalité ? Il faut la chercher dans l'origine même de ce numérateur & de ce dénominateur.

Lorsque dans la combinaison on regarde non seulement au nombre des choses combinables, mais aussi à leur situation, la combinaison sera toujours un nombre entier ; elle ne devient fraction que dans les cas où l'on ne veut pas avoir les diverses situations des choses à combiner. Or les transpositions expriment précisément ces diverses situations des choses combinables : ainsi pour les exclure l'on divise le nombre total des combinaisons par le nombre total des transpositions ; nombre qui devient

par



par conséquent le dénominateur de la fraction. Il n'est donc pas étonnant que le numérateur des transpositions soit égal ici au dénominateur des combinaisons, & puisque la même raison aura lieu toutes les fois qu'on cherchera le nombre total des cas d'une espèce de séquence quelconque, il est évident que ce nombre peut toujours être exprimé par celui des combinaisons totales, divisé simplement s'il en est besoin par le nombre des cas identiques, c. à d. de ceux qui résultent de la combinaison des faisceaux ou des choses semblables.

Ainsi le nombre des choses à combiner étant  $t = Pm$ , & celui des rangs,  $n = 2t + 2 + Pm$ , on aura les cas de chaque séquence quelconque dans le sens de M. Euler

$$\frac{(n-2t+Pm+2)(n-2t+Pm+3)(\dots)(n-t+1)}{(1.2\dots m)(\dots)(1.2\dots m)},$$

& dans le sens de M. Bernoulli, où cette même séquence quelconque est toujours répétée autant de fois qu'il y a de numeros en tout, le nombre des cas sera

$$\frac{n(n-2t+Pm+1)(n-2t+Pm+2)(\dots)(n-t-1)}{(1.2\dots m)(\dots)(1.2\dots m)}.$$


En sorte que dans l'une & l'autre formule le nombre des facteurs du numérateur soit égal au nombre des choses à combiner, & le nombre des facteurs du dénominateur, à celui des multiples des faisceaux semblables.

Ce qu'il y a de singulier dans notre exemple, c'est que dans le sens de M. Bernoulli, il ne contient aucun cas de la séquence mixte que nous avons choisie; puisque nous n'avons supposé qu'un seul rang; & qu'ainsi le nombre des cas seroit

$$\frac{11 \times (11 - 11) (11 - 10) (11 - 9)}{1. \quad 2. \quad 1. \quad 2} = 0.$$

Ce qui n'empêche pas que cet exemple ne fournisse aussi la loi générale pour les séquences circulaires.





**M É M O I R E,**  
**SUR LES VIBRATIONS DES CORDES D'UNE**  
**ÉPAISSEUR INÉGALE.**

PAR M. DANIEL BERNOULLI.

§. I.

Après tous les Mémoires que M. M. Euler, de la Grange, d'Alembert & moi avons publiés sur les vibrations des cordes, on fera porté à croire cette matiere entierement épuisée, & peut être surpris de voir paroître encore ce nouveau Mémoire sur lesdites vibrations. En effet, s'il n'étoit question que des cordes uniformément épaisses, il seroit bien difficile d'ajouter rien de nouveau à ce qu'on en a déjà dit; mais il s'agit dans ce Mémoire de cordes inégalement épaisses, & ce sujet, bien loin d'être épuisé, est entierement neuf, du moins dans le tems où j'écris ce Mémoire \*), quoique suivant toutes les apparences médité par tous ceux qui ont épluché la théorie des cordes uniformes, puisqu'il n'est pas possible de penser aux unes sans penser aussitôt aux autres. La grande question est de déterminer les vibrations d'une corde tendue, dont les différentes épaisseurs sont données par une loi quelconque; question que je ne sache

\*) J'ignorois lorsque j'écrivois ceci que Mrs. Euler & de la Grange eussent traité cette matiere, le premier dans le Tome IX des nouveaux Commentaires de Pétersbourg, & le second dans le Tome II des Mélanges de la Société Royale de Turin.

Je serai remarquer aussi au sujet du second Mémoire de Mr. Euler inféré dans le Tome III des Mélanges de Turin, qu'il doit avoir fait ce Mémoire dans le même tems que je travaillois au mien, à savoir, au commencement de 1765. C'est ce qu'il confirme les dates des lettres qui accompagnoient nos Mémoires.



fâche pas avoir été généralement résolue, & dont la solution n'eût pas manqué de répandre de nouvelles lumières sur ce que cette matière renferme encore de caché ou d'équivoque; c'est principalement dans cette vue, que je me suis appliqué à trouver du moins la solution pour une infinité de cas particuliers.

§. 2. Le parallele que je me propose de faire entre les vibrations des cordes uniformes & celles d'une épaisseur inégale, m'engage à indiquer ici les propriétés principales qu'on a démontrées sur les premières.

Soit la longueur de la corde uniforme  $= l$ , son poids  $= p$ ; le poids ou la force qui rend la corde  $= P$ ; qu'on entende par  $a, b, \gamma, \delta$  &c. des quantités constantes quelconques, par  $f$  un nombre entier quelconque, par  $\pi$  la demi-circonférence du cercle, qui a l'unité pour rayon. Si là dessus on cherche, conformément aux loix de mécanique, la courbe sous laquelle la corde fait ses vibrations simples & régulières, de manière que tous les points observent un synchronisme parfait, on trouve en appelant  $x$  l'abscisse depuis le commencement de la corde vers l'autre bout, &  $y$  son appliquée, cette équation à la courbe  $y = a \sin \frac{f x}{l} \pi$ .

Si après cela on appelle  $n$  la longueur du pendule simple isochrone avec les vibrations de la corde, on trouve

$$n = \frac{p}{f f \pi \pi P} l$$

Si on prend successivement pour  $f$  les nombres naturels 1, 2, 3 &c. les valeurs répondantes de  $y$  sont  $a \sin \frac{x}{l} \pi$ ;  $b \sin \frac{2x}{l} \pi$ ;  $\gamma \sin \frac{3x}{l} \pi$  &c. & celles de  $n$  diminuent en raison quarrée réci-

proque



proque des nombres  $f$ ; par conséquent la durée de chaque vibration diminue en raison réciproque simple du nombre  $f$ .

On appelle vibration du premier, du second, du troisième ordre, lorsqu'on fait  $f = 1$ ; ou  $f = 2$ ; ou  $f = 3$  &c. & alors la courbe forme une seule branche, ou deux ou trois branches &c. Les branches, quel qu'en soit le nombre, sont parfaitement égales entre elles; les noeuds ou les points d'intersection de la courbe avec son axe sont à distances égales; de là les sons harmoniques qu'on tire des cordes, & qui vont en progression des nombres naturels.

J'ai démontré de plus dans les Mémoires de Berlin, que les vibrations de différens ordres, quels qu'on les prenne, peuvent coexister dans une seule & même corde, sans se troubler en aucune façon, ces différentes especes de vibration coexistantes étant absolument indépendantes les unes des autres. De là cette pluralité de sons harmoniques qu'on entend à la fois d'une seule & même corde. Si toutes especes de vibration commencent au même instant; il arrivera que la première vibration du premier ordre, la seconde vibration du second ordre, la troisième vibration du troisième ordre &c. finiront au même instant. C'est là un synchronisme apparent dans un certain sens, & qui n'est rien moins que général, puisqu'il y a une infinité d'autres vibrations qui ne finissent pas au même instant.

Lorsque la corde fait à la fois plusieurs especes de vibration, quel qu'en soit le nombre, & de quelque ordre qu'elles soient, la courbe absolue sera toujours exprimée par cette équation générale,

$$y = a \sin. \frac{x}{l} \pi + b \sin. \frac{2x}{l} \pi + \gamma \sin. \frac{3x}{l} \pi + \&c.$$

& comme le nombre des coefficients arbitraires est infini, on peut faire passer la courbe par tant de points donnés de position qu'on voudra, ce qui marque que toutes les courbes se trouvent dans le cas, pourvu qu'on ne fasse pas violence aux hypotheses; & ce seroit



leur faire violence, si on ne faisoit pas les quantités  $y$ ,  $dy$  &  $ddy$  comme infiniment plus petites dans tous les points de la courbe, que les quantités  $x$ ,  $dx$  &  $\frac{dx^2}{l}$ .

Si la courbe initiale est exprimée par la susdite équation, on aura au moment que la vibration fondamentale finit pour équation de la courbe.

$$y = -\alpha \sin. \frac{x}{l} \pi + \epsilon \sin. \frac{2x}{l} \pi - \gamma \sin. \frac{3x}{l} \pi + \&c.$$

& cette courbe est entièrement la même que la courbe primitive dans une situation renversée.

Planche IV.  
Fig. 3.

§. 3. Voilà les propriétés principales sur la vibration des cordes uniformément épaisses. Examinons à présent les cordes inégalement épaisses, & considérons d'abord la question dans toute son étendue; soit donc ABC une corde tendue quelconque; son épaisseur en A  $\equiv e$ ; en B  $\equiv \sigma$ ; AB  $\equiv x$ ; Bd  $\equiv y$ ; en supposant ADC la courbure de la corde: exprimons le poids de la corde par son volume, supposons que le poids qui tend la corde soit égal au poids d'une corde dont l'épaisseur uniforme est égale à  $e$  & dont la longueur  $\equiv L$ , c'est à dire que le poids qui tend la corde soit  $eL$ ; qu'on considère trois élémens de suite en supposant  $dx$  constant, on sait par la mécanique, que la force qui agit sur l'élément en D dans la direction DB est  $\equiv -\frac{ddy}{dx} \cdot eL$ , & qu'on aura la force accélératrice en divisant cette quantité élémentaire par le petit poids de l'élément, c'est à dire par  $\sigma dx$ ; ainsi la force accélératrice pour chaque élément sera exprimée par  $-\frac{d^2y}{\sigma x^2} \cdot eL$ , si on fait cette force accélératrice proportionnelle à la distance du petit poids depuis l'axe, où se trouve le centre de force: on sait qu'on

satis-



satisfait par là également à l'isochronisme pour les excursions plus ou moins grandes & au synchronisme pour tous les points de la corde ; donc les conditions du Problème demandent que

$$-\frac{ddy}{\sigma dx^2} eL = \frac{y}{n} \quad \text{ou} \quad -ddy = \frac{\sigma y dx^2}{enL}$$

en entendant par  $n$  une petite ligne constante qui marquera précisément la longueur d'un pendule simple isochrone avec les vibrations de la corde.

Jusqu'ici cette solution ne diffère pas de celle qui est connue pour les cordes uniformément épaisses, qui font  $\sigma = e$  &  $-ddy = \frac{y dx^2}{nL}$  ; c'est pourquoi je me suis contenté de l'indiquer sans entrer dans le détail ; ce n'est donc pas la mécanique qui nous laisse en défaut pour la solution générale ; c'est l'analyse qui nous arrête ; il s'agit d'intégrer ladite équation différentielle du second ordre, quelle que soit la relation entre  $\sigma$  &  $x$  : & c'est ce qu'on n'a pas scû encore faire. Je me suis donc appliqué à trouver une méthode pour déterminer une infinité de ces relations qui permettent d'intégrer notre équation primitive différentielle du second ordre, & de nous mettre par là en état de répondre positivement à toutes les questions qu'on peut faire sur cette matière.

§. 4. Voici un nouveau *Lemme* qui nous servira de guide : Soit  $q$  une quantité variable quelconque exprimée par la variable  $x$  & des constantes, ou une fonction de  $x$  ; qu'on entende par  $a$  une certaine quantité constante, je dis qu'on peut intégrer généralement cette équation différentielle du second ordre

$$-ddy = y \left( \frac{dx^2}{a a q^4} - \frac{ddq}{q} \right)$$

& que la double intégration donne  $y = a q \sin \int \frac{dx}{a q q}$ .



Car la double différentiation de cette dernière équation donne

$$— d d y = \left( \frac{dx^2}{a a q^3} — d d q \right) a \sin . \int \frac{dx}{a q q} \quad \text{or}$$

$$a \sin . \int \frac{dx}{a q q} = \frac{y}{q} \text{ \& substituant cette valeur, on tombe sur}$$

$$\text{l'équation proposée } — d d y = y \left( \frac{dx^2}{a a q^4} — \frac{d d q}{q} \right).$$

§. 5. Le Lemme que nous venons d'exposer nous conduit d'abord à la solution de notre problème principal: il n'y a pour cet effet qu'à identifier l'équation intégrale du Lemme avec l'équation du §. 3. Ces deux équations étant

$$— d d y = y \left( \frac{dx^2}{a a q^4} — \frac{d d q}{q} \right) \text{ \& } — d d y = \frac{\sigma y dx^2}{e n L},$$

$$\text{nous en tirerons } \frac{dx^2}{a a q^4} — \frac{d d q}{q} = \frac{\sigma dx^2}{e n L}, \text{ ou bien}$$

$$\frac{\sigma}{e} = \frac{n L}{a a q^4} — \frac{n L d d q}{q dx^2}. \text{ Voilà donc une équation infiniment}$$

féconde, dont chaque cas particulier fournit une nouvelle solution, puisqu'on peut prendre pour  $q$  une fonction arbitraire de  $x$ , & que chaque nouvelle valeur de  $q$  donne une nouvelle loi pour les épaisseurs de la corde, telle que nous la demandons. Quant à la courbure qu'une telle corde doit prendre pour faire des vibrations simples & régulières, elle sera toujours exprimée par l'équation intégrée du dit Lemme, puisque l'équation différentielle dont elle est l'in-

tégrale a été identifiée avec l'équation générale  $— d d y = \frac{\sigma y dx^2}{e n L}$

du §. 3. Cette courbure sera déterminée par l'équation

$$y = a q \sin . \int \frac{dx}{a q q}.$$

§. 6. Quant à la constante  $a$  qui se trouve dans les équations du précédent article, il faut s'en servir pour satisfaire à la condition du problème, qui demande qu'au point C l'appliquée soit nulle, c'est à dire, que  $y = 0$  lorsque  $x = l$ . Cette considération demande que dans l'équation à la courbe  $y = a q \sin . \int \frac{dx}{a q q}$  le

facteur  $\sin . \int \frac{dx}{a q q}$  soit nul, lorsque  $x = l$ ; mais les sinus deviennent nuls toutes les fois que leurs arcs sont égaux ou au demi-cercle ou à un multiple quelconque du demi-cercle. Soit donc  $\pi$  le demi-cercle qui a l'uoité pour rayon, & qu'on entende par  $f$  un nombre entier quelconque; il faudra faire  $\int \frac{dx}{a q q} = f \pi$  après avoir substitué  $l$  à la place de  $x$ ; on aura de cette manière la constante  $a = S \frac{dx}{q q} : f \pi$ , en entendant par le signe  $S$  la valeur de l'intégrale totale pour le cas  $x = l$ . Nous aurons donc pour équation

finale à la courbe  $y = a q \sin . \frac{\int \frac{dx}{q q}}{S \frac{\int \frac{dx}{q q}}{q q}} f \pi$ , & on observera encore que la quantité  $\int \frac{dx}{q q}$  demande une telle constante que  $y$

devienne  $= 0$  lorsque  $x = 0$ , & par conséquent  $\int \frac{dx}{q q} = 0$  pour  $x = 0$ . Cette même valeur de  $a$  doit pareillement être substituée dans l'équation du précédent article, qui détermine la loi des épaisseurs de la corde, ce qui donne

$$\frac{\sigma}{e} = \frac{n L f f \pi \pi}{\left( S \frac{dx}{q q} \right)^2 q^4} - \frac{n L d d q}{q d x^2}.$$

§. 7. Il nous reste à déterminer la longueur du pendule simple isochrone avec les vibrations des cordes pour lesquelles nous venons d'indiquer la loi des épaisseurs. Pour cet effet il n'y a qu'à appliquer notre dernière équation, vraie pour tous les points de la corde, à un point donné de position, & examiner ce que deviennent toutes les quantités variables pour ce point. Choisissons le point A auquel la courbe commence, & nous aurons pour ce point  $x = 0$  &  $\frac{\sigma}{c} = 1$ : mais il faudra se donner la peine de calculer les va-

leurs de  $S \frac{dx}{q q}$  expliquées au §. 6. de  $q^4$ , & de  $\frac{d.dq}{q dx^2}$ , en rapportant ces dernières quantités au point A. Dans ce sens je nommerai A la quantité  $\frac{1}{\left(S \frac{dx}{q q}\right)^2 q^4}$  & B la quantité  $\frac{d.dq}{q dx^2}$ : toutes ces substitutions nous donneront

$$1 = n L f f \pi \pi A - n L B$$

$$\& \text{ de là on tire la valeur cherchée } n = \frac{1}{L f f \pi \pi A - L B}$$

Quant à la lettre  $f$  qui signifie un nombre entier quelconque, on remarquera que ce nombre marque en même tems l'ordre auquel les vibrations appartiennent; si donc, par exemple, on suppose  $f = 3$ , on aura les vibrations du troisième ordre, qui partagent la corde en trois parties, & forment deux noeuds ou points d'intersection avec l'axe; chaque partie formera ses vibrations, toutes synchrones & isochrones entre elles. Voilà tout ce que je m'étois proposé d'examiner & de déterminer: l'application que j'en ferai, servira à répandre quelques nouvelles lumières sur les vibrations des cordes tendues.

§. 8. Nous voyons d'abord par la valeur de  $n$ , que nous venons de déterminer, que le pendule simple isochrone, tout le reste égal, est réciproquement proportionel à la longueur  $L$ , c'est à dire, au poids qui tend la corde; il est aussi directement proportionel



ni poids de la corde, parce que ce poids devenant plus grand ou plus petit, tandis que le poids, qui rend la corde reste le même, la longueur  $L$  fait la proportion réciproque du poids de la corde, en vertu de la signification de la lettre  $L$  donnée au §. 3. Il étoit facile de prévoir cette propriété : il nous est plus important d'examiner l'usage, qu'on peut faire du nombre entier arbitraire  $f$ , tant pour l'équation à la courbe que pour la détermination de l'épaisseur variable de la corde & le pendule simple isochrone avec les vibrations.

§. 9. Remarquons que, quelle que soit la loi des épaisseurs d'une corde  $AC$ , il est naturel de dire, que cette même corde peut être ébranlée & former des vibrations de tous les ordres, toujours simples & régulières. Les quatre premières figures nous représentent les quatre ordres les plus simples; mais notre méthode ne s'étend pas à développer cette vérité dans toute son étendue. Voici ce que cette méthode nous enseigne: c'est de trouver entre deux points donnés de position  $A$  &  $C$ , une infinité de cordes non-uniformément épaisses, qui fassent des vibrations régulières & déterminables en tout: l'équation finale du §. 6. nous donne la loi pour toute cette infinité de cordes. Si dans cette équation nous substituons pour  $f$  successivement 1, 2, 3, 4 &c. elle nous fournira la loi pour les cordes destinées à faire des vibrations du premier, du second, du troisième, du quatrième, &c. ordre, mais, généralement parlant, les cordes ne sont pas les mêmes pour les différens ordres de vibration, quoique leur expression ne diffère que dans le coefficient de l'un de ses termes. C'est-à-dire qui nous empêche de déterminer les vibrations de différens ordres dans une seule & même corde. Il faudroit pour identifier les cordes, à chaque nouvel ordre trouver une nouvelle fonction pour  $q$  propre à cette identité, si cela étoit toujours possible ou faisable. Cependant, comme il nous est permis de choisir un ordre quelconque, notre théorie nous met déjà en état de déterminer la position des noeuds tels que  $M$ ,  $N$  &  $O$ , dans la quatrième figure, de même que les plus grandes excursions aux points  $m$ ,  $n$ ,  $o$  &  $p$ , & la position de ces points; & tout cela pour une infinité de cordes, suivant la fonction

*Mém. de l'Acad. Tom. XXL* O o qu'on



qu'on aura substituée pour  $q$ . Ces déterminations relatives aux loix des épaisseurs de la corde serviront à mettre dans un nouveau jour les vibrations régulières qui se forment sur un certain nombre de ses parties. Mais ce n'est pas là précisément ce que je me suis proposé dans ces recherches, puisque nous ne voyons encore pour chaque corde qu'une seule espèce de vibration régulière & isochrone. J'examinerai donc ce qu'on peut faire pour trouver des cordes non-uniformément épaisses, dans lesquelles on puisse déterminer toutes les espèces de vibration possibles.

§. 10. Comme  $q$  est une fonction arbitraire de  $x$  & de constantes, nous supposons d'abord  $q = 1$ : Ce cas nous donne  $\int \frac{dx}{qq} = x$ : ensuite  $S \frac{dx}{qq} = l$ ;  $ddq = 0$ ; de là on tire (§. 6.)  $y = a \sin \frac{x}{l} f\pi$ , & puis  $\frac{\sigma}{e} = \frac{nLff\pi\pi}{ll}$ ; de là encore (§. 7.)  $A = \frac{l}{ll}$ , &  $B = 0$ , ce qui donne  $n = \frac{ll}{ff\pi\pi L}$ . Ces déterminations nous donnent toute la théorie des cordes uniformément épaisses, telle que nous l'avons indiquée au §. 2. où  $\frac{P}{p}$  est la même chose que  $\frac{l}{L}$ . Je n'ai exposé ce cas que pour faire voir qu'il est contenu dans notre théorie. Voici à présent une nouvelle classe de cordes infiniment plus générale, & qui a toutes les mêmes prérogatives.

§. 11. Qu'on suppose  $q = \frac{b+x}{b}$ , où  $b$  marque une quantité constante quelconque. Cette fonction fait  $\int \frac{dx}{qq} = \int \frac{bbdx}{(b+x)^2} = b - \frac{bb}{b+x} = \frac{bx}{b+x}$ , & par conséquent



quent  $S \frac{dx}{qq} = \frac{bl}{b+l}$ ; ensuite nous aurons encore  $ddq = 0$ ,

$$\& A = \frac{(b+l)^2}{bbll} \times \frac{b^4}{(b+x)^4} = \frac{(b+l)^2}{ll} \times \frac{bb}{(b+x)^4};$$

& enfin  $B = 0$  substituant ces valeurs aux §§. 6 & 7. nous aurons

$$y = a. \frac{b+x}{b} \sin \frac{x}{l} \cdot \frac{b+l}{b+x} \cdot f\pi$$

$$\frac{\sigma}{e} = \frac{nL}{ll} \cdot \frac{(bb+bl)^2}{(b+x)^2} \cdot ff\pi\pi$$

$$n = \frac{bbll}{ff\pi\pi L(b+l)^2}.$$

Si on substitue cette valeur de  $n$  dans la seconde équation, on aura

$$\text{simplement } \frac{\sigma}{e} = \left( \frac{b}{b+x} \right)^4. \quad \text{On voit donc que c'est la même}$$

corde, quelque nombre qu'on prene pour  $f$ ; il n'y a que l'équation à la courbe & le pendule simple isochrone avec les vibrations de la corde, auxquelles le nombre  $f$  soit affecté. La loi des épaisseurs de la corde est aussi indépendante de la longueur de la corde, de sorte que nos formules subsistent quelle que soit cette longueur. On voit au reste qu'en faisant la longueur  $b$  infinie, ce cas est encore celui des cordes d'une épaisseur égale, & toutes les formules deviennent les mêmes que celles du second paragraphe. Mais, quelque valeur qu'on donne à la longueur  $b$ , cette classe de cordes a absolument les mêmes prérogatives que l'on a démontrées convenir aux cordes également épaisses, & je suis bien sûr qu'il n'y en a point d'autre pareille. Examinons donc de plus près toutes les propriétés de ces nouvelles vibrations.

§. 12. Je commence cet examen par les différens ordres de vibration, qu'on détermine dans ces cordes, tout comme dans les





cordes également épaisses. Lors donc que toutes les circonstances sont les mêmes, & qu'on prend pour  $f$  successivement les nombres naturels, l'expression de  $n$  marque que la longueur du pendule simple isochrone diminue en raison de  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \&c.$  tout comme dans les cordes également épaisses; par conséquent la durée de chaque vibration diminue en raison de  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \&c.$  & celle de chaque vibration fondamentale sera toujours exactement multiple de toutes les autres. Or j'ai démontré que toutes les vibrations de différens ordres peuvent coëxister, sans se troubler, dans une seule & même corde. Si donc toutes ces especes de vibration commencent au même instant, on voit que la premiere vibration du premier ordre, la seconde du second, la troisieme du troisieme &c. finiront au même instant, & que par conséquent chaque point de la corde se trouve à l'égard de toutes les especes de vibrations dans un repos momentané parfait, qu'il quittera aussitôt pour reprendre par un mouvement réciproque son état primitif. Voilà donc des mouvemens réciproques périodiques, qui ont toute l'apparence de vibrations simples réciproques, mais qui en effet ne sont qu'un mélange de vibrations simples, dont chaque especce forme un autre ton. Ceux qui ont l'oreille fine savent fort bien distinguer & même apprécier les principaux de ces tons; ils seront d'autant plus forts & prédomineront, qu'on suppose dans l'équation pour  $y$  le coëfficient  $a$  plus grand: tous ces tons vont en progression des nombres naturels  $1, 2, 3, 4, 5, \&c.$  Cette pluralité de tons coëxistans à la fois dans une seule & même corde ne fait-elle pas une preuve évidente, que ce retour périodique dont je viens de parler, ne sauroit être envisagé comme une vibration simple: la corde en ce cas ne feroit jamais entendre que le ton fondamental, pendant qu'on peut faire évanouir entierement ce ton fondamental, ou le rendre aussi foible qu'on veut, & donner beaucoup de force à son octave ou à sa douzieme, ou à sa double octave &c.

§. 13. Nous voyons donc que ces nouvelles cordes ont toutes les propriétés à cet égard que j'ai indiquées au §. 2. par rapport aux cordes ordinaires & uniformement épaisses. J'ose dire plus. Je dis que





que notre loi pour ces cordes est unique, & qu'elle comprend tous les cas possibles, puisque les cordes uniformes y sont comprises. Là dessus, en combinant tous les ordres de vibration possibles, l'équation généralissime à la courbure de la corde sera, en entendant par  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\lambda$ , &c. des constantes quelconques

$$y = \frac{b+x}{b} \left( \alpha \sin \frac{x}{l} \cdot \frac{b+l}{b+x} \cdot \pi + \beta \sin \frac{x}{l} \cdot \frac{b+l}{b+x} \cdot 2\pi + \gamma \sin \frac{x}{l} \cdot \frac{b+l}{b+x} \cdot 3\pi + \delta \sin \frac{x}{l} \cdot \frac{b+l}{b+x} \cdot 4\pi + \&c. \right)$$

& cette équation comprend toutes les courbes possibles propres à produire les périodes dont je viens de parler, & que je ne saurois m'accoutumer à nommer des vibrations simples.

Je remarquerai ici qu'au bout de la première période la configuration de la corde n'est pas la même que la primitive renversée de droite à gauche, comme dans les cordes également épaisses; mais la configuration primitive se reproduit en tout sens au bout de deux périodes. Cependant, si on prend pour  $f$  simplement la suite des nombres impairs en excluant tous les nombres pairs, alors non seulement la courbe primitive se reproduit à chaque période, tant pour la position que pour la configuration, mais la corde aira encore cette autre propriété, qu'au milieu de chaque période tous les points passeront par l'axe à la fois: dans cet instant la corde sera parfaitement droite. Comme cette dernière propriété exclut nécessairement tous les nombres pairs à prendre pour  $f$ , on ne dira plus que toute courbe arbitraire y est bonne; m'en nommera-t-on une seule qui ne soit par renfermée dans ma formule; si tant est que quelque autre méthode indique cette formule? On ne doutera donc plus que les retours périodiques ne soient uniquement fondés sur ce que la durée d'une vibration fondamentale est exactement multiple de la durée de chaque autre vibration, de quelque ordre qu'elle soit: nulle autre espèce de corde n'a cette propriété, comme nulle autre n'a celle desdits retours pé-



riodiques. Considérons à présent les vibrations pures sans aucun mélange.

§. 14. Si l'on prend sur l'axe prolongé,  $AE = h$ , on aura en faisant simplement varier cette longueur  $AE$ , & en retenant tout le reste, la longueur du pendule simple isochrone proportionnelle au carré de  $AE$  sur  $CE$ ; & la durée de chaque vibration sera comme  $AE$  est à  $CE$ ; mais, si on retient la même quantité  $AE$  & qu'on change la longueur de la corde  $AC$ , je dis que la longueur du pendule simple isochrone sera comme le carré de  $AC$  divisé par le carré de  $EC$ , & la durée de chaque vibration comme  $AC$  divisé par  $EC$ ; d'où il suit, que la longueur de la corde pourroit être infinie, sans que le ton en devint infiniment grave; on n'auroit que la sous-octave du ton que donneroit la corde, qui n'auroit que la longueur  $AE$ . Si on fait d'abord  $AC = AE$ , & qu'ensuite on en prenne le tiers, on aura l'octave en dessus; si on prenoit la moitié de la corde, on auroit la quinte; d'où l'on voit que ces divisions de la corde font un effet bien différent de celui des cordes ordinaires. Je passe un grand nombre d'autres corollaires pour dire encore quelques mots sur la position des points essentiels dans les différentes configurations de la corde ébranlée.

§. 15. Lorsque les vibrations simples sont d'un ordre quelconque  $f$ , la corde formera un certain nombre de nœuds; & ce nombre sera exprimé par  $f - 1$ ; dans les cordes uniformément épaisses tous ces nœuds sont placés à distances égales; mais ici ces distances sont fort inégales, & elles augmentent à mesure que la grosseur de la corde diminue. C'est l'équation à la courbe exposée au §. 11. qui nous met en état de déterminer toujours la position de chaque nœud: il faut pour cet effet trouver toujours toutes les valeurs de  $x$  qui font  $y = 0$ , outre les deux cas de  $x = 0$  &  $x = l$  qui répondent aux points  $A$  &  $C$ . Cette condition demande donc qu'on

fasse  $\frac{x}{l} : \frac{b+l}{b+x} \cdot f\pi = m\pi$ , en mettant pour  $m$  successivement



1, 2, 3, 4, &c. jusqu'à  $f - 1$  & en cherchant successivement la valeur de  $x$ , & cette valeur donnera successivement la distance des noeuds depuis le point A: de cette façon l'équation générale pour la position de tel noeud qu'on demande, sera

$$x = \frac{m b l}{f b + f l - m l}.$$

Si, au lieu de la distance de chaque noeud depuis le point A, on demande sa distance depuis le point E, il faut à la dite valeur ajouter  $b$ ,

& cette distance sera  $\frac{f b b + f b l}{f b + f l - m l}$ ; cette dernière formule

donne en même tems la position du point A en faisant  $m = 0$ , & la position du point C en faisant  $m = f$ , & en effet ces deux points peuvent être regardés comme des noeuds. Donc, pour avoir tous les points A, M, N &c. jusqu'au point C, il faudra faire successivement  $m = 0$ ,  $m = 1$ ,  $m = 2$ ,  $m = 3$ , jusqu'à  $m = f$ , & les résultats donneront successivement les distances EA, EM, EN, &c. jusqu'à la distance EC. De cette manière on obtient

$$EA = \frac{f b b + f b l}{f b + f l}, \text{ ou } = b,$$

$$EM = \frac{f b b + f b l}{f b + f l - l},$$

$$EN = \frac{f b b + f b l}{f b + f l - 2 l},$$

$$EO = \frac{f b b + f b l}{f b + f l - 3 l} \text{ \&c.}$$

$$\text{\& enfin } EC = \frac{f b b + f b l}{f b + f l - f l}, \text{ ou } = b + l.$$

De là on voit que toutes ces distances vont généralement en progression harmonique, quel que soit le nombre  $f$ , & quel que soit le rapport



peut être  $b$  &  $l$ ; soit, par exemple,  $l = 2b$ , on aura pour la quatrième figure; qui suppose  $f = 4$ ;  $EA = b$ ;  $EM = \frac{2}{3}b$ ;  $EN = \frac{1}{2}b$ ;  $EO = 2b$ ; &  $EC = 3b$ , & par conséquent  $AM = \frac{1}{3}b$ , ou  $\frac{1}{6}l$ ;  $MN = \frac{2}{3}b$ , ou  $\frac{2}{3}l$ ;  $NO = \frac{1}{2}b$ , ou  $\frac{1}{4}l$ , &  $OC = b$ , ou  $\frac{1}{2}l$ . D'où l'on voit que les longueurs de ces branches sont en raison des nombres 2, 3, 5 & 10, ainsi la dernière branche  $OC$  a cinq fois la longueur de la première branche  $AM$ .

§. 16. On voit aussi, qu'il y a dans chaque ventre ou branche un point, qui fait de plus grandes excursions que tout autre point de la même branche. Dans les cordes uniformément épaisses tous ces points sont exactement au milieu de chaque branche; mais c'est tout autre chose dans les cordes inégalement épaisses, & il est essentiel de déterminer ces points afin d'avoir une connoissance exacte de pareilles vibrations intéressantes dans la Physique & dans la Mécanique. On prendra donc la différentielle de l'équation à la courbe (§. 11.) & on fera  $dy = 0$ . De cette façon on trouve . . .

$$\sin \frac{x}{b+x} \times \frac{b+l}{l} \times f\pi = \frac{b}{b+x} \times \frac{b+l}{l} \times f\pi \cos \frac{x}{b+x} \times \frac{b+l}{l} \times f\pi,$$

ou bien

$$\text{tang. } \frac{x}{b+x} \times \frac{b+l}{l} \times f\pi = \frac{b}{b+x} \times \frac{b+l}{l} \times f\pi.$$

Cette équation donnera la valeur de  $x$  par plusieurs méthodes d'approximation qu'on connoît, & on remarquera qu'il doit y avoir entre les deux extrémités de la corde autant de racines qu'il y a de ventres ou qu'il y a d'unités en  $f$ ; Supposons d'abord  $b$  beaucoup plus grand

que  $l$ , il faudra que tang.  $\frac{x}{b+x} \times \frac{b+l}{l} \times f\pi$ , soit une quantité fort grande, & par conséquent l'arc  $\frac{x}{b+x} \times \frac{b+l}{l} \times f\pi$ ,



à peu près égal  $\frac{2m-1}{2} \pi$ , en entendant par  $m$  un nombre entier quelconque, qui ne soit pas plus grand que  $f$ ; faisons donc

$$\frac{x}{b+x} \times \frac{b+l}{l} \times f\pi = \frac{2m-1}{2} \pi, \text{ \& nous aurons}$$

$x = \frac{(2m-1)bl}{2fb+2fl-2ml+l}$ : mais comme la tangente en question doit prendre une valeur négative, c'est une marque que les arcs  $\frac{x}{b+x} \cdot \frac{b+l}{l} \cdot f\pi$  doivent être pris un peu plus grands que  $\frac{2m-1}{2} \pi$ , d'où nous devons conclure que la valeur de  $x$  est un peu trop petite.

Une autre considération m'a fait voir, qu'il faut augmenter cette valeur de la quantité  $\frac{8fll(bb+bl)}{(2fb+2fl-2ml+l)^3 \pi \pi}$ , pour avoir à peu près la véritable valeur, quelle que soit la proportion entre  $b$  &  $l$ . De cette manière nous aurons à peu près

$$x = \frac{(2m-1)bl}{2fb+2fl-2ml+l} + \frac{8fll(bb+bl)}{(2fb+2fl-2ml+l)^3 \pi \pi}.$$

En examinant ces formules, on verra facilement que les points des plus grandes excursions, sont toujours en deçà du milieu des branches, & qu'ils approchent d'autant plus du noeud qui les précède, que la valeur de  $b$  relativement à la longueur de la corde est plus petite. J'éclaircirai tout cela par un seul exemple. Considérons les vibrations du quatrième ordre (Fig. 4.) en faisant  $f = 4$ , & supposons la longueur EA ou  $b$  égale à la longueur de la corde AC ou  $l$ . Cette valeur de  $b$  est bien éloignée d'être infinie, mais nos formules ne laisseront pas d'indiquer assez juste les points des plus grandes excursions  $m$ ,  $n$ ,  $o$  &  $p$ : nous aurons pour cet exemple



$x = \frac{(2m - 1)l}{17 - 2m} + \frac{64l}{(17 - 2m)^3 \pi \pi}$ ; & pour avoir les quatre points  $m, n, o$  &  $p$ , il faudra pour  $m$  mettre successivement 1, 2, 3 & 4, & nous pourrons à cause de la petitesse du second terme nous contenter de faire  $\pi \pi = 10$ . De cette manière nous aurons, en exprimant la longueur de la corde  $l$  par 10000,

$$Am = 666 + 19 = 685$$

$$An = 2307 + 29 = 2336$$

$$Ao = 4545 + 48 = 4593$$

$$Ap = 7777 + 88 = 7865$$

Pour vérifier ces valeurs, j'ai examiné celle que donne l'équation immédiate, exposée au commencement de cet article, pour  $Ap$ , & je l'ai trouvée = 7868 au lieu de 7865, d'où l'on voit la justesse de nos formules algébriques substituées à la vraie équation transcendente. Ces déterminations jointes à celle des noeuds, que j'ai donnée dans le précédent article, serviront à déterminer toutes les distances qu'on pourra exiger.

§. 17. Après avoir déterminé la position des points  $m, n, o$  &c. ce n'est plus qu'un simple corollaire de déterminer le rapport mutuel entre les plus grandes excursions des branches différentes, c'est à dire, entre  $mm, nn, oo$ , &c. On ne pouvoit prévoir si ces rapports iroient en augmentant ou en diminuant; nos formules marquent que c'est en augmentant: car l'équation à la courbe (§ 10.) demande ici, qu'on substitue pour  $x$  la valeur déterminée; & si dans cette valeur on néglige le second terme, beaucoup plus petit que le premier, l'arc  $\frac{x}{l} \cdot \frac{b + l}{b + x} \cdot f \pi$  deviendra égal à  $(2m - 1) \frac{1}{2} \pi$ , dont le sinus est  $\pm 1$ : par conséquent les petites applicuées  $mm, nn, oo$ , &c. suivront à peu près le rapport des distances  $Em, En, Eo$  &c. Dans l'exemple du précédent article, les plus grandes excursions seront donc à peu près comme 10685, 12336, 14593, & 17865.

§. 18.





§. 18. Voilà donc une théorie complète sur les vibrations de cette nouvelle Classe de cordes, dont les épaisseurs varient en raison biquarrée réciproque des distances depuis le point  $a$ . C'est une propriété singulière, relativement à notre méthode, que ces cordes admettent, tout comme les cordes uniformes, une solution complète, qui renferme tous les ordres de vibration, tandis que cette même méthode ne fournit, généralement parlant, pour chaque corde qu'un seul ordre de vibration, susceptible de calcul, de sorte qu'on ne sauroit trouver aucune relation entre les différens ordres de vibration d'une seule & même corde: de plus ces mêmes cordes, comme pour ne céder en rien aux cordes ordinaires, sont douées de cette autre remarquable propriété, qu'étant ébranlées suivant les différens ordres, la durée de chaque vibration soit réciproquement proportionnelle à l'exposant de l'ordre ou au nombre  $f$ , de sorte que dans le tems d'une vibration fondamentale il se fait précisément 2, 3, 4 &c. vibrations pour les ordres qui suivent; c'est là l'unique source, je le répète, des nouvelles propriétés qu'on a démontrées sur les vibrations des cordes uniformément épaisses, qui ne font qu'un simple cas des nouvelles cordes que je viens d'exposer. Je ferai encore mieux sentir cette vérité (incontestable mais trop abstraite pour être épluchée de tous les Géomètres avec toute l'attention requise,) quand j'aurai examiné encore une autre espèce de cordes digne de notre attention.

§. 19. Après que j'eus remarqué cette propriété sur la durée des vibrations de tous les différens ordres, commune aux cordes uniformes & aux nouvelles cordes que je viens de commenter, j'étois fort curieux de savoir si cette même propriété ne seroit pas généralement vraie pour toutes les cordes, quelle que fut la loi de leur épaisseur variable; c'est sur quoi je ne pouvois encore porter aucun jugement, faute de solution complète pour d'autres cordes: car j'ai déjà fait remarquer, que notre méthode, hors de quelques cas particuliers, n'est propre qu'à résoudre le problème pour un seul ordre de vibration, sans indiquer la nature des autres ordres pour la même corde. J'étois donc réduit à rechercher ces cas où le change-





ment de l'ordre de vibration ne fait pas changer la corde ; j'ai vu aussitôt que je satisferois à cette condition en faisant dans l'équation finale du §. 6. évanouir le dernier terme, c'est à dire, en supposant

$$ddq = 0 \quad \text{ou bien} \quad q = \frac{b+x}{b}, \text{ ce qui nous a donné la théo-}$$

rie pour les ordres dont les épaisseurs sont réciproquement proportionnelles aux biquarrés des distances  $b+x$ . Mais, outre cette fonction de  $q$ , il y en a heureusement encore une autre, qui satisfait à la même condition, & qui nous fera bientôt voir, que la propriété en question sur la durée des vibrations de différens ordres n'est pas générale.

§. 20. Si nous partons encore de l'équation finale du §. 6. il est facile de prévoir, qu'au lieu de faire évanouir le dernier terme en faisant  $ddq = 0$  ou  $q = \frac{b+x}{b}$ , on pourra, pour arri-

ver au même but, identifier ce que les deux termes qui expriment la valeur de  $\frac{\sigma}{e}$  ont de variable; c'est dans cette vue que je sup-

poserai la fonction arbitraire  $q = \sqrt{1 + \frac{xx}{bb}}$ . Si là dessus

nous procédons comme au §. 11. nous trouverons  $\frac{ddq}{qdx^2} = \frac{bb}{(bb+xx)^2}$

&  $\frac{1}{q^3} = \frac{b^4}{(bb+xx)^2}$ , & puis  $\int \frac{dx}{qq} = b \text{ Arc. tang } \frac{x}{b}$ :

par conséquent (§. 6.)  $S \frac{dx}{qq} = b \text{ Arc. tang } \frac{l}{b}$ : mettons, pour sim-

plifier nos formules,  $g\pi$  à la place de  $\text{Arc. tang } \frac{l}{b}$  & nous au-

rons



rons  $S \frac{dx}{qq} = g \pi b$ . Substituons toutes ces valeurs dans l'équation finale du §. 6. & nous aurons

$$\frac{\sigma}{e} = \frac{ff - gg}{gg} \times \frac{n L b b}{(b b + x x)^2}.$$

Si dans cette équation nous faisons  $x = 0$ , & par conséquent  $\sigma = e$ , elle donne  $1 = \frac{ff + gg}{gg} \times \frac{n L}{b b}$  & de là nous tirons

$$n = \frac{ff + gg}{gg} \times \frac{b b}{L}; \text{ c'est ici la valeur du pendule simple}$$

isochrone avec les vibrations de la corde, quel que soit l'ordre de ces vibrations: & si nous la substituons dans la précédente équation,

$$\text{nous aurons simplement } \frac{\sigma}{e} = \frac{b^4}{(b b + x x)^2}: \text{ on voit donc}$$

que les épaisseurs de la corde sont ici réciproquement proportionnelles aux quarrés de la quantité  $b b + x x$ , & que par conséquent elles sont indépendantes, soit des longueurs de la corde, soit de l'ordre de ses vibrations. C'étoit là surtout ce que je m'étois proposé, & ce qui nous met en état de déterminer pour ces cordes toutes les questions qu'on peut faire. Nous les examinerons après que nous aurons exposé la courbure que ces cordes prennent pendant qu'elles font leurs vibrations. L'équation générale pour ces courbures se trouve à la fin du §. 6; dans cette dernière il n'y a plus qu'à substituer pour  $q$  pour

$\int \frac{dx}{qq}$ , & pour  $S \frac{dx}{qq}$  les valeurs que nous venons d'indiquer, après

$$\text{quoi on aura } y = \frac{\alpha \sqrt{(b b + x x)}}{b} \sin \frac{\text{arc. tang } \frac{x}{b}}{\text{arc. tang } \frac{l}{b}} f \pi.$$



Remarquons d'abord ici qu'en donnant à la ligne arbitraire  $b$  une valeur infinie, on peut supposer  $\text{arc. tang } \frac{x}{b}$ , &  $\text{Arc. tang } \frac{l}{b} = \frac{x}{b}$ , &  $\frac{l}{b}$ ; par conséquent  $g\pi = \frac{l}{b}$ , &  $gb = \frac{l}{\pi}$ ; après quoi on trouve pour ce cas particulier  $\frac{\sigma}{e} = 1$ ;  $n = \frac{ll}{ff\pi\pi L}$ , &  $y = a \sin \frac{x}{l} f\pi$ . De là encore toute la théorie des cordes uniformément épaissies. Examinons encore les vibrations de cette nouvelle espèce des cordes.

§. 21. Mon dessein principal étoit de trouver une autre espèce de cordes, qui admit une théorie complète pour tous les ordres de vibration, afin de pouvoir comparer ensemble les longueurs du pendule simple isochrone pour chaque ordre, & de voir si ces longueurs sont toujours réciproquement proportionnelles aux quarrés du nombre  $f$ . Cette question étoit fort essentielle. Si ladite proportion subsistoit toujours, la théorie sur les vibrations des cordes par la combinaison de leurs différens ordres seroit tout à fait générale; mais je ne m'attendois pas à une telle propriété parce que je connoissois déjà un grand nombre d'autres corps sonores, que je savois bien s'écarter de cette loi sur les tons harmoniques pour les différens ordres de vibration; l'événement m'a fait voir que je ne me suis pas trompé, puisque les longueurs du pendule isochrone sont réciproquement proportionnelles aux nombres  $ff$  —  $gg$ , & non aux nombres  $ff$ . Soit, par exemple,  $g = \frac{1}{4}$ , & qu'on prenne pour  $f$  successivement les nombres naturels, les pendules isochrones iront comme  $\frac{1}{1^2}$ ,  $\frac{1}{2^2}$ ,  $\frac{1}{3^2}$ , &c. & les durées des vibrations comme  $\frac{1}{\sqrt{15}}$ ,  $\frac{1}{\sqrt{63}}$ ,  $\frac{1}{\sqrt{143}}$  &c.

De là on peut conclure, qu'en combinant ensemble deux ou plusieurs ordres, on n'obtient, généralement parlant, aucun retour périodique de



de l'état primitif semblable à celui que j'ai démontré, non seulement pour les cordes uniformément épaisses, mais encore pour celles dont les épaisseurs diminuent en raison biquarrée réciproque des distances  $b + x$ , retours périodiques, qu'on a assez mal à propos confondus avec les vibrations fondamentales, quoique les uns & les autres reviennent, comme par hasard, au même. Mais je ne disputerai pas sur les mots, & je ne veux rien déroger à la beauté du nouveau théorème que nous devons à M. d'Alembert. Je souhaiterois seulement qu'on l'envisagât sous son vrai point de vue.

§. 22. Le peu que j'ai dit au §. 20. nous met en état de répondre à toutes les questions semblables à celles que nous avons traitées depuis le commencement du §. 11. jusqu'à la fin du §. 18. sur les cordes qui sont exprimées par l'équation  $\frac{\sigma}{e} = \frac{b^4}{(b + x)^4}$ . Je n'entrerai pas dans ce nouveau détail, & je me contenterai d'ajouter ici un seul exemple afin de faire voir l'application de nos formules.

Si AE représente encore l'arbitraire constante  $b$ , & AC la longueur de la corde  $l$ , nous supposons  $AC = AE$ , ou  $l = b$ . Dans cet exemple nous aurons  $\text{arc. tang } \frac{l}{b}$  égal à la quatrième partie de la demi-circonférence  $\pi$ , & par conséquent  $g = \frac{\pi}{4}$ . De là nous tirons  $n = \frac{1}{16ff - 1} \times \frac{ll}{L}$ , ce qui donne successivement pour les différens ordres  $n = \frac{1}{13} \cdot \frac{ll}{L}$ ;  $n = \frac{1}{23} \cdot \frac{ll}{L}$ ;  $n = \frac{1}{43} \cdot \frac{ll}{L}$  &c. on aura aussi pour équation à la courbe

$$y = \frac{aV(bb + xx)}{b} \sin 4f \text{ arc. tang. } \frac{x}{b}.$$

Si



Si on suppose  $l = a$ , on aura  $\text{arc. tang } \frac{l}{b} = \frac{1}{2}\pi$ , donc  $g = \frac{1}{2}$ ,

&  $n = \frac{1}{4ff - 1} \times \frac{bb}{L}$ , & par conséquent d'une valeur finie;

le ton du second ordre sera le même que celui du premier ordre lorsqu'on fait  $l = b$ . Si nous reprenons ce cas de  $l = b$ , & que nous nous proposons, par exemple, pour le quatrième ordre les noeuds M, N, & O, il faut dans l'équation à la courbe faire successi-

vement  $\sin \frac{\text{arc. tang } \frac{x}{b}}{\text{arc. tang } \frac{b}{b}} \cdot f\pi$ , ou bien en ce cas,  $\sin 4f \text{ arc. tang } \frac{x}{b}$ ,

ou enfin  $\sin 16 \text{ arc. tang } \frac{x}{b} = 0$ , & par conséquent  $16 \text{ arc. tang } \frac{x}{b} = \pi$ , ou  $2\pi$ , ou  $3\pi$ . Ces trois équations donneront  $x =$

$b \text{ tang. arc. } \frac{\pi}{16}$ ;  $x = b \text{ tang. arc. } \frac{2\pi}{16}$ , &  $x = b \text{ tang. arc. } \frac{3\pi}{16}$ ,

Si à ces trois équations on ajoutoit la quatrième  $x = b \text{ tang. arc. } \frac{4\pi}{16}$ ,

on auroit simplement  $x = b$ , qui répond au point C. De cette manière on trouve  $AM = 0,19891b$ ;  $AN = 0,41321b$ , &  $AO = 0,66817b$ . Donc  $AM = 0,19891b$ ;  $MN = 0,21430b$ ;  $NO = 0,25496b$ , &  $OC = 0,33183b$ . Je ne pousserai pas plus loin l'examen des vibrations de cette dernière classe de cordes; mais je ne saurois m'empêcher de faire encore une réflexion sur la combinaison ou composition de différens ordres de vibrations mêlées ensemble.



§. 23. Servons nous encore de notre dernier exemple, où  $l = b$ ; nous aurons pour équation à la courbe

$$y = a \frac{V(bb + xx)}{b} \sin 4f \arctan \frac{x}{b}.$$

Si nous prenons pour  $f$  la suite des nombres naturels, pour avoir tous les ordres possibles, & que nous supposions tous les ordres de vibration coëxister ensemble, nous aurons cette équation générale,

$$y = \frac{V(bb + xx)}{b} \left( \alpha \sin 4 \arctan \frac{x}{b} + \epsilon \sin 8 \arctan \frac{x}{b} + \gamma \sin 12 \arctan \frac{x}{b} + \&c. \right)$$

où  $\alpha$ ,  $\epsilon$ ,  $\gamma$  &c. marquent de petites lignes constantes, d'autant plus grandes que les excursions de chaque ordre sont plus grandes. On peut retenir de ces coefficients tels qu'on veut, & faire tous les autres  $= 0$ . Pour nous exprimer avec plus de précision, supposons simplement un mélange des deux premiers ordres. Je dis, lorsque tous les points de la corde courbée suivant la loi

$$y = \frac{V(bb + xx)}{b} \left( \alpha \sin 4 \arctan \frac{x}{b} + \epsilon \sin 8 \arctan \frac{x}{b} \right),$$

partent au même instant, quand les vibrations dureroient un tems quelconque, jamais il n'arriveroit que la corde reprenne son état primitif. il n'y auroit aucune période ou retour pour la même configuration à attendre. Les trois grands Géomètres qui ont traité cette matière pour les cordes uniformément épaisses, envisageroient donc ces vibrations absolues comme irrégulières; elles sont cependant bien régulières, puisqu'elles ne sont qu'un mélange de deux espèces de vibrations simples & régulières. Cette réflexion conserve toute sa force lorsqu'on suppose le premier ordre mêlé avec le quatrième, ou le cinquième &c. il faudroit toujours taxer d'irrégularité les vibrations résultantes, quoique composées de vibrations régulières. Cependant il y a des cas particuliers & isolés qu'il faudroit par une considération non moins forcée réhabiliter; qu'on fasse coëxister les vibrations du







premier & du soixante-unième ordre, je dis que la corde se remettra dans l'état primitif après chaque vibration fondamentale; car dans le tems d'une vibration du premier ordre, il se fera précisément 63 vibrations du soixante-unième ordre; alors on seroit réduit à considérer les vibrations résultantes, comme des vibrations régulières simples, quoiqu'elles soient manifestement composées, puisqu'elles le sont dans les autres cas. On peut dire la même chose, lorsqu'on fait  $f = 3781$ , la corde faisant pour cet ordre précisément 3905 vibrations dans le tems d'une vibration fondamentale. Pour éviter donc de pareilles incongruités & défauts d'analogie, ne vaut-il pas mieux d'adopter le seul & vrai principe de la composition de vibration. Ce principe est général, sans contredire, pour les cordes uniformément épaisses; & nous venons de voir que son application s'étend jusqu'aux cordes inégalement épaisses, qu'on n'avoit pas encore examinées.

Ceux qui voudront après moi embrasser ce dernier sujet, trouveront un champ bien fertile à cultiver. Je suis sûr qu'ils sauront en tirer de nouveaux fruits, puisque le seul lemme du §. 4. nous en a tant fourni.









S U R  
**LE MOUVEMENT D'UNE CÔRDE**  
**QUI AU COMMENCEMENT N'A ÉTÉ ÉBRANLÉE**  
**QUE DANS UNE PARTIE,**  
**P A R    M.    E U L E R.**

---

I.

**J**e crois que l'évolution de ce cas, où la corde n'a été d'abord ébranlée que dans une de ses parties, sera très propre à dissiper tous les doutes, que Mrs. Bernoulli & d'Alembert ont suscités contre ma Théorie des cordes vibrantes, & ceux que M. de la Grange a le premier proposés dans les Actes de la nouvelle Académie de Turin. Car l'un & l'autre de ces illustres Adversaires est obligé de reconnoître que ce cas n'est pas renfermé dans leurs solutions du probleme des cordes vibrantes: & partant, si ma méthode en fournit une solution, & même une telle, qui est confirmée par l'expérience, il n'y aura plus aucun doute que cette méthode ne soit fondée dans la vérité, & beaucoup plus générale que celle d'où les Adversaires ont tiré leur solution du probleme des cordes vibrantes.

2. Or, pour écarter tous les doutes sur la généralité de ma méthode, il faut remarquer qu'on convient de part & d'autre, que ce probleme ne sauroit être résolu, que dans les cas où les éloignemens de la corde de sa situation naturelle sont quasi infiniment petits, & outre cela encore l'inclinaison de chacun de ses élémens infiniment petite. Cette condition est absolument nécessaire, puisqu'on est obligé de supposer dans la solution, que chaque point M de la corde AMB se meut toujours sur l'appliquée MP perpendiculaire à la situation naturelle APB; ce qui ne sauroit arriver, à moins que toutes

Planche V.  
Fig. 1.



ces appliquées  $PM$  ne soient infiniment petites, & que les tangentes aux points  $M$  ne soient infiniment peu inclinées à la droite  $APB$ , afin que l'élément de la courbe  $Mm$  puisse partout être regardé comme égal à l'élément correspondant de l'abscisse  $Pp$ .

Fig 2.

3. Pour se former une juste idée de telles courbes, propres à représenter la figure d'une corde pendant son mouvement de vibration, on n'a qu'à construire sur la ligne  $AB$  une courbe quelconque  $AMB$ , qui n'ait nulle part une tangente perpendiculaire à l'axe  $AB$ ; alors, une telle courbe étant décrite, qu'on diminue toutes ses appliquées  $PM$  en raison d'un nombre infini  $i$  à l'unité, de sorte que  $PM : PM = i : 1$ , & par ce moyen on obtiendra la courbe  $AMB$ , que la corde  $AB$  pourra recevoir dans son mouvement: puisque non seulement chaque appliquée de la courbe  $AMB$  mais aussi l'inclinaison de chaque élément  $Mm$  à l'axe  $AB$ , devient infiniment petite. Au reste, on comprend aisément que le mot d'infini ne doit pas ici être pris à la rigueur, & qu'il suffit que le nombre  $i$  soit très grand. De cette manière, toute courbe décrite sur l'axe  $AB$ , pourvu qu'elle n'ait nulle part une tangente perpendiculaire à l'axe, fournit une courbe propre à représenter la figure de la corde  $AB$  pendant son mouvement de vibration.

4. Ici se présente d'abord cette question: si toutes ces courbes sont également propres à représenter la figure d'une corde pendant son mouvement? ou s'il y a encore quelque autre condition qu'il est nécessaire d'y ajouter? M. d'Alembert soutient qu'aucune autre figure ne sauroit convenir aux cordes vibrantes, que celles qui sont contenues dans cette équation:

$$y = A \sin \frac{\pi x}{a} + B \sin \frac{2\pi x}{a} + C \sin \frac{3\pi x}{a} + D \sin \frac{4\pi x}{a} + \&c.$$

où  $a$  marque la longueur de la corde  $AB$ ,  $x$  une abscisse quelconque  $AP$ ,  $y$  l'appliquée  $PM$ ,  $\pi : 1$  le rapport de la périmétrie ou diamètre, & les lettres  $A, B, C, D$  &c. des coefficients infiniment petits.



petits. Donc, s'il arrivoit qu'on eût imprimé à la corde au commencement une figure qui ne seroit pas contenue dans cette équation, il seroit aussi impossible d'en déterminer le mouvement par le calcul.

5. M. d'Alembert convient donc, qu'on pourroit donner aux cordes une infinité de figures initiales, qui ne seroient pas comprises dans cette équation; mais, dans ces cas, il nie que la Théorie soit suffisante pour déterminer le mouvement dont les cordes seront agitées après avoir été relâchées. La raison qu'il en donne est, que dans ces cas il se trouveroit quelque élément où l'équation différentielle du second degré, tirée de la Théorie, ne sauroit plus avoir lieu, vu qu'il y auroit quelque particule qui n'évanouiroit plus par rapport aux autres quantités, comme on le suppose dans la Théorie; de sorte que dans cet élément on commettrait une erreur. Mais je réponds qu'une telle erreur commise dans un ou quelques élémens est toujours infiniment petite, & ne sauroit troubler le résultat total du calcul. En effet, quand on calcule le mouvement de quelque corps, on suppose partout l'accélération infiniment petite par rapport à la vitesse actuelle du corps: & quoique cette supposition soit fautive dans les premiers élémens où le mouvement est engendré, le calcul ne laisse point d'être très juste.

6. Le même inconvénient se rencontre presque dans toutes les applications du calcul intégral: quand il s'agit de trouver l'aire  $APM$  par la formule  $\int y dx$ , on y suppose que le vrai élément de cette aire étant le trapeze  $PMmp$ , le triangle  $Mmn$  est infiniment petit par rapport au rectangle  $PMnp = y dx$ : ce qui cependant n'est pas vrai dans le premier élément en  $A$ , à moins que la tangente en  $A$  ne convienne avec l'axe. Voudroit-on pour cela soutenir, que la formule intégrale  $\int y dx$  ne sauroit être appliquée à des courbes, dont la tangente au commencement  $A$  ne convient point avec l'axe même? Or il me semble qu'il en est de même des scrupules que M. d'Alembert élève contre ma solution du problème des cordes vibrantes: vu que toutes ses difficultés ne tombent que sur les deux derniers

Fig. 1.



Elémens de la corde : je ne nie pas, qu'en y appliquant le calcul, on ne commette quelque erreur ; mais je soutiens que dans la totalité cette erreur devient infiniment petite & tout à fait nulle.

7. La solution de M. Bernoulli revient aussi entièrement à l'équation rapportée ci dessus (§. 4.), & il soutient que quelque compliqué que soit le mouvement d'une corde, on le peut toujours envisager comme un assemblage de plusieurs oscillations régulières, qui se trouvent tant dans la corde entière que dans ses parties aliquotes, indépendamment les unes des autres. C'est de ce grand principe, qu'il a expliqué fort heureusement le phénomène bien singulier, que la même corde peut rendre à la fois plusieurs sons différens, qui sont entr'eux comme les nombres naturels 1, 2, 3, 4, 5 &c. De ce principe il s'ensuit, que quel que soit le mouvement d'une corde, à chaque instant sa figure doit être exprimée par ladite équation

$$y = A \sin \frac{\pi x}{a} + B \sin \frac{2\pi x}{a} + C \sin \frac{3\pi x}{a} + D \sin \frac{4\pi x}{a} \text{ \&c.}$$

& partant, puisqu'au commencement on peut avoir donné à la corde une figure quelconque, & que les figures qu'elle prend dans la suite à chaque instant, en dépendent nécessairement ; il soutient que toutes les figures possibles sont comprises dans cette même équation, & qu'il est même superflu de vouloir recourir à d'autres principes pour déterminer le mouvement d'une corde, en regardant comme donnée la figure qui lui a été imprimée au commencement.

8. En effet, puisque cette équation contient une infinité de coefficients A, B, C, D &c. dont chacun peut être déterminé à volonté, on les peut toujours déterminer en sorte que la courbe passe par une infinité de points donnés : d'où il semble qu'on ne sauroit décrire une ligne courbe, à laquelle cette équation ne puisse être appliquée. Mais, quand même j'accorderois à M. Bernoulli cette possibilité, il est bien clair que l'exécution seroit encore assujettie à des difficultés insurmontables. Car, ayant donné d'abord à la corde une cer-  
taine

raîne figure, il faudroit commencer par déterminer tous lesdits coefficients en sorte que l'équation réponde à une infinité de points de la figure, donnée; ce qui seroit sans contredire un ouvrage dont le plus habile, calculateur ne viendroit jamais à bout. Cependant, avant que d'avoir achevé cet ouvrage, il sera impossible de déterminer le mouvement de la corde: qui demeurera par conséquent toujours inconnu même au plus grand Géometre.

9. Je ne crois donc faire aucun tort au mérite de la solution de M. Bernoulli, quand je dis, qu'elle n'est pas suffisante pour déterminer le mouvement des cordes vibrantes en général, c'est à dire, après qu'on leur a imprimé une figure quelconque, & à cet égard il me semble qu'on doit accorder une grande préférence à ma methode & à celle de M. de la Grange. Puisque, quelle que soit la figure qu'on aura imprimée à la corde au commencement, quand même aussi elle ne seroit expressible par aucune équation, je suis toujours en état de déterminer son mouvement par une construction très simple & applicable à tous les cas possibles, sans qu'aucune circonstance en puisse arrêter le succès. Or cette même construction fournit aussi, pour les cas qui sont compris dans l'équation de M. Bernoulli, précisément les mêmes solutions que ce grand Géometre a données, & partant je ne vois aucune raison, pourquoi cette construction lui puisse paroître superflue, ou même suspecte.

10. Mais il me sera encore permis de douter, que toutes les figures possibles dont les cordes sont susceptibles, soient contenues dans l'équation rapportée, quoique le nombre de ses termes puisse être augmenté à l'infini. Entre plusieurs raisons que je pourrais alléguer pour justifier mes doutes, le cas que j'ai ici en vue, me semble fournir une preuve très convaincante. Car, supposant qu'on n'ait détourné au commencement qu'une partie de la corde AC de son état naturel, & qu'on lui ait donné la figure AMC, pendant que le reste CB est demeuré dans son état naturel & rectiligne, de sorte que la figure initiale ait été composée de la ligne

Fig. 3.

courbe





courbe AMC & de la droite CB, ce qui est facile d'exécuter: alors il sera sans doute très difficile, pour ne pas encore dire impossible, de déterminer les coefficients de l'équation de M. Bernoulli, en sorte qu'elle exprime cette figure mixte d'une ligne courbe quelconque AMC & d'une droite CB. Il semble aussi par la dernière lettre de M. Bernoulli lui-même, qu'il regarde ce cas, comme non compris dans sa solution, sans parler des difficultés que la détermination des coefficients renfermeroit.

11. Mais il y a plus: le mouvement de cette corde ne sauroit en aucune manière être envisagé comme un assemblage ou mélange de plusieurs oscillations simples & régulières; en quoi consiste l'essence de la solution de M. Bernoulli. Car, au premier instant après le relâchement de la corde, la seule partie AMC sera mise en mouvement, tandis que le reste CB demeure encore absolument immobile, & sans aucun mouvement d'oscillation, pour lequel on puisse assigner la longueur du pendule isochrone. Il est vrai que, bientôt après, le mouvement sera aussi successivement communiqué à la partie CB, mais alors d'autres parties seront réduites en repos, & il n'y sauroit plus être question des pendules simples isochrones aux mouvemens de toutes les parties de la corde. Le mouvement de la corde sera d'une nature tout à fait différente, qui ne sauroit être représentée comme un mélange de plusieurs oscillations simples & régulières, conformément au principe de M. Bernoulli.

12. Voilà donc un cas bien incontestable, auquel la solution de M. Bernoulli est absolument inapplicable; & puisque ce cas a lieu toutes les fois que la corde n'a pas été ébranlée par toute sa longueur, il y faut reconnoître une infinité de cas non compris dans la solution de M. Bernoulli. Delà on sera aussi obligé de m'accorder que, quand même la corde aura été ébranlée par toute son étendue, il y aura encore une infinité de cas qu'il faut également exclure de cette solution, leur mouvement se réglant sur des principes





eipes entierement différens. Par conséquent, quelque ingénieuse que soit la solution de M. Bernoulli, on ne la sauroit regarder que comme une solution très particulière, qui ne s'étend qu'à de certaines especes de vibrations, qu'on peut nommer régulières, pendant qu'une infinité d'autres especes irrégulières en sont absolument exclues.

13. Cependant la construction générale que j'ai donnée autrefois pour le mouvement des cordes vibrantes, s'étend également à toutes ces especes tant irrégulières que régulières; & pour le tems présent où l'on continue de combattre ma construction en la regardant, ou comme fautive, ou superflue, je crois qu'il sera fort intéressant; que j'en tire ici en détail la détermination du mouvement d'une corde qui n'a été ébranlée au commencement que dans une de ses parties. J'ai tout lieu d'espérer, que M. Bernoulli en reconnoitra la justesse, sur tout quand il verra le bel accord avec l'expérience; mais M. d'Alembert dira, sans doute, qu'il réfutera ma solution dans quelcun de ses ouvrages qu'il publiera dans la suite, & il se contentera pour le présent d'en avertir le public. Or, quoi qu'il en soit, je soumetts ma solution entierement au jugement du Public dans la confiance qu'elle sera approuvée au moins d'une partie, même avant que la réfutation paroisse.

14. Je commencerai donc par mettre devant les yeux ma construction du probleme des cordes vibrantes. Soit  $AB$  la corde dans sa situation naturelle, la longueur  $AB = a$ , son poids  $= M$ , & la force dont elle est tendue  $= F$ , en supposant la corde également épaisse par toute sa longueur. Qu'à cette corde on ait donné au commencement une figure quelconque  $AMB$ , dont, comme j'ai déjà remarqué, toutes les appliquées  $PM$  doivent être regardées comme infiniment petites. Cela posé, on demande, après qu'on aura subitement relâché la corde, quel sera son mouvement dans la suite? Il est évident que, pour résoudre cette question, il faut être en état d'assigner la figure de la corde pour chaque instant suivant. Or, posant que depuis le commencement il s'est écoulé un tems de  $t$

Fig. 4.



secondes, & que  $z$  marque la hauteur d'où les corps graves tombent dans une seconde ; si  $y$  marque l'appliquée qui répondra alors à l'abscisse  $AP = x$ , la Théorie que personne ne révoque en doute, fournit pour la valeur de  $y$  cette équation  $\left(\frac{dd y}{dt^2}\right) = -\frac{2Fag}{M} \left(\frac{dy}{dx^2}\right)$ , dont l'intégrale complète est sans contredit

$$y = \Gamma: \left(x + t\sqrt{\frac{2Fag}{M}}\right) + \Delta: \left(x - t\sqrt{\frac{2Fag}{M}}\right)$$

où les caractères  $\Gamma$  &  $\Delta$  indiquent des fonctions quelconques.

15. Pour construire cette équation, je prolonge la droite  $AB$  de part & d'autre, j'y prends les parties  $Ab$  &  $Ba = AB$ , & je décris sur elles  $AV'V''V'''b$  &  $Bv''v'''a$ , égales à la figure initiale de la corde  $AMB$ , mais dans une situation renversée, comme on peut le voir aisément en regardant la figure : d'où il est clair que ces courbes continuées auront en  $A$  &  $B$  leurs tangentes communes avec la courbe donnée. Dans la première construction, j'ai continué ces mêmes courbes de part & d'autre à l'infini, mais on verra bientôt, qu'il suffit de la décrire une fois de chaque côté. Or ces courbes nous serviront à déterminer la figure que la corde prendra à un tems quelconque écoulé depuis le commencement.

Pour cet effet, j'ajoute à la figure la ligne droite  $EF = \sqrt{\frac{2Fag}{M}}$ , qui servira de mesure du tems d'une seconde, & dont la longueur sera aisément déterminée par la formule  $\sqrt{\frac{2Fag}{M}}$  : ce qui nous met en état de représenter par une ligne droite chaque tems pour lequel on voudra connoître la figure de la corde.

16. Maintenant, si l'on veut savoir de chaque point de la corde  $P$ , à quelle distance il se trouvera de son lieu naturel sur l'appliquée  $PM$ , après un tems quelconque donné de  $t$  secondes, qu'on  
prenne



prenez sur l'axe de part & d'autre, du point P, les intervalles PT & Pt égaux à ce tems, ou bien à EF.  $t$ , & après y avoir tiré les appliquées TV &  $t''$ , l'appliquée cherchée pour le point P, que j'ai nommée  $y$ , sera toujours  $= \frac{1}{2} TV - \frac{1}{2} t''$ . Si le tems proposé  $t$  est plus grand, l'une ou toutes les deux appliquées doivent être prises dans les continuations où l'on doit tenir compte, si ces appliquées tombent en sens contraire: ainsi, après le tems  $PT' = Pt'$  on aura  $y = -\frac{1}{2} T'V' + \frac{1}{2} t'v'$ , & après le tems  $PT'' = Pt''$ , on aura  $y = -\frac{1}{2} T''V'' - \frac{1}{2} t''v''$ , & ainsi de suite. De là on connoitra aussi aisément le mouvement de chaque point de la corde P pour un tems proposé quelconque, puisqu'on trouve par cette construction, de combien change son lieu d'un instant à l'autre. Ainsi rien n'est plus aisé que de déterminer le mouvement tout entier de la corde, quelle qu'ait été sa figure initiale AMB.

17. Pour prouver la vérité de cette construction, je n'ai qu'à en montrer le parfait accord avec l'équation fournie par la théorie, & avec les conditions que la nature de la question renferme. Or d'abord, il est évident que cette construction donne pour le premier instant la même figure AMB qu'on suppose avoir été imprimée à la corde; & on en voit aussi que tous les points de cette courbe ne changent point de place au premier instant, ou bien que le mouvement commence du repos, comme on le suppose dans le problème. Ensuite, l'une & l'autre extrémité de la corde A & B demeurera constamment en repos; car, en prenant de A ou de B sur l'axe de part & d'autre des abscisses égales, les appliquées  $y$  sont aussi toujours égales & l'une négative de l'autre, de sorte que leur somme est constamment  $= 0$ ; c'est aussi la raison, pourquoi la courbe AMB a été continuée de part & d'autre de la manière qui a été expliquée ci-dessus; & puisque les deux points A & B demeurent toujours nécessairement en repos, il est impossible de supposer à la courbe AMB d'autres continuations que celles que je viens d'établir.



18... Maintenant rien n'empêche qu'on n'envisage la courbe AMB avec toutes ses continuations que je viens de lui donner, comme une seule courbe où il n'importe si la ligne AMB est une courbe régulière renfermée dans quelque équation, ou si c'est une courbe irrégulière décrite à la main, la régularité n'entrant ici pour rien en compte. Et partant, prenant une abscisse quelconque AT, l'appliquée TV qui lui répond pourra être regardée comme une fonction de AT, & indiquée en sorte  $TV = \Delta: AT$ . Cela remarqué, soit pour abréger la ligne  $EF = \sqrt{\frac{2Fng}{M}} = c$ , & nommant l'appliquée  $= y$ , qui répond à l'abscisse  $AP = x$ , après le tems  $= t$  secondes, on prend dans la construction les intervalles  $PT = Pt = ct$ , d'où l'on a les abscisses  $AT = x - ct$  &  $At = x + ct$ ; & partant les appliquées  $TV = \Delta: (x - ct)$  &  $tv = \Delta: (x + ct)$ : de sorte que notre construction donne  $y = \frac{1}{2} \Delta: (x - ct) + \frac{1}{2} \Delta: (x + ct)$ : ce qui convient parfaitement avec l'équation principale  $\left(\frac{dy}{dt^2}\right) = cc \left(\frac{dy}{dx^2}\right)$ ; puis qu'on a

$$\left(\frac{dy}{dt}\right) = -\frac{c}{2} \Delta': (x - ct) + \frac{c}{2} \Delta': (x + ct); \quad \left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{1}{2} \Delta': (x - ct) + \frac{1}{2} \Delta': (x + ct)$$

&

$$\left(\frac{dy}{dt^2}\right) = \frac{cc}{2} \Delta'': (x - ct) + \frac{cc}{2} \Delta'': (x + ct) \quad \& \quad \left(\frac{dy}{dx^2}\right) = \frac{1}{2} \Delta'': (x - ct) + \frac{1}{2} \Delta'': (x + ct)$$

ce qui suffit pour prouver la justesse de ma construction.

Fig. 5.

19. Mais, pour puiser de cette construction une connoissance parfaite de tout le mouvement de la corde, il suffit de pousser les opérations exposées jusqu'au tems exprimé par la longueur de la corde AB, puisque alors la corde sera réduite à une figure AnmB semblable à celle qu'elle avoit au commencement, mais dans une situa-



situation renversée; de sorte qu'après ce tems le mouvement redevient semblable à celui du commencement. Pour prouver cela, prenons du point P les intervalles  $PT = Pt = AB$ : & après le tems de  $\frac{AB}{EF}$  secondes, le point P se trouvera en  $n$ , en sorte que  $Pn = \frac{1}{2}(TV + tv)$ . Or, prenant  $BQ = AP$ , à cause de  $AT = AQ$  &  $Bt = BQ$ , on aura en vertu de la construction  $TV = QN$  &  $tv = QN$ ; & partant  $Pn = QN$ ; d'où l'on voit que la courbe  $AnmB$  est semblable à  $BNMA$ . Par conséquent, quelle qu'ait été la figure initiale de la corde, il est certain qu'après le tems  $\frac{AB}{EF} = \sqrt{\frac{Ma}{2Fg}}$ , les mêmes phénomènes du mouvement reviennent, & qu'il suffit toujours de connoître le mouvement pour un tel intervalle de tems, à quoi les deux continuations  $Ab$  &  $Ba$  de la courbe initiale sont suffisantes.

*Solution du problème proposé.*

20. Soit comme auparavant la longueur de la corde  $AB = a$ , Planche VI.  
son poids  $= M$ , la force de sa tension  $= F$ , &  $g$  la hauteur d'où Fig. 6.  
les corps graves tombent dans une seconde: & que pour mesurer

le tems on prenne une ligne droite  $c = \sqrt{\frac{2Fag}{M}}$ , qui marque-

ra une seconde. Supposons maintenant, que cette corde n'ait été ébranlée au commencement que dans sa partie  $AC$ , à laquelle on ait donné la figure  $AMC$ , tandis que le reste  $CB$  a conservé sa figure naturelle & rectiligne, & qu'après avoir réduit la corde dans cet état forcé, on la relâche subitement. Cela posé, on demande, quel sera le mouvement dont la corde sera agitée dans la suite? Pour cet effet, on prendra sur la droite  $AB$  prolongée les intervalles  $Ab = Ba = AB$ , sur lesquels on décrira les courbes  $Amc$  &  $a\mu\gamma$ , semblables à la courbure initiale  $AMC$ , mais dans une situation renversée, pour avoir l'échelle des tems  $bcmAMCB\gamma\mu a$ ,



dont les parties,  $bc$ ,  $CB$  &  $By$ , conviennent avec l'axe même, de sorte que les appliquées dans ces espaces sont censées être nulles.

21. Maintenant, par la construction expliquée ci-dessus, il est aisé de déterminer le mouvement de chaque point de la corde. Ainsi le milieu  $D$  de l'espace ébranlé  $AC$  étant au commencement à la distance  $DM$ , s'approchera vers l'axe, & parviendra en  $D$  après le tems  $\equiv AD$ : de là il passera de l'autre côté de l'axe, & après le tems  $Dd \equiv 2AD$ , il se trouvera à la distance  $\frac{1}{2}dm \equiv \frac{1}{2}DM$ , d'où il retournera de nouveau vers l'axe, & reviendra en  $D$  après le tems  $Dc \equiv 3AD$ , où il demeurera en repos jusqu'au tems  $D\gamma \equiv BD + BC \equiv 2AB - 3AD$ , de sorte que la durée de ce repos est  $\equiv 2AB - 6AD \equiv 2AB - 3AC \equiv 2BC - AC$ .

De la même manière, le point  $C$  montera d'abord, & après le tems  $CD \equiv AD$ , parviendra à sa plus grande distance  $\equiv \frac{1}{2}DM$ , d'où il retournera en  $C$  après le tems  $CA \equiv 2AD$ : & de là il passera de l'autre côté de l'axe jusqu'à la distance  $\frac{1}{2}dm \equiv \frac{1}{2}DM$ , après le tems  $Cd \equiv 3AD$ ; ensuite il retournera en  $C$  après le tems  $Cc \equiv 4AD$ , où il reposera jusqu'au tems  $C\gamma \equiv 2BC \equiv 2AB - 2AC$ . Or un point quelconque  $P$  de la partie  $CB$  demeurera en repos pendant le tems  $PC$ , après quoi il prendra le même mouvement que le point  $C$ ; tant que la distance  $P\gamma$  est plus grande que  $Pc$ , ou bien  $PB + BC > AP + AC$ , ou  $BP > AC$ . Mais si  $BP < AC$  il recommence plutôt à se mouvoir.

22. De là nous pourrions assigner la figure de la corde après un tems écoulé quelconque depuis le commencement; dont je considérerai les principaux instans:

- Fig. 7. I. Après le tems  $AD$ , la corde aura la figure 7, où la partie  $AD$  est droite, & la courbure ne se trouve que dans la partie  $DcE$ , le point  $c$  étant dans la plus grande élongation.
- Fig. 8. II. Après le tems  $2AD$ , la corde aura la figure  $AdCcFB$ , les intervalles  $AD$ ,  $DC$ ,  $CE$ ,  $EF$  étant pris égaux; où les points





points *d* & *e* se trouvent dans leur plus grand éloignement de l'axe.

III. Après le tems 3 AD, la même courbure est avancée sur la partie DG, les parties AD & BG étant droites & en repos. Fig. 9.

IV. Après le tems 4 AD, la même courbure est avancée sur la partie CH, supposé que 4 AD soit encore plus petit que AB. Fig. 10.

V. Enfin, après le tems AB, la corde reçoit une figure ATNB semblable à la première, mais dans une situation renversée; après quoi les mêmes phénomènes reviennent, dont les périodes s'achevent dans le tems  $\equiv AB$ , ou bien de  $\sqrt{\frac{Ma}{2Fg}}$  secondes. Fig. 11.

23. On voit donc que ce mouvement est fort irrégulier, & qu'il n'y a aucune partie de la corde qui fasse des oscillations réglées qui puissent être comparées à celles d'un pendule simple, selon la manière de M. Bernoulli. Car chaque partie n'est ébranlée que pendant quelque tems, où même son mouvement n'est rien moins que semblable à celui de quelque pendule : & pendant un autre tems la même partie se trouve dans un repos parfait. M. Bernoulli m'avait objecté contre ce mouvement, que si une partie de la corde avoit été en repos pendant quelque tems, il n'y auroit point de raison pourquoi elle commenceroit à se mouvoir dans un sens plutôt que dans un autre. Mais on n'a qu'à suivre pas à pas la progression du mouvement, & ce doute évanouira de soi même : outre qu'on voit aussi dans la propagation du son par l'air, dont le calcul est fondé sur les mêmes principes, que les ébranlemens propagés ne se continuent que dans un sens, pendant que la première agitation se répand en tout sens.





*Considération du cas, où la corde n'a été ébranlée  
que dans son milieu.*

Fig. 12.

24. Soit AB encore la même corde que j'ai considérée jusqu'ici, dont au commencement la partie du milieu CD ait été détournée dans la courbe CMD, les deux autres parties AC & BD ayant été conservées dans leur état naturel; & que de cet état forcé la corde soit relâchée subitement. Donc, pour en déterminer le mouvement, je prolonge la corde de part & d'autre en  $a$  &  $b$ , en sorte que  $Ab = Ba = AB$ , & sur ces parties prolongées je décris dans une situation renversée les courbes  $cmd$  &  $\gamma\mu\delta$ , semblables à la courbe CMD. Pour rendre la chose plus claire, je supposerai chaque partie AC, CD, & BD, précisément le tiers de la corde entière AB. Ensuite, soit O le milieu tant de la corde que de la partie ébranlée CD, & je conçois la courbe CMD composée de deux parties égales & semblables, CM & DM. On voit bien que je ne fais ces suppositions que pour faciliter les constructions suivantes, & les rendre plus évidentes.

25. Concevons la corde divisée en six parties égales aux points E, C, O, D, F, & prenant la corde entière  $AB = a$ , pour exprimer le tems de  $\sqrt{\frac{Ma}{2Fg}}$  secondes, après chaque sixième partie de ce tems, la corde sera réduite aux figures suivantes:

Fig. 13.

I. Après le tems  $= \frac{1}{6} AB$ , les parties EO & FO seront courbées en haut, les éloignemens de l'axe n'étant que la moitié de ceux de la courbe CMD, & les parties AE & BF se trouveront encore en repos. L'angle en O ne doit pas choquer, puisque l'inflexion n'y est qu'infiniment petite.

Fig. 14.

II. Après le tems  $= \frac{2}{6} AB$ , ces deux courbures seront avancées jusques aux extrémités, & seront encore tournées en haut sur les parties AC & BD, la partie du milieu CD étant droite & en repos.



- III. Après le tems  $\equiv \frac{1}{2} AB$ , toute la corde se trouvera dans sa position naturelle & rectiligne, mais les parties AC & BD auront un mouvement pour se courber en bas, celle du milieu CD demeurant encore en repos. Fig. 15.
- IV. Après le tems  $\equiv \frac{2}{3} AB$ , les parties AC & BD seront effectivement courbées en bas, celle du milieu CD étant encore droite. Fig. 16.
- V. Après le tems  $\equiv \frac{3}{4} AB$ , ces deux courbures se rapprocheront vers le milieu O, les parties AE & BF étant droites & en repos. Fig. 17.
- VI. Enfin, après le tems  $\equiv AB$ , toute la corde se trouvera dans un état semblable à celui du commencement, mais dans une situation renversée. Fig. 18.

26. Ces deux cas ne laissent plus aucune raison de douter, que les cordes ne soyent susceptibles de mouvemens très irréguliers, qu'on ne sauroit comparer avec les oscillations d'un pendule, ni regarder comme un mélange de plusieurs vibrations simples & régulières. Dans ces cas donc, le son doit être très impur, & quasi varier à tout instant; cependant, puisque toujours après le tems  $\equiv \sqrt{\frac{Ma}{2Fg}}$ ,

la corde retourne dans le même état, & que ces périodes sont régulières, nonobstant les agitations irrégulières de chaque partie de la corde; le son principal de la corde sera néanmoins le même que si les vibrations étoient régulières, quoiqu'on y apperçoive quelque bruit fort désagréable. Cet accident ne doit pas être regardé comme uniquement attaché aux cas que je viens de développer, mais il est aussi très possible, lors qu'on ébranle la corde dans toute son étendue, ce que je me propose de faire encore voir, pour mettre la Théorie à l'abri de toute nouvelle objection.



Planche VII.  
Fig. 19.

*Développement du cas où la corde a reçu au commencement la figure A p q r s t B (Fig. 19.)*

27. Dans ce cas, je suppose l'intervalle AF deux fois plus grand que BF, & je divise toute la corde en six parties égales aux points C, D, E, F, G, pour rendre la construction plus évidente. Cette figure a donc deux ventres inégaux AF & BF; ce qui est sans contredit un cas qui ne sauroit être compris dans la solution de M. Bernoulli. Cependant on verra que ce mouvement participe beaucoup de celui que cet illustre Géometre a assigné aux cordes à deux ventres: la différence n'étant, sinon que le mouvement de chaque élément de la corde est irrégulier & tout à fait différent de celui d'un pendule. Mais, nonobstant cette irrégularité, toute la corde retourne à un état semblable à celui du commencement après le tems

$\sqrt{\frac{M a}{2 F g}}$  secondes, que j'exprime ici par la longueur de la corde AB:

or, pendant ce tems presque toutes les parties de la corde acheveront deux vibrations, mais qui sont d'autant plus inégales entr'elles, que les deux ventres du commencement AF, & BF, auront été inégaux entr'eux.

28. Ayant donc continué la figure initiale d'une manière renversée sur les parties prolongées Ab & Ba, ma construction fournira pour les instans principaux suivans les figures que je m'en vai rapporter:

- Fig. 20. I. Après le tems  $AC = \frac{1}{2} AB$ , la corde aura la figure représentée fig. 20. où le premier ventre s'étend jusqu'en G, & la partie BG est réduite dans sa situation naturelle rectiligne.
- Fig. 21. II. Après le tems  $AD = \frac{2}{3} AB$ , la partie AD est droite, & l'autre BD a un ventre courbé en haut.
- Fig. 22. III. Après le tems  $AE = \frac{3}{4} AB$ , les deux ventres deviennent égaux, l'un AE étant tourné en bas, & l'autre BE en haut.



- IV. Après le tems  $AF = \frac{1}{2} AB$ , il y a un ventre  $AF$  tourné en bas, & la partie  $BF$  est droite. Fig. 21.
- V. Après le tems  $AG = \frac{2}{3} AB$ , la partie  $AC$  est droite, & l'autre  $BC$  à un ventre tourné en bas. Fig. 24.
- VI. Après le tems  $AB$ , la corde reprend la figure du commencement, mais dans une situation renversée. Fig. 25.

29. Depuis le tems  $= AB$  la corde reprendra dans un ordre renversé les mêmes figures qu'elle a eues aux tems  $\frac{1}{2} AB$ ,  $\frac{2}{3} AB$  &c. & enfin après le tems  $= 2 AB$  elle se trouvera parfaitement rétablie dans son état premier (fig. 19.): pendant lequel tems elle aura achevé deux vibrations entières. Mais durant chaque vibration entiere, dont le tems est  $= AB$ , les différentes parties de la corde seront portées d'un mouvement tout particulier. Car le point  $C$  passe deux fois par l'axe, d'abord après le tems  $\frac{2}{3} AB$  & ensuite après le tems  $\frac{3}{4} AB$ , la différence étant  $= \frac{1}{4} AB$ . Mais quoique ce point  $C$  demeure après le premier passage au dessous de l'axe pendant le tems  $= \frac{1}{4} AB$ , après le second passage il ne demeure au dessus de l'axe que pendant le tems  $\frac{2}{3} AB$ . Ensuite il se trouvera encore au dessous pendant le tems  $\frac{2}{3} AB$ , mais depuis il s'arrêtera au dessus pendant le tems  $\frac{1}{4} AB$ : de sorte que les intervalles de tems entre les passages successifs du point  $C$  par l'axe sont comme les nombres 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 &c. & partant ce point paroitra, pendant le tems  $2 AB$ , achever 4 vibrations, mais inégales entr'elles.

30. Une semblable irrégularité regne aussi entre les passages successifs par l'axe  $AB$ , du point  $G$ , mais les points  $D$  &  $F$  demeurent pendant des intervalles de tems égaux  $= \frac{1}{2} AB$  alternativement au dessus & au dessous de l'axe, de sorte que ces deux points semblent achever 3 vibrations pendant le tems  $= 2 AB$ . Pour le point du milieu  $E$ , il demeure toujours pendant un tems  $= AB$  au-dessus & d'autant au dessous de l'axe. Donc pendant que la corde entiere rend un certain son principal, quelques uns de ses élé-



mens sembleront rendre un ton plus haut d'une octave, d'autres donneront un ton plus haut d'une quinte: tandis que d'autres produisent le même son principal. Cependant il faut bien remarquer que, dans ce cas, l'octave produite par les points C & G est très impure, puisque les intervalles de tems que ces points demeurent successivement au dessus & au dessous de l'axe, sont fort inégaux entr'eux, puisque ce ne sont que les termes  $= 3$  de la serie 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4 &c. qui s'accordent avec l'octave, tandis que les termes 2 & 4 concourent à produire la quinte & la douzieme.

31. De là on jugera aisément, quelles irrégularités doivent se trouver dans le mouvement des cordes, lorsque la figure initiale aura plusieurs ventres inégaux entr'eux: lesquelles n'empêcheront pas pourtant, que le mouvement dans sa totalité ne soit très régulier: on comprendra aussi que plusieurs tels mouvemens peuvent être réunis ensemble dans la même corde, & cela de la même manière que M. Bernoulli a fait voir, que plusieurs mouvemens réguliers s'y peuvent trouver à la fois. D'où il faut conclure, que la solution de M. Bernoulli ne renferme que les mouvemens réguliers, qui peuvent avoir lieu dans les cordes vibrantes: & on ne sauroit plus douter que les cordes ne soient susceptibles d'une infinité d'autres mouvemens irréguliers, que ma méthode découvre tous sans aucune difficulté. Cette même conclusion regarde aussi M. d'Alembert, entant qu'il prétend que l'Analyse ne s'étend qu'à la détermination des mouvemens réguliers, quoiqu'il n'en nie pas l'existence.

32. Mais cette même circonstance, qu'on a trouvé moyen d'appliquer l'Analyse à des cas, qui en ont paru entièrement exclus, semble mériter l'attention de tous les Géometres. Jusqu'ici on n'a pas cru que l'Analyse fut applicable à des lignes courbes mécaniques, qui ne sauroient être renfermées dans aucune équation, ou qui sont destituées de toute loi de continuité. Cela est bien vrai à l'égard de cette partie de l'Analyse qui ne s'occupe qu'à des fonctions d'une seule quantité variable, à laquelle on s'est presque uni-  
que-



quement appliqué jusqu'ici : mais dès qu'on traite des fonctions de deux ou plusieurs variables, comme dans le cas des cordes vibrantes, l'appliquée  $y$  doit être considérée comme une fonction non seulement de l'abscisse  $x$ , mais aussi du tems  $t$ ; cette partie de l'Analyse est très essentiellement différente de la précédente, & s'étend même à des fonctions destituées de toute loi de continuité. Cette partie, dont nous ne connoissons presque encore que les premiers élémens, mérite sans doute que tous les Géomètres réunissent leurs forces pour la cultiver.

## DÉMONSTRATION RIGOUREUSE

DE LA CONSTRUCTION OU PROBLEME DES CORDES  
VIBRANTES.

33. D'abord, j'envisage le probleme des cordes vibrantes sous ce point de vue, *que la figure qu'on a imprimée au commencement à la corde, étant donnée, il faut déterminer le mouvement que recevra la corde après avoir été relâchée subitement*: où l'on suppose, que la figure initiale ne s'écarte qu'infinitement peu de son état naturel & rectiligne. Avec cette restriction, je regarde la figure initiale comme une courbe quelconque, sans me mettre en peine, si elle peut être exprimée par quelque équation, ou si elle est décrite d'une manière irrégulière quelconque. Dans l'un & l'autre cas, il est également certain que, dès que la corde sera relâchée, elle sera aussi mise en mouvement; & la recherche de ce mouvement doit être regardée sans doute comme un probleme très réel, qui mérite à tous égards l'attention des Géomètres. Si l'Analyse est suffisante à le résoudre ou non? c'est une question tout à fait étrangère; & si la solution est impossible en général, l'impossibilité ne se manifestera que trop tôt dans les recherches qu'on doit entreprendre pour arriver à la solution.

34. Soit donc la longueur de la corde  $AB = a$ , que je suppose par tout également épaisse, son poids  $= M$ , & la force dont

Fig. 26.





dont elle est tendue  $= F$ . Cela posé soit  $AMB$  la figure, qu'on a d'abord imprimée à la corde, & qu'après un tems quelconque de  $t$  seconde elle ait été réduite à la figure  $AYB$ , qui comme l'initiale doit nécessairement passer par les deux termes  $A$  &  $B$ , où la corde est fixée. Donc, posant pour cette courbe  $AYB$  une abscisse quelconque  $AX = x$ , & l'appliquée  $XY = y$ , il est évident que  $y$  sera une certaine fonction tant de l'abscisse  $AX = x$  que du tems  $t$ , de sorte que l'appliquée  $y$  doit être considérée & traitée comme une fonction des deux variables  $x$  &  $t$ , d'où l'on comprend ce que signifient ces formules différentielles  $\left(\frac{dy}{dx}\right)$ ,  $\left(\frac{dy}{dt}\right)$  &  $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)$ ,  $\left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)$ .

Il est bon de remarquer ici, que la formule  $\left(\frac{dy}{dt}\right)$  exprime la vitesse dont le point  $Y$  s'éloigne de l'axe, & que cette vitesse est déterminée par l'espace qui en seroit parcouru dans une seconde.

35. Pour déterminer la nature de cette fonction  $y$ , les principes de Mécanique fournissent cette équation différentielle du second degré  $\left(\frac{d^2y}{dt^2}\right) = \frac{2Fag}{M} \left(\frac{dy}{dx^2}\right)$ , où  $g$  marque la hauteur d'où un corps pesant tombe dans une seconde. Je ne m'arrête point à démontrer cette formule, puisqu'elle est reconnue juste de tous ceux qui ont traité cette matière, sans aucune contestation. Aussi l'intégration ne sauroit être révoquée en doute, d'autant plus que M. d'Alembert lui-même en est le premier Inventeur. Or, posant pour abrégé  $\frac{2Fag}{M} = cc$ , l'intégrale complète de cette équation est  $y = \Gamma: (x + ct) + \Delta: (x - ct)$  où les caractères  $\Gamma$  &  $\Delta$  marquent des fonctions quelconques des quantités  $x + ct$  &  $x - ct$ . Cette double universalité est introduite par la double intégration qui y a conduit. Car, dans ces sortes d'intégrations, telles fonctions indéterminées tiennent lieu des constan-





constantes arbitraires, que les intégrations ordinaires renferment. Ce qui distingue essentiellement l'intégration des fonctions à deux variables de celles qui n'en renferment qu'une seule.

36. On ne sauroit se former une plus juste idée d'une telle fonction générale qu'en concevant une courbe quelconque, décrite sur l'axe  $AB$ , où prenant une abscisse égale à  $x + ct$  ou à  $x - ct$ , l'appliquée représentera la dite fonction. Ainsi on n'aura qu'à concevoir deux telles lignes courbes, l'une pour représenter la fonction marquée par le caractère  $\Gamma$ , & l'autre pour celle du caractère  $\Delta$ ; j'emploierai ces mêmes caractères pour désigner ces deux courbes. Ayant donc décrit deux telles lignes courbes  $\Gamma$  &  $\Delta$  sur l'axe  $AB$ , qu'on prenne dans la première  $\Gamma$  l'appliquée qui répond à l'abscisse  $x + ct$ , & dans l'autre  $\Delta$  l'appliquée qui répond à l'abscisse  $x - ct$ : alors la somme de ces deux appliquées fournira une telle valeur pour  $y$ , qui convient infailliblement à l'équation différentielle

$$\left(\frac{dd y}{dt^2}\right) = cc \left(\frac{dd y}{dx^2}\right): \text{ d'où l'on voit que cette solution est infi-}$$

niment générale, puisqu'on peut tirer les deux courbes  $\Gamma$  &  $\Delta$  à volonté. Je remarque seulement que, puisque la valeur de  $y$  doit être extrêmement petite, on n'a qu'à multiplier la somme des deux dites appliquées par une fraction très petite, vu qu'il est clair que, si à l'équation différentielle satisfait une valeur  $y = u$ , il satisfera aussi la valeur  $y = \frac{u}{1000}$ , & en général  $y = mu$ , de sorte qu'on peut faire le coefficient  $m$  aussi petit qu'on voudra.

37. Maintenant il ne s'agit que déterminer les deux courbes  $\Gamma$  &  $\Delta$ , qui jusqu'ici ont été arbitraires, en sorte qu'elles conviennent aux conditions que notre problème renferme. Il en est ici de même que de tous les problèmes dont la solution se trouve par des intégrations, où les constantes arbitraires que chaque intégration introduit dans le calcul, doivent toujours être déterminées  
par

par les conditions du problème. Or, dans notre cas, la principale condition est, qu'au commencement, ou posant  $t = 0$ , la figure de la corde provienne précisément la même que celle qui est prescrite AMB. Posons donc le tems  $t = 0$ , & la valeur de  $y$ , qui fera  $y = \Gamma: x + \Delta: x$ , doit devenir égale à l'appliquée XM de la courbe donnée: ou bien les deux courbes  $\Gamma$  &  $\Delta$  doivent être telles, que la somme de leurs appliquées, qui répondent à la même abscisse  $AX = x$  devienne  $= XM$ . Considérant donc l'une des deux courbes  $\Gamma$  &  $\Delta$  comme donnée, l'autre sera déterminée par cette condition: il faut donc chercher encore une autre condition renfermée dans le problème, pour déterminer entièrement toutes les deux courbes  $\Gamma$  &  $\Delta$ .

38. Cette autre condition est contenue dans la manière dont la corde est relâchée de son état initial forcé, puisque nous supposons que dans cet instant la corde n'a encore aucun mouvement. De là, prenant le tems  $t = 0$ , il faut que la vitesse de chaque point de la corde évanouisse. Or, en général après le tems  $t$ , la vitesse du point Y est  $= \left( \frac{dy}{dt} \right)$ , ou bien  $= c\Gamma': (x+ct) - c\Delta': (x-ct)$ , où  $\Gamma'$  &  $\Delta'$  marquent les fonctions différentielles, en sorte que si nous posons  $\Gamma: u = v$ , nous aurons  $\Gamma': u = \frac{dv}{du}$ ; ainsi  $\Gamma'$  &  $\Delta'$  seront représentés par des courbes, dont les appliquées sont les tangentes des angles dont les élémens des courbes  $\Gamma$  &  $\Delta$  sont inclinés à l'axe AB. Posons maintenant le tems  $t = 0$ , & la formule  $c\Gamma': x - c\Delta': x$  exprimera la vitesse du point M de la corde au commencement, laquelle devant être  $= 0$ , nous aurons  $\Gamma': x = \Delta': x$ . Donc, puisque ces deux fonctions différentielles sont égales entr'elles, les intégrales  $\Gamma: x$  &  $\Delta: x$  le seront aussi, vu qu'elles ne différeront que d'une quantité constante, ce qui revient au même que si nous posons  $\Gamma: x = \Delta: x$ .



39. Donc, puisque la première condition exige qu'il soit  $\Gamma: x + \Delta: x = XM$ , & la seconde  $\Gamma: x = \Delta: x$ , toutes les deux courbes arbitraires se trouvent maintenant déterminées par l'état initial, & on aura  $\Gamma: x = \Delta: x = \frac{1}{2} XM$ . Ces deux courbes seront donc égales entr'elles, & leurs appliquées partout égales à la moitié des appliquées  $XM$  de la figure initiale, de sorte que cette figure nous fournit l'une & l'autre des courbes  $\Gamma$  &  $\Delta$ . Ou bien la figure initiale elle-même  $AMB$  pourra servir à représenter les deux courbes  $\Gamma$  &  $\Delta$ , pourvu que nous établissions notre équation sous cette forme:

$XY = y = \frac{1}{2} \Gamma: (x + ct) + \frac{1}{2} \Gamma: (x - ct)$  à cause de  $\Delta = \Gamma$ , où les formules  $\Gamma: (x + ct)$  &  $\Gamma: (x - ct)$  marquent dans la courbe initiale  $AMB$  les appliquées qui répondent aux abscisses  $x + ct$  &  $x - ct$ . De là on connoitra aussi aisément la vitesse du point  $Y$ , tendante à l'éloigner de l'axe par cette équation

$$\left(\frac{dy}{dt}\right) = \frac{c}{2} \Gamma': (x + ct) - \frac{c}{2} \Gamma': (x - ct).$$

40. Pour trouver donc, après un tems quelconque de  $t$  secondes, l'état de la corde, ou bien la position de chacun de ses points, qui dans l'état naturel se trouvoit en  $X$ , on prendra sur l'axe de part & d'autre de ce point  $X$  les intervalles  $XT = Xt = ct$ , pour avoir les abscisses  $AT = x + ct$ , &  $At = x - ct$ . Aux points  $T$  &  $t$ , on tirera les appliquées  $TV$  &  $tv$  à la courbe initiale de la corde  $AMB$ , & la moitié de la somme de ces deux appliquées donnera l'appliquée cherchée  $XY$ , pour la figure que la corde aura à présent. Mais ici on rencontre une grande difficulté, lorsque l'un ou l'autre des points  $T$  &  $t$ , ou tous les deux, tombent au delà des points  $A$  &  $B$ , sur l'axe où la corde est fixée: on voit bien que, pour cet effet, il faut continuer de part & d'autre la courbe initiale  $AMB$ ; & comme toutes les objections qu'on a faites à ma construction, roulent sur la manière de cette continuation, je tâcherai



de la mettre entièrement hors de doute, en l'établissant de la manière suivante.

41. Si la longueur de la corde  $AB$  étoit infinie, cette difficulté évanouiroit; concevons donc la corde continuée à l'infini des deux côtés, & tendue par la même force  $F$ ; & nous aurons à examiner cette question, s'il ne seroit pas possible de donner à cette corde infinie une telle figure initiale, que la partie  $AB$  en reçoive le même mouvement dont elle est agitée actuellement? Car, si cela est possible, nous n'aurons qu'à prolonger dans la pensée la corde  $AB$  à l'infini, & lui supposer ladite figure initiale par toute sa longueur; d'où il sera aisé ensuite de déterminer le mouvement de la partie  $AB$  pendant toute sa durée. Je me flatte que cette fiction, dont on fait très souvent de semblables presque dans toutes les recherches, ne trouvera aucune contradiction; aussi ne décide-je pas encore si cette nouvelle question est possible ou non? Mais, si elle est possible, personne ne sauroit plus nier que cette considération ne nous conduise à la connoissance du véritable mouvement dont notre corde  $AB$  sera agitée.

42. Or la corde  $AB$  n'est terminée aux points  $A$  &  $B$ , qu'autant que ces points demeurent immobiles pendant tout le mouvement; donc, quand même la corde seroit étendue au delà des termes  $A$  &  $B$ , mais que son mouvement seroit tel, que les points  $A$  &  $B$  demeurassent toujours en repos, la partie  $AB$  auroit sans doute le même mouvement que si la corde  $AB$  étoit fixée aux points  $A$  &  $B$ , & que les parties prolongées en fussent entièrement retranchées, pourvu que la même tension y soit constamment conservée. Maintenant, après avoir établi ce principe incontestable, il est évident que, si la corde  $AB$  étoit seulement prolongée en  $a$  &  $b$ , de sorte que  $Ab = Ba = AB$ , & qu'on eût donné aux parties prolongées  $Ab$  &  $Ba$ , les figures renversées de celle de  $AMB$ , comme j'ai expliqué ci-dessus; les points  $A$  &  $B$  demeureroient en repos, du moins tant que les points  $T$  &  $t$  ne passent point au delà des termes  $a$  &  $b$ : & il est bien certain que le mouvement de  $AB$  sera pré-



précisément le même que si les parties  $Ab$  &  $Ba$  étoient retranchées.

43. On ne sauroit donc plus avoir le moindre doute, que par la nature même de la question la courbe  $AMB$  ne doive être continuée au moins par les intervalles  $Ab$  &  $Ba$ , selon la loi que j'ai établie ci-dessus; & les raisons que j'ai alléguées pour ces deux intervalles, ont également lieu pour tous les autres qu'on y voudra ajouter au delà à l'infini. Ainsi, quand même la courbe  $AMB$  seroit régulière & auroit sa continuation naturelle, comme si c'étoit, par exemple, un arc de cercle, cette continuation naturelle n'entreroit ici pour rien en compte, & il faudroit toujours sur les lignes  $Ab$  &  $Ba$  décrire de semblables arcs de cercle. Quelque choquant que cela puisse paroître à quelques Géomètres, j'espère qu'on ne trouvera plus rien à reprocher à ma construction, à laquelle on ne sauroit plus refuser la plus grande généralité, puisqu'elle s'étend également à toutes les figures possibles, dont la corde  $AB$  est susceptible au commencement. En effet, qui pourroit nier qu'il ne fût possible de donner d'abord à la corde la figure  $AMCB$ , composée par exemple d'un arc de cercle  $AMC$ , & d'une ligne droite  $CB$ , quoique l'une de ces deux parties ne soit certainement pas la continuation naturelle de l'autre.

Planche VI.  
Fig. 6.

44. Mais, quoique cette construction soit tirée de l'équation intégrale  $y = \Gamma: (x + ct) + \Delta: (x - ct)$  qui renferme la solution du problème, M. d'Alembert semble nier qu'elle satisfasse

à l'équation différentielle du second degré  $\left(\frac{ddy}{dt}\right) = cc \left(\frac{ddy}{dx^2}\right)$ ,

que la Théorie fournit immédiatement. Il allégué quelques difficultés, auxquelles il faut encore répondre. Or d'abord, comment peut-on douter de la bonté d'une construction, lorsqu'elle est parfaitement d'accord avec l'équation intégrale, qui contient la solution du problème, & cela, sous le prétexte qu'elle ne convient pas parfaitement à l'équation différentielle, d'où l'intégrale est tirée. On a déjà résolu tant



de problemes par le moyen des intégrations, & personne ne s'est encore avisé de révoquer la solution en doute; d'autant plus que c'est toujours des équations intégrales, qui fournissent les constructions, & tant qu'on n'y peut pas parvenir, on ne sauroit se vanter d'une solution parfaite.

Planché VII.  
Fig. 27.

45. Mais voyons quels sont les inconveniens qu'on rencontre en remontant de notre construction aux formules différentielles du premier & second degré. Soit donc AMB la figure initiale donnée à la corde AB, à laquelle on ait construit sur la prolongation Bu = AB la figure semblable amb dans une situation renversée: de sorte qu'après le tems  $t$  en prenant des intervalles  $PT = Pt = ct$ , le point P pris à la distance  $AP = x$  se trouve éloigné de l'axe au dessus de l'intervalle  $y = \frac{1}{2} \Gamma: (x + ct) + \frac{1}{2} \Gamma: (x - ct) = \frac{1}{2} (-tv + TV)$ , à cause de  $TV = \Gamma: AT$  &  $-tv = \Gamma: At$ , puisqu'on a en général  $PM = \Gamma: AP = \Gamma: x$ . Maintenant, qu'on construise la courbe A' M' B' m' a', en sorte que son appliquée soit  $PM' = \frac{d.PM}{d.AP} = \frac{d.\Gamma: x}{dx} = \Gamma': x$ , ce qu'on fera en prenant une certaine ligne pour unité. Donc, puisque

$$\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{1}{2} \Gamma': (x + ct) + \frac{1}{2} \Gamma': (x - ct)$$

$$\& \quad \left(\frac{dy}{dt}\right) = \frac{c}{2} \Gamma': (x + ct) - \frac{c}{2} \Gamma': (x - ct)$$

on aura par cette nouvelle courbe:

$$\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} (-tv' + TV') \quad \& \quad \left(\frac{dy}{dt}\right) = \frac{c}{2} (-tv' - TV')$$

dont la dernière formule  $\left(\frac{dy}{dt}\right)$  exprime la vitesse du point P de la corde dirigée en haut après le tems  $t$ . Au reste, il est évident que  
les





les appliquées de ces courbes, qui tombent dans la figure au dessous de l'axe, doivent être prises négatives.

46. Cette ligne  $A'M'B'm'a'$  est bien tirée dans la figure d'un trait continu; mais on objecte que si la courbe  $AMB$  n'étoit pas continue, & qu'elle eût des angles, il en résulteroit des interruptions dans la ligne  $A'M'B'm'a'$ . Mais comme la première condition de notre problème exige, que non seulement toutes les appliquées de la courbe  $AMB$ , mais aussi les angles dont tous ses élémens sont inclinés à l'axe, soient infiniment petits, de tels angles qu'on veut supposer dans la figure  $AMB$ , sont déjà exclus, n'étant au plus qu'infiniment petits. Mais, quand même il y auroit quelque interruption dans cette seconde ligne, elle n'affecteroit qu'un élément, & partant ne troubleroit pas la solution. En tout cas, on n'auroit qu'à emousser infiniment peu les angulosités dans la figure  $AMB$ , pour faire évanouir cet inconvénient, & par cela même, qu'on n'auroit changé qu'infiniment peu la figure  $AMB$ , toutes les conclusions qu'on en tire, demeureront toujours les mêmes. De telles objections sont entièrement semblables à celles qu'on a d'abord faites contre le calcul des infiniment petits.

47. Or ces inconvéniens deviendront encore beaucoup plus considérables quand on remonte aux différentiels du second degré, où il faut décrire une nouvelle ligne  $A''M''B''m''a''$  de la précédente  $A'M'B'm'a'$ , de la même manière que celle-ci a été formée de la figure  $AMBma$ . Car, puisque la ligne  $A'M'B'm'a'$  peut avoir en  $B'$  un angle plus considérable, on obtiendra deux lieux pour le point  $B''$ , l'un au dessous & l'autre au dessus de l'axe, ce qui semble rendre incertaines les formules différentielles du second degré qui renferment les accélérations instantanées. En effet, pour le point de la corde  $P$ , après le tems  $t$ , on aura par cette troisième ligne:

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma'':(x+ct) + \frac{1}{2}\Gamma'':(x-ct) = \frac{1}{2}(tv''-TV''),$$

$$\& \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right) = \frac{cc}{2}\Gamma'':(x+ct) + \frac{cc}{2}\Gamma'':(x-ct) = \frac{cc}{2}(tv''-TV'').$$





Donc, si le point  $t$  tomboit en  $B$ , on feroit incertain, si pour  $tv''$ , on devoit prendre l'appliquée positive ou négative  $BB''$ . Mais, quoiqu'on y commette quelque erreur, cette erreur n'affectera qu'un seul élément, & fera par conséquent sans aucune conséquence, étant toujours infiniment petite.

48. D'ailleurs, nonobstant cette incertitude, on aura toujours ouvertement  $\left(\frac{ddy}{dt^2}\right) = cc \left(\frac{ddy}{dx^2}\right)$ , ce qui étant l'équation principale, à laquelle la Théorie conduit immédiatement, il est évident que notre construction lui satisfait aussi bien qu'à l'équation intégrale qui en a été conduite. Et après tout cela, on n'a qu'à émouffer infiniment peu l'angle  $B'$  dans la seconde ligne, pour réunir les deux points  $B''$  &  $B'''$  en  $B$ , & faire évanouir par ce moyen toutes les difficultés. Le changement qui en réjaillira sur la première courbe  $AMBma$ , ne sera aussi qu'infiniment petit, & partant ne changera rien dans l'état initial de la corde, d'où la détermination du mouvement a été tirée. Toutes ces objections sont donc précisément de la même nature, que celles qu'on a faites autrefois contre le calcul différentiel, en lui reprochant que dans certains élémens quelques particules n'évanouissent point, qu'on néglige néanmoins à l'égard des autres quantités. Comme aujourd'hui ces doutes sont entièrement dissipés, ceux qu'on fait contre cette détermination du mouvement des cordes, tomberont aussi d'eux-mêmes.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.

Fig. 6.




Fig. 7.  $A \xrightarrow{\text{arc } DCE} B$  après le tems  $AD$

Fig. 8.  $A \xrightarrow{\text{arc } DCE} B$  après le tems  $2AD = AC$

Fig. 9.  $A \xrightarrow{\text{arc } DCE} B$  après le tems  $3AD$

Fig. 10.  $A \xrightarrow{\text{arc } DCE} B$  après le tems  $4AD = 2AC$

Fig. 11.  $A \xrightarrow{\text{arc } IKN} B$  après le tems  $AB$

Fig. 12.



Fig. 13.  $A \xrightarrow{\text{arc } ECF} B$  après le tems  $CO = \frac{1}{2} AB$

Fig. 14.  $A \xrightarrow{\text{arc } CDE} B$  après le tems  $CD = \frac{1}{3} AB$

Fig. 15.  $A \xrightarrow{\text{arc } CDE} B$  après le tems  $AO = \frac{1}{4} AB$

Fig. 16.  $A \xrightarrow{\text{arc } CDE} B$  après le tems  $AD = \frac{2}{3} AB$

Fig. 17.  $A \xrightarrow{\text{arc } ECF} B$  après le tems  $= \frac{2}{3} AB$

Fig. 18.  $A \xrightarrow{\text{arc } CDE} B$  après le tems  $= AB$

Fig. 19




Fig. 20.




Fig. 21.




Fig. 22.




Fig. 23.




Fig. 24.




Fig. 25.




Fig. 26.





Fig. 27.





# ÉCLAIRCISSEMENS PLUS DÉTAILLÉS

S U R

LA GÉNÉRATION ET LA PROPAGATION DU SON,  
ET SUR LA FORMATION DE L'ECHO,

P A R M. E U L E R.

---

I.

**L**a plus sublime recherche que les Géomètres aient entreprise de nos jours avec succès, est sans contredit à tous égards celle de la propagation du son. Comme il y est question d'une certaine agitation de l'air, cette recherche a été d'autant plus difficile, que parmi toutes celles qu'on a faites sur le mouvement de différens corps, il ne s'en trouve pas une seule, où l'on ait réussi à soumettre au calcul le mouvement de l'air: de sorte que cette partie de la Mécanique a été jusqu'ici entièrement inconnue. Car on n'y sauroit rapporter le peu de chose qu'on a fait sur le mouvement des corps poussés par la force d'un air comprimé; puisqu'on n'y a considéré que la seule force de l'air, sans examiner le mouvement dont les différentes particules de l'air sont agitées entr'elles. Ainsi on ne savoit encore absolument rien des différens mouvemens dont une masse d'air est susceptible.

2. Outre cette difficulté, on en a rencontré encore une autre aussi grande de la part de l'Analyse: quelque perfectionnée que paroisse déjà cette science par les soins des plus grands Géomètres, elle n'étoit pas encore suffisante pour entreprendre cette recherche; il falloit quasi ouvrir une carrière tout à fait nouvelle, où il s'agit d'étendre l'Analyse à des fonctions de deux ou plusieurs variables, pendant que presque toutes les découvertes des Géomètres ont été bornées à des fonctions d'une seule variable. Il falloit donc s'appliquer à une branche tout à fait



fait nouvelle de l'Analyse des infinis, dont même les premiers élémens n'étoient presque pas encore développés. De là on ne fera pas surpris si cette nouvelle Analyse rencontre de grandes contradictions, même de la part des plus grands Géometres; quand on se rappelle à combien de contradictions le calcul différentiel a été exposé dans sa première naissance.

3. Quoique j'aye déjà traité ce sujet en quelques Mémoires après le célèbre M. de la Grange, à qui on est redevable de cette importante découverte, tant la nouveauté que l'importance mérite bien toute l'attention, & des recherches ultérieures ne manqueront pas de nous fournir encore de plus grands éclaircissémens. Lorsque je traiterai cette matiere pour la premiere fois, je me suis attaché principalement à déterminer la vitesse dont un tremoussment est transmis par l'air; mais à présent je tacherai de développer toutes les particularités qui peuvent avoir lieu dans les agitations de l'air, & la maniere dont elles sont altérées dans leur propagation. Cette recherche est d'autant plus intéressante, que c'est de là que résultent toutes les variétés que nous observons dans les sons. Mais, ayant déjà fait voir que la propagation se fait à peu près de la même maniere dans le plein air que dans un tuyau, je bornerai mes recherches présentes à des tuyaux, & même également larges par toute leur étendue: il n'importe presque rien si ces tuyaux sont droits ou courbés d'une maniere quelconque, puisque les phénomènes du son n'en souffrent aucun changement.

Pl. VIII.  
Fig. 1.

4. Soit donc AB un tuyau de la même largeur  $= ff$  par toute sa longueur, que la figure représente droit, quoiqu'il puisse avoir une figure courbée quelconque; je regarde aussi encore sa longueur indéterminée, puisque ce n'est qu'après toutes les intégrations, qu'on tiendra compte des bouts du tuyau, soit qu'ils soient ouverts ou fermés. Je suppose donc que l'équilibre de l'air contenu dans ce tuyau ait été troublé d'une maniere quelconque, ou par toute sa longueur, ou seulement dans une partie. Que B exprime la densité naturelle



naturelle de l'air, mais qu'au point  $S$  posant la distance  $AS = S$  prise du point fixe  $A$ , la densité de l'air ait été réduite à  $Q$ , & qu'on ait imprimé à cette particule d'air en  $S$  un mouvement vers  $B$  avec la vitesse  $= V$ , de sorte que les deux quantités  $Q$  &  $V$  expriment le dérangement, dont l'équilibre de l'air dans le tuyau a été troublé au commencement. Si quelque part on avoit laissé l'air dans son état naturel, on n'auroit qu'à y mettre  $Q = B$  &  $V = 0$ . C'est ainsi que je représente l'état initial de l'air contenu dans le tuyau.

5. Maintenant après un tems écoulé de  $t$  secondes la couche de l'air, qui au commencement a rempli l'élément  $S\Sigma = dS$ , soit parvenue en  $s\Sigma$ , & nommons l'espace  $As = s$ , dont l'élément  $s\Sigma = ds$ : que la densité de l'air y soit à présent  $= q$ , & la vitesse vers  $B$   $= v$ , en exprimant chaque vitesse par l'espace qui en feroit parcouru dans une seconde, de sorte que tout revient à déterminer ces trois quantités  $s$ ,  $q$ , &  $v$ , auxquelles ont été réduites après le tems  $t$  les trois quantités  $S$ ,  $Q$  &  $V$  de l'état initial. Or à l'égard de celles-ci il est bon de remarquer, que puisque l'état initial doit être regardé comme donné les lettres  $Q$  &  $V$  sont de certaines fonctions de l'espace  $AS = S$ , mais les quantités  $s$ ,  $q$  &  $v$  puisqu'elles dépendent non seulement de l'état initial, mais aussi du tems  $t$ , sont effectivement des fonctions de deux variables  $S$  &  $t$ : & partant leur détermination appartient à cette nouvelle partie de l'Analyse, qui traite des fonctions de deux variables, & qui est fondée sur des principes, qui lui sont particuliers.

6. Donc puisque  $s$  est une fonction de  $S$  &  $t$ , en augmentant tant  $S$  que  $t$  de leurs différentiels  $dS$  &  $dt$ , la valeur de  $s$  deviendra  $= s + dS \left( \frac{ds}{dS} \right) + dt \left( \frac{ds}{dt} \right)$ , où il faut remarquer

que la partie  $dS \left( \frac{ds}{dS} \right)$  exprime proprement l'élément  $s\Sigma$ , dont le point  $\Sigma$  fera plus avancé que le point  $S$  après le tems  $t$ . Mais.





l'autre partie  $dt \left( \frac{ds}{dt} \right)$  exprime l'espace par lequel le point  $s$  avancera pendant l'élément du tems suivant  $dt$ : lequel étant divisé par  $dt$  donnera par conséquent la vitesse de l'air en  $s$  après le tems  $t$ , de sorte que nous en tirons  $v = \left( \frac{ds}{dt} \right)$ . Ensuite l'élément de la masse d'air, qui occupoit au commencement l'espace  $S\Sigma = dS$  avec la densité  $Q$ , la largeur du tuyau étant  $= ff$ , est exprimé par la formule  $ffQdS$ . Or cette même masse occupant après le tems  $t$  l'espace  $s\zeta = dS \left( \frac{ds}{dS} \right)$  avec la densité  $q$  la largeur demeurant la même  $= ff$ , sera exprimée par la formule  $ffq dS \left( \frac{ds}{dS} \right)$ , d'où nous tirons cette égalité  $Q = q \left( \frac{ds}{dS} \right)$ : de sorte qu'ayant trouvé la nature de la fonction  $s$ , nous en connoissons d'abord tant la vitesse  $v = \left( \frac{ds}{dt} \right)$  qui se trouve en  $s$  après le tems  $t$ , que la densité  $q = Q: \left( \frac{ds}{dS} \right)$ . Or cet air en  $s$  est le même, qui au commencement a été en  $S$ .

7. La vitesse de l'air en  $s$  après le tems  $t$  étant  $v = \left( \frac{ds}{dt} \right)$ , l'incrément de cette vitesse pendant l'élément du tems suivant  $dt$ , sera  $= dt \left( \frac{dv}{dt} \right) = dt \cdot \left( \frac{d \left( \frac{ds}{dt} \right)}{dt} \right)$ , lequel étant divisé par  $dt$  donne l'accélération  $= \left( \frac{d^2s}{dt^2} \right)$ , qui doit être la même, que celle qui est produite par les forces, qui agissent sur l'élément de l'air en  $s\zeta$ , or ces for-



forces ne résultent que de la pression de l'air, dont il agit en vertu de son élasticité tant en  $s$  qu'en  $\zeta$ . Soit donc la pression en  $s$  égale au poids d'une colonne de mercure, dont la hauteur  $= p$ , laquelle dépendant de la densité de l'air en  $s$  doit aussi être considérée comme une fonction des deux variables  $S$  &  $t$ ; d'où nous concluons pour le

même tems la pression en  $\zeta$  égale à la hauteur  $= p + dS \left( \frac{dp}{dS} \right)$ .

Donc l'élément d'air en  $s\zeta$ , dont la masse est  $= ffQ dS$  est repoussé vers A par le poids d'une colonne de mercure, dont la hauteur

$= dS \left( \frac{dp}{dS} \right)$ , & qui agit sur la base  $= ff$ . Que l'unité exprime

la densité du mercure, & le poids ou la masse de cette colonne étant

$= ff dS \left( \frac{dp}{dS} \right)$ , la force accélératrice sera  $= - \frac{1}{Q} \left( \frac{dp}{dS} \right)$ .

8. Or posant la hauteur  $= g$ , d'où les corps pesans tombent dans une seconde, qui est comme on sait de 15, 625 pieds de Rhin, les principes de Mécanique fournissent cette équation:

$$\left( \frac{dds}{dt^2} \right) = - \frac{2g}{Q} \left( \frac{dp}{dS} \right); \text{ ou } \left( \frac{dp}{dS} \right) + \frac{Q}{2g} \left( \frac{dds}{dt^2} \right) = 0,$$

où il faut observer que  $Q$  marque une fraction, qui est à l'unité, comme la densité de l'air en  $S$  à la densité du mercure, ou bien en raison de leur gravités spécifiques. Ou ayant déjà trouvé  $Q =$

$$q \left( \frac{ds}{dS} \right) \text{ nous aurons } \left( \frac{dp}{dS} \right) + \frac{q}{2g} \left( \frac{ds}{dS} \right) \left( \frac{dds}{dt^2} \right).$$

Maintenant puisque la pression  $p$  est proportionnelle à la densité  $q$ , supposons qu'à une densité connue  $= b$  il répond la hauteur du barome-

tre  $= a$ , & nous aurons  $p = \frac{aq}{b}$ , donc  $\left( \frac{dp}{dS} \right) = \frac{a}{b} \left( \frac{dq}{dS} \right)$ :

de sorte que notre équation prend cette forme  $\frac{2ag}{bQ} \left( \frac{dq}{dS} \right) + \left( \frac{dds}{dt^2} \right) = 0$ , qui conjointement avec la précédente  $Q = q \left( \frac{ds}{dS} \right)$  renferme la détermination du mouvement de l'air dans le tuyau.

9. De là nous pourrons d'abord éliminer la lettre  $q$ ; car puisque  $Q$  est une fonction du seul  $S$ , nous aurons  $\frac{dQ}{dS} = \left( \frac{dq}{dS} \right) \left( \frac{ds}{dS} \right) + q \left( \frac{dds}{dS^2} \right)$ , d'où nous tirons :

$$\left( \frac{dq}{dS} \right) = \frac{dQ}{dS} : \left( \frac{ds}{dS} \right) - Q \left( \frac{dds}{dS^2} \right) : \left( \frac{ds}{dS} \right)^2,$$

& cette valeur substituée dans l'autre équation donne

$$\frac{2ag}{bQ} \frac{dQ}{dS} : \left( \frac{ds}{dS} \right) - \frac{2ag}{b} \left( \frac{dds}{dS^2} \right) : \left( \frac{ds}{dS} \right)^2 + \left( \frac{dds}{dt^2} \right) = 0.$$

Puisque  $Q$  est une fonction donnée de  $S$ , posons pour abrégier

$\frac{dQ}{QdS} = P$ , &  $\frac{2ag}{b} = cc$ , pour avoir en multipliant par  $\left( \frac{ds}{dS} \right)^2$  cette équation :

$$ccP \left( \frac{ds}{dS} \right) - cc \left( \frac{dds}{dS^2} \right) + \left( \frac{ds}{dS} \right)^2 \left( \frac{dds}{dt^2} \right) = 0,$$

de l'intégration de laquelle dépend la détermination du mouvement qu'on cherche : or quelques peines que je me suis données, je n'en ai pu trouver la nature de la fonction  $s$ , ni comment elle est composée de deux variables  $S$  &  $t$ .



10. Donc quelque simple que paroisse le cas, que je me suis proposé, où il ne s'agit que du mouvement de l'air contenu dans un tuyau de même largeur par toute son étendue; il est pourtant encore de beaucoup trop compliqué, pour que les bornes de l'Analyse soyent suffisantes à le résoudre. La difficulté ne réside pas dans le mouvement, que je suppose avoir été d'abord imprimé à l'air dans le tuyau, puisque la lettre  $V$ , qui en désigne la vitesse, n'entre pas même dans le calcul. Donc si l'on supposoit une certaine quantité d'air dans le tuyau réduite à une plus grande densité, & qu'il s'y trouve un boulet, qui en seroit poussé; il faut avouer que même dans ce cas la détermination du mouvement de l'air surpasseroit encore les forces du calcul: tout ce qu'on a fait sur ce sujet, se réduit au seul mouvement du boulet, qu'on a déterminé en faisant abstraction de celui de l'air, ou bien en négligeant l'inertie de l'air: laquelle étant si extrêmement petite à l'égard de celle du boulet, le calcul ne laisse pas d'être très bien d'accord avec les expériences.

11. Je ne voi qu'une seule condition, sous laquelle l'équation, que je viens de trouver, puisse être réduite à l'intégrabilité; cette condition est que la formule  $\left(\frac{ds}{dS}\right)$  retienne toujours presque la même valeur. Donc puisque au commencement il étoit  $s = S$ , & partant  $\left(\frac{ds}{dS}\right) = 1$ , cette condition aura lieu, quand les valeurs de  $\left(\frac{ds}{dS}\right)$  ne diffèrent jamais sensiblement de l'unité. On voit bien que cela arrivera, lorsque l'espace  $Ss$ , par lequel l'air en  $S$  est transporté pendant le tems  $t$ , est toujours extrêmement petit, ou bien lorsque chaque particule de l'air contenu dans le tuyau ne change presque point de place. Or c'est précisément le cas de la propagation du son que j'ai ici principalement en vue; mais il pourra aussi être appliqué avec le même succès à tous les autres cas, où il ne s'agit que de dé-

Vv 3 ter.



terminer un tremouffement de l'air dans le tuyau; tels cas sont premierement la génération, & ensuite la production du son dans les tuyaux d'orgue, que je me propose de développer à la premiere occasion, où je me servirai des mêmes principes, que je m'en vai établir dans les articles suivans.

12. Puisque je supposerai donc, que la quantité  $s$  ne differe jamais que quasi infiniment peu de  $S$ , je pose  $s = S + z$ , de sorte que  $z$  marque l'espace  $Ss$ , par lequel l'air qui étoit en  $S$ , se trouve transporté après le tems  $t$ . De là nous aurons  $\left(\frac{ds}{dS}\right) = 1 + \left(\frac{dz}{dS}\right)$  où le terme  $\left(\frac{dz}{dS}\right)$  étant infiniment petit par rapport à l'unité, peut être omis; mais cela nonobstant la valeur  $\left(\frac{d ds}{d S^2}\right) = \left(\frac{d dz}{d S^2}\right)$  demeurera dans le calcul, puisqu'il n'y a rien, par rapport auquel on la pourroit rejeter; enfin on aura  $\left(\frac{ds}{dt}\right) = v = \left(\frac{dz}{dt}\right)$ , &  $\left(\frac{d ds}{dt^2}\right) = \left(\frac{d dz}{dt^2}\right)$ : d'où notre équation se réduit à cette forme à cause de  $\left(\frac{ds}{dS}\right) = 1$ .

$$ccP - cc \left(\frac{d dz}{d S^2}\right) + \left(\frac{d dz}{dt^2}\right) = 0.$$

Où je remarque que cette même équation résulteroit si l'on posoit  $s = S + at + z$ , quelque grande que soit la quantité  $a$ , pourvu que  $z$  soit une très petite; mais ce cas n'est que celui, où le tuyau entier seroit transporté uniformément selon la même direction, ou bien si l'air passoit par le tuyau d'un mouvement uniforme.



13. Lorsque je traitai la première fois ce sujet de la propagation du son, l'équation, à laquelle je suis parvenu, différoit de celle-ci en ce, que le premier terme  $ccP$  ne s'y trouvoit point; mais cela nonobstant la rapidité de la propagation, que j'en ai tirée, étoit très juste, puisque ce terme alors omis renferme la nature de l'agitation, à laquelle je n'ai fait alors aucune attention. Mais à présent ce terme me servira à découvrir toutes les variétés des sons, qui dépendent de la nature de la première agitation de l'air dans le tuyau; car on fait, que les sons, quoiqu'ils soyent également graves ou aigus, & aussi également forts, admettent encore plusieurs variations & différences, comme sont celles des différentes voyelles, dont personne n'a encore entrepris d'expliquer la nature. Ensuite ce même terme  $ccP$  me mettra aussi en état d'expliquer la formation du son dans les flûtes ou tuyaux d'orgues, ce que je remets à une autre occasion, me contentant pour le présent d'examiner plus en détail la production & propagation du son.

14. D'abord je remarque que le terme  $ccP$  ne trouble point l'intégration de l'équation trouvée: car posant  $z = u + R$  de sorte que  $R$  soit une fonction de la variable  $S$ , nous aurons:

$$ccP - \frac{cc \, ddR}{dS^2} - cc \left( \frac{ddu}{dS^2} \right) + \left( \frac{ddu}{dt^2} \right) = 0.$$

Faisons donc  $\frac{dR}{dS^2} = P = \frac{dQ}{QdS}$ , & nous aurons  $\frac{dR}{dS} = 1 \frac{Q}{C}$ ,

&  $R = \int dS 1 \frac{Q}{C}$ . Or pour la quantité  $u$  on aura cette équation

$$\left( \frac{ddu}{dt^2} \right) = cc \left( \frac{ddu}{dS^2} \right), \text{ dont on fait par le mouvement des cordes}$$

vibrantes, que l'intégrale complète est

$$u = \Gamma: (S + ct) + \Delta: (S - ct),$$



où  $\Gamma$  &  $\Delta$  désignent des fonctions quelconques des quantités y jointes. Par conséquent l'intégrale complète de notre équation est

$$z = \int dS l \frac{Q}{C} + \Gamma: (S + ct) + \Delta: (S - ct),$$

& de là ensuite  $s = S + z$ .

15. Maintenant il ne reste plus que d'ajuster cette équation infiniment générale au cas dont il est question. Pour cet effet il en faut deduire les valeurs  $\left(\frac{ds}{dS}\right)$  &  $\left(\frac{ds}{dt}\right)$  qui résultent

$$\left(\frac{ds}{dS}\right) = 1 + \left(\frac{dz}{dS}\right) = 1 + l \frac{Q}{C} + \Gamma': (S + ct) + \Delta': (S - ct), \text{ \& }$$

$$\left(\frac{ds}{dt}\right) = \left(\frac{dz}{dt}\right) = c\Gamma': (S + ct) - c\Delta': (S - ct)$$

Appliquons à présent ces formules à l'état initial en posant  $t = 0$ , & puisqu'alors il devient  $s = S$ ,  $\left(\frac{ds}{dt}\right) = V$ , &  $\left(\frac{ds}{dS}\right) = \frac{Q}{q} = 1$ , à cause de  $q = Q$ , nous aurons:

$$0 = \int dS l \frac{Q}{C} + \Gamma: S + \Delta: S,$$

$$V = c\Gamma': S - c\Delta': S,$$

$$\text{\& } 0 = l \frac{Q}{C} + \Gamma': S + \Delta': S.$$

Or de ces trois équations la première est déjà comprise dans la troisième, & la constante  $C$  peut encore être prise à volonté. Posons donc  $C = B$ , ce qui est la densité naturelle de l'air dans le tuyau, & remarquons que de là il ne naît aucune restriction puisque la généralité de la lettre  $C$  est déjà comprise dans les deux fonctions générales.





16. En prenant  $C = B$ , puisque la densité  $Q$  ne sauroit différer considérablement de la densité naturelle, vu que nous supposons que les changemens de place de chaque particule d'air sont toujours très petits, la fraction  $\frac{Q}{B}$  ne différera presque pas de l'unité, &

partant son logarithme sera  $\int \frac{Q}{B} = \frac{Q - B}{B}$ . De là nous déterminerons les deux fonctions différentielles:

$$\Gamma': S = \frac{V}{2c} - \frac{1}{2} \int \frac{Q}{B}, \quad \& \quad \Delta': S = -\frac{V}{2c} - \frac{1}{2} \int \frac{Q}{B}$$

& partant les fonctions  $\Gamma$  &  $\Delta$  mêmes seront:

$$\Gamma: S = \frac{1}{2c} \int V dS - \frac{1}{2} \int dS \int \frac{Q}{B},$$

$$\& \quad \Delta: S = -\frac{1}{2c} \int V dS - \frac{1}{2} \int dS \int \frac{Q}{B}.$$

Donc, puisque l'état initial donne à connoître pour chaque abscisse  $S$  les valeurs  $V$  &  $Q$ , on en tirera aisément les fonctions  $\Gamma': S$ ,  $\Delta': S$ ;  $\Gamma: S$ , &  $\Delta: S$ , non seulement pour l'abscisse  $S$ , mais aussi pour toute autre abscisse  $S + ct$ , ou  $S - ct$ , qui entrent dans nos formules qui expriment l'état de l'air après le tems  $t$ . D'où cette question est parfaitement résolue, quelle qu'ait été l'agitation initiale, pourvu qu'elle soit extrêmement petite.

17. Nous voilà donc parvenus à la solution de ce problème assez général: *L'état d'équilibre de l'air dans le tuyau AB ayant été* Fig. 1.  
*troublé d'une manière quelconque, pourvu que les dérangemens soient extrêmement petits, déterminer le mouvement de l'air qui en sera causé dans le tuyau. Pour en donner la solution, considérons d'abord tout ce qui est donné; ce qui se réduit aux points suivans.*



1°. La densité du mercure étant exprimée par 1, soit  $b$  celle de l'air naturel, &  $a$  la hauteur du mercure dans le barometre, d'où l'on tire l'espace  $c = \sqrt{\frac{2ag}{b}}$ , où  $g$  marque la hauteur de la chute dans une seconde.

Fig 2. 2°. Que dans l'état initial le dérangement d'équilibre ait été tel, que l'air au point  $S$  du tuyau ait reçu la densité  $= Q$ , d'où je construis la courbe  $CQD$ , en posant ses appliquées  $SQ = c / \frac{Q}{b} = \frac{Q - b}{b} c$ , que je nommerai l'échelle des densités.

3°. Qu'outre ce dérangement on ait imprimé à l'air en  $S$  une vitesse selon la direction  $SB$ , & posant l'espace qui en seroit parcouru dans une seconde  $= V$ , je constitue l'appliquée  $SV = V$ , d'où je construis l'échelle des vitesses  $EVF$ .

L'axe de ces deux échelles est la droite  $AB$ , qui représente en même tems le tuyau étendu en ligne droite, en cas qu'il soit courbé.

### *Solution analytique du probleme.*

18. Qu'après le tems de  $t$  secondes écoulé depuis le commencement, la particule d'air qui étoit alors en  $S$ , se trouve à présent en  $s$ , & posons l'espace  $Ss = z$ : soit ensuite la densité de cet air en  $s = q$ , & la vitesse  $= v$  dirigée vers  $B$ : & il est clair que toute la solution se réduit à la détermination de ces trois élémens  $z, q$  &  $v$ . Pour cet effet on n'a qu'à établir les fonctions suivantes pour l'abscisse  $AS = S$ .

$$\Gamma': S = \frac{V}{2c} - \frac{1}{2} \int \frac{Q}{b}; \quad \Delta': S = -\frac{V}{2c} - \frac{1}{2} \int \frac{Q}{b}, \quad \&$$

$$\Gamma: S = \frac{1}{2c} \int V dS - \frac{1}{2} \int dS \int \frac{Q}{b}; \quad \Delta: S = -\frac{1}{2c} \int V dS - \frac{1}{2} \int dS \int \frac{Q}{b},$$

&

& de là on aura

$$z = \int dS l \frac{Q}{b} + \Gamma: (S + ct) + \Delta: (S - ct),$$

$$\frac{Q}{q} = 1 + l \frac{Q}{b} + \Gamma': (S + ct) + \Delta': (S - ct),$$

$$\& v = c \Gamma': (S + ct) - c \Delta': (S - ct).$$

Or, puisque  $q$  diffère très peu de  $Q$ , on aura assez exactement

$$\frac{q}{b} = 1 - \Gamma': (S + ct) - \Delta': (S - ct).$$

*Construction Géométrique du Probleme.*

19. Les échelles construites sur l'état initial de l'air dans le tuyau donnent d'abord pour l'abscisse  $AS = S$  les valeurs suivantes:

$$l \frac{Q}{b} = \frac{1}{c} \cdot SQ; \text{ donc } \int dS l \frac{Q}{b} = \frac{1}{c} \cdot ACSQ,$$

$$\& v = SV; \text{ donc } \int v ds = AESV,$$

d'où nous tirons

$$\Gamma': S = \frac{1}{2c} \cdot SV - \frac{1}{2c} \cdot SQ; \quad \Delta': S = -\frac{1}{2c} \cdot SV - \frac{1}{2c} \cdot SQ,$$

$$\Gamma: S = \frac{1}{2c} \cdot AESV - \frac{1}{2c} \cdot ACSQ; \quad \Delta: S = -\frac{1}{2c} \cdot AESV - \frac{1}{2c} \cdot ACSQ.$$

Donc, prenant pour un tems écoulé quelconque de  $t$  secondes les abscisses  $AT = S + ct$ , &  $At = S - ct$ , de sorte que  $ST = S t = ct$  nous aurons semblablement:

$$\Gamma': (S + ct) = \frac{1}{2c} \cdot TN - \frac{1}{2c} \cdot TM; \quad \Delta': (S - ct) = -\frac{1}{2c} \cdot tn - \frac{1}{2c} \cdot tm,$$

$$\Gamma: (S + ct) = \frac{1}{2c} \cdot AETN - \frac{1}{2c} \cdot ACTM; \quad \Delta: (S - ct) = -\frac{1}{2c} \cdot AEntn - \frac{1}{2c} \cdot ACtm,$$

X x 2

d'où

d'où il est à présent aisé de construire les formules trouvées pour les trois quantités  $z$ ,  $q$ , &  $v$ .

20. Or, d'abord pour la quantité  $z$  qui exprime l'espace  $Ss$ , dont la particule d'air, qui étoit au commencement en  $S$  se trouve à présent plus avancée vers  $B$ , nous aurons:

$$z = \frac{1}{c} \cdot ACSQ + \frac{1}{2c} \cdot AETN - \frac{1}{2c} \cdot ACTM - \frac{1}{2c} \cdot AEtn - \frac{1}{2c} \cdot ACtm,$$

ou bien  $z = \frac{1}{2c} (tnTN - SQTM + SQtm),$

où  $tnTN$ ,  $SQTM$ , &  $SQtm$ , marquent des espaces renfermés par les deux échelles données.

Ensuite, pour la densité  $q$  de l'air, qui se trouve à présent en  $s$ , nous aurons:

$$q = b \left( 1 - \frac{1}{2c} \cdot TN + \frac{1}{2c} \cdot TM + \frac{1}{2c} \cdot tn + \frac{1}{2c} \cdot tm \right),$$

ou bien  $q = b + \frac{b}{2c} (TM + tm - TN + tn).$

Enfin, pour la vitesse de cet air en  $s$ , qui est  $= v$ , & dirigée vers  $B$ , nous aurons:

$$v = \frac{1}{2} TN - \frac{1}{2} TM + \frac{1}{2} tn + \frac{1}{2} tm,$$

ou bien  $v = \frac{1}{2} (TN + tn - TM + tm).$

Cette vitesse est exprimée par l'espace qui en feroit parcouru dans une seconde.

### *De la Génération & Propagation du Son.*

Fig. 3.

21. Je conçois ici que notre tuyau s'étend de part & d'autre à l'infini, ayant par tout la même largeur : & qu'au commencement une petite partie d'air contenu dans l'espace  $IK$  ait été ébranlée d'une manière quelconque, dont la nature soit exprimée par les deux



deux échelles IQK & IVK, la première IQK étant celle des densités dont chaque appliquée OQ est  $= \frac{Q-b}{b} c$ , où Q marque la densité de l'air en O, & b la densité naturelle, pendant que c est un espace égal à  $\sqrt{\frac{2ag}{b}}$ , comme j'ai expliqué ci-dessus: de sorte

qu'on en aura la densité  $Q = b \left( 1 + \frac{OQ}{c} \right)$ . De l'autre échel-

le des vitesses IVK, chaque appliquée OV exprime la vitesse qui a été imprimée à l'air en O selon la direction OB: où il est bon d'observer, que les appliquées positives, ou dirigées en haut, de l'échelle IQK marquent une plus grande densité de l'air que la naturelle: & que de semblables appliquées de l'échelle IVK se rapportent à la direction OB. Tout le reste de l'air dans le tuyau étant encore en équilibre, toutes les deux échelles se réunissent, hormis l'espace IK avec l'axe, & leurs appliquées évanouissent.

22. Maintenant, considérons un point quelconque S du tuyau, pour y déterminer l'état de l'air après cette agitation excitée en IK: & puisque, pour un tems quelconque de t secondes, il faut prendre, du point S de part & d'autre sur l'axe, des intervalles  $ST = St = ct$ , & y tirer des appliquées aux deux échelles, il est clair qu'à moins que l'un ou l'autre des points T & t ne tombe dans l'espace IK, toutes les appliquées étant alors = 0, l'air en S se trouvera en repos avec sa densité naturelle = b. Premièrement

done, tant que le tems écoulé t est plus petit que  $\frac{IS}{c}$ , l'air en S demeurera en équilibre: & il ne commencera à être ébranlé qu'après le tems  $t = \frac{IS}{c}$ . Posons donc le tems écoulé  $t = \frac{ST}{c}$  & puis-

que, au point t pris de l'autre côté, ne répond aucune appliquée tm ou tn, dans cet instant le point S se trouvera en s de sorte que



l'espace  $Ss = \frac{1}{2c} (ITN - ITM) = \frac{1}{2c} \cdot MN$ ; & alors la densité de l'air en  $s$  fera  $q = b + \frac{b}{2c} (TM - TN) = b - \frac{b}{2c} \cdot MN$ ; & la vitesse dirigée vers B fera  $v = \frac{1}{2} (TN - TM) = \frac{1}{2} MN$ . Or, dès que le tems écoulé  $t$  devient plus grand que  $\frac{SK}{c}$ , l'air en  $s$  se trouvera rétabli dans l'état d'équilibre, où il demeurera.

23. Ayant pris le point  $S$  quasi derrière l'agitation produite dans l'espace  $IK$ , considérons aussi un point  $S'$  pris de l'autre côté, & l'air dans ce lieu demeurera en équilibre jusqu'à ce qu'il s'écoule un tems plus grand que  $\frac{KS'}{c}$  seconde. Soit donc le tems écoulé  $t = \frac{S't'}{c}$ , & puisqu'en prenant en avant un pareil espace  $S'T'$ , les appliquées  $T'M'$  &  $T'N'$  y sont nulles; l'air qui a été en  $S'$  se trouvera à présent avancé en  $s'$ , de sorte que l'espace

$$S's' = \frac{1}{2c} (Kt'n' + Kt'm').$$

Ensuite la densité de l'air dans ce lieu  $s'$  fera

$$q = b + \frac{b}{2c} (t'n' + t'm')$$

& la vitesse dirigée vers B

$$v = \frac{1}{2} (t'n' + t'm').$$

D'où l'on voit que l'agitation initiale ne se propage point de la même manière en avant & en arrière, & qu'une très grande différence y  
peut



peut avoir lieu. Et on voit même que, si les deux échelles I Q K & I V K se réunissoient dans une seule courbe, la propagation vers A évanouiroit entièrement, & l'air y resteroit toujours en équilibre.

24. Mais, nonobstant cette différence, la vitesse de la propagation est la même vers A & vers B, & par un espace  $= x$  l'agitation est toujours transmise dans le tems de  $\frac{x}{c}$  secondes, d'où

l'on voit que l'espace  $c = \sqrt{\frac{2ag}{b}}$  est précisément celui que le son

parcourt dans une seconde. C'est la même vitesse que le grand Newton avoit déjà trouvée; & l'on sait qu'elle est considérablement plus petite, que l'expérience ne la decouvre. Il y a grande apparence qu'il en faut chercher la raison dans les petites parcelles solides, qui voltigent dans l'air, à travers desquelles l'agitation est transmise dans un instant: si la dixieme partie de tout l'espace étoit rempli de telles parcelles, le son devoit se propager de la dixieme partie plus vite; ce qui mettroit d'accord la théorie avec l'expérience. Mais, quelle qu'en soit la cause, il est toujours certain que la théorie ne sauroit être révoquée en doute pour cela, surtout quand on fait attention que nous supposons les agitations extrêmement petites, pendant qu'on a fait les expériences sur le bruit des canons, qui cause sans doute dans l'air une agitation très violente, à laquelle on ne sauroit plus appliquer la théorie.

25. Il paroît des formules que je viens de trouver, qu'après que toute l'agitation a été transmise par les points S & S', les particules d'air qui ont été au commencement dans ces lieux, n'y sont pas rétablies nécessairement, mais qu'elles reposeront ensuite en d'autres points  $s$  &  $s'$ . Ainsi, dans le cas que la figure représente, l'air qui étoit en S sera transporté après l'agitation par l'espace

$Ss = \frac{1}{2c} (IVK - IQK)$ , & de l'autre côté vers B, l'air qui

étoit





étoit en  $S'$  par l'espace  $S' s' = \frac{1}{2c} (IVK + IQK)$ . Il sem-

ble que ces déplacements n'affectent en aucune façon la sensation du son; mais, si les deux échelles  $IVK$  &  $IQK$  se trouvent en partie au dessus & en partie au dessous de l'axe, puisque les aires qui tombent au dessous doivent être prises négativement, les aires entières  $IVK$  &  $IQK$  peuvent bien évanouir: or cela arrive ordinairement dans les agitations de quelques parties de l'air, où il y a toujours autant d'air rarefié qu'il y en a de condensé: & si quelques particules ont reçu quelque mouvement vers  $B$ , il y en a toujours d'autres qui sont d'autant poussées vers  $A$ . Par cette raison on peut se dispenser d'avoir égard à ces déplacements actuels, & se contenter de connoître la densité & le mouvement de chaque particule, pendant qu'elle est agitée.

Fig. 4. 26. Voyons à présent plus en détail, comment l'agitation de l'air, excitée au commencement dans l'espace  $IK$ , est transmise par le tuyau tant en avant qu'en arriere. Les deux échelles étant donc celle des densités  $IQK$ , & celle des vitesses  $IVK$ : Soit proposé le tems de  $t$  secondes, après lequel il faut déterminer l'agitation qui se trouvera dans le tuyau: pour cet effet on n'a qu'à prendre des deux côtés les espaces  $Ii = Kk = ct$  &  $Ii' = Kk' = ct$ , & l'agitation initiale se trouvera à présent partagée par les deux intervalles  $ik$  &  $i'k'$ ; en sorte que, prenant  $io = IO$  &  $i'o' = IO$ , la densité en  $o$  sera  $q = b + \frac{b}{2c} (OQ - OV)$ , & la vitesse  $= \frac{1}{2} (OV - OQ)$ ; & de l'autre côté en  $o'$  la densité  $q = b + \frac{b}{2c} (OQ + OV)$ , & la vitesse  $= \frac{1}{2} (OV + OQ)$ . Donc, si nous construisons sur  $ik$  l'échelle des densités  $igk$ , prenant son appliquée  $og = \frac{1}{2} (OQ - OV) = \frac{q - b}{b} c$ , elle  
sera



fera en même tems l'échelle des vitesses dirigées vers A. De la même maniere, construisant sur l'espace  $i' k'$  l'échelle des densités, en prenant  $o' q' = \frac{1}{2} (OQ + OV)$ , elle sera aussi l'échelle des vitesses dirigées vers B. Dans tous les autres endroits du tuyau l'air se trouvera en équilibre, sans excepter l'espace IK où la premiere agitation a été excitée.

27. C'est une propriété bien remarquable de toutes les agitations produites par la propagation, que les deux échelles des densités & des vitesses se réduisent partout à la même ligne courbe: d'où nous apprenons que, plus l'air y est condensé, plus il a aussi de vitesse en même sens que le son va; & où la densité est plus petite que la naturelle, là aussi le mouvement est dirigé en sens contraire. Il est donc évident, que les agitations produites peuvent très considérablement différer de l'agitation initiale; & en effet, si celle-ci étoit déjà telle que l'échelle des vitesses fût égale à celle des densités, la propagation se feroit dans un seul sens, & l'air de l'autre côté dans le tuyau n'en seroit jamais ébranlé. Puisque donc le son se répand presque également en tout sens, ce qui arrive lorsque l'échelle des vitesses dans l'agitation initiale évanouit, nous pourrions regarder cette échelle comme réunie avec l'axe IK; puisqu'on peut toujours imaginer une telle échelle de densités qui seule produise le même effet.

28. Dans ce cas, on auroit partout dans les agitations produites les appliquées  $o q$  &  $o' q'$  égales à  $\frac{1}{2} OQ$ ; & ce sera toujours de la figure de l'échelle  $i q k$  que dépend la nature du son, puisque l'oreille n'est frappée que par ces agitations produites: car je ne parle pas ici du grave ou aigu des sons, qui est causé par la fréquence de plusieurs trémoussemens qui se succèdent les uns aux autres, & dont la différence fait le principal objet de la Musique. Toutes les autres qualités des sons qui ne se rapportent pas à la successions de plusieurs vibrations, ne sauroient dépendre que de la figure des échelles  $i q k$ , qui caractérisent les agitations propagées.

*Mém. de l'Acad. Tom. XXI.* Y y dans



dans l'air, & en constituent quasi l'essence. Or on comprend aisément qu'une variété infinie peut avoir lieu dans ces figures; & partant il n'y a aucun doute, que toutes les différentes qualités que nous appercevons dans les sons n'en tirent pas leur origine; quoiqu'il soit encore incertain, quelle qualité répond à chaque figure: & s'il a été jusqu'ici si difficile de découvrir la différence qui regne dans la pronciation des diverses voyelles, nous voyons à présent, que chaque voyelle doit être appropriée à une certaine figure des échelles *i q k*, d'où dépendent aussi toutes les autres variétés que l'oreille peut distinguer dans les sons.

29. Or d'abord, je remarque que plus ou moins de largeur dans la figure *i q k* ne fait que rendre le son plus ou moins fort, sans en altérer les autres qualités. Car, plus les appliquées *o q* sont grandes, plus aussi est grande leur force pour frapper l'oreille; & quoique dans le tuyau cette figure demeure la même à toutes les distances de l'agitation principale *I Q K*: dans l'air libre sa largeur va de plus en plus en diminuant, d'où ne résulte d'autre effet que l'affoiblissement du son, sans que ses autres qualités en soient altérées. D'où l'on peut conclure, que si toutes les appliquées *o q* de la figure *i q k* sont diminuées dans la même raison, il n'en arrive d'autre changement dans le son que l'affoiblissement. Mais, si la figure *i q k* changeoit en sorte que quelques unes de ses appliquées fussent augmentées ou diminuées dans une plus grande raison que d'autres, le son en souffriroit sans doute un changement plus essentiel: & il semble que l'expression des lettres consones, dans la voix, dépend d'une telle modification, ou dans la première ou dans la dernière des agitations dont chaque syllabe est composée; vu que les consones n'affectent que le commencement ou la fin de chaque syllabe.

30. Mais la longueur *i k* de chaque agitation *i q k* est invariable, non seulement dans le tuyau, mais aussi dans l'air libre, d'où l'on peut conclure qu'une qualité plus essentielle des sons en dépend, qui demeure la même, pendant que la force va en diminuant. Peut-être



être que c'est dans cette longueur *ik*, qu'il faut chercher la cause des différentes voyelles : qui dans ce cas ne diffèrentont entr'elles que du plus au moins. Si cela ne paroïssoit assez conforme à la vérité, il faudroit recourir aux différentes figures des échelles *iqk*, où l'on trouveroit principalement à distinguer celles qui n'ont qu'un ventre, de celles qui en ont deux ou trois, ou plusieurs : d'où sans doute doit résulter une différence très essentielle dans les sons. Mais je ne donne tout cela que pour des conjectures, & il s'en faut beaucoup qu'on puisse espérer si tôt une explication suffisante de toutes les variétés qu'on observe dans les sons : & il ne paroît pas encore, quel secours on pourroit attendre des expériences qu'on voudroit faire sur ce sujet.

*Sur la formation de l'Echo.*

31. Jusqu'ici j'ai considéré le tuyau comme étendu à l'infini de part & d'autre ; mais à présent je le considérerai comme terminé, ou d'un côté, ou de tous les deux ; & nous verrons avec d'autant plus de surprise, que cette seule circonstance est capable de produire l'écho, qu'on s'est formé jusqu'ici des idées tout à fait différentes sur la formation de ce phénomène. D'abord donc, je supposerai terminé le tuyau d'un seul côté en B, pendant que de l'autre côté il demeure étendu à l'infini, partout avec la même largeur. Or il y a ici deux cas à examiner, l'un où le tuyau en Bb est ouvert, & l'autre où il y est fermé comme dans la fig. 6. Dans l'un & l'autre cas il s'engendre un écho simple ; ce qui paroîtra bien étrange pour le premier, où l'on ne sauroit concevoir aucune réflexion, comme on se l'est communément imaginé ; d'où l'on comprendra aussi pour l'autre cas, où le tuyau est bouché en Bb, que ce n'est pas proprement à la réflexion qu'il faut attribuer la formation de l'écho.

P R E M I E R C A S.

32. Si donc, *premierement*, le tuyau terminé & ouvert en Bb & qu'on y ait imprimé à l'air contenu dans l'espace IK une

Yy 2

agita-



agitation quelconque, dont l'échelle des densités soit  $I m K$ , & l'échelle des vitesses  $I n K$ . Or, puisque le tuyau est ouvert en  $Bb$ , où il communique avec l'air extérieur, il est impossible que la densité en  $B$  soit différente de la naturelle, que je suppose  $= b$ . Donc, concevant le tuyau au delà de  $B$  vers  $Z$  prolongé à l'infini, il faut absolument que les deux échelles qu'on doit supposer sur cette continuation, soient telles que la densité en  $B$  demeure toujours la même  $= b$ , de quelque manière que puisse varier la vitesse. Donc, pour un tems écoulé quelconque de  $t$  secondes, prenant du point  $B$  de pari & d'autre les intervalles  $BT = Bt = ct$ : soient  $tm$  &  $tn$  les appliquées des deux échelles en  $t$ , &  $TM$  &  $TN$  celles en  $T$ ; & puisque nous avons vu §. 20. que la densité en  $B$  est  $q = b + \frac{b}{2c} (TM + tm - TN + tn)$ ; il faut donc qu'il soit partout  $TM = -tm$  &  $TN = tn$ , pour qu'il devienne  $q = b$ ; d'où l'on détermine pour toute la continuation  $BZ$  à l'infini les deux échelles des densités & des vitesses, quoique cette continuation n'existe que dans l'imagination.

33. De là il est clair que, sur la continuation  $BZ$ , les deux échelles se réunissent avec l'axe, à l'exception du seul espace  $ik = IK$ , & également éloigné de  $B$ , que celui où la première agitation a été excitée, où l'échelle des densités  $iMk$  est égale à la principale  $I m k$ , mais dans une situation renversée, pendant que celle des vitesses  $iNk$ , se trouve située en même sens que la principale  $I n K$ ; d'où l'on voit que la densité en  $B$  doit demeurer toujours la même en vertu de la construction donnée ci-dessus. Maintenant, ayant trouvé la juste continuation des deux échelles au delà de  $B$  à l'infini, la même construction nous découvrira tous les phénomènes dont l'agitation initiale excitée en  $IK$  sera suivie dans le tuyau. Car, pour les agitations qui en sont communiquées à l'air libre par l'ouverture  $Bb$ , notre calcul ne s'y étend point. Ainsi, il faut bien se garder de s'imaginer que l'agitation  $ik$  existe réellement hors du tuyau; & il

ne



ne la faut regarder que comme un moyen propre à nous découvrir les agitations de l'air dans le tuyau, causées par l'agitation initiale IK. Cependant il est certain que, dès que cette agitation parvient au bout B*b*, elle est ensuite propagée par l'air libre; mais cette propagation n'est plus soumise à notre calcul.

34. Puisque la densité de l'air dans l'ouverture B*b* ne sauroit recevoir aucun changement, voyons quelle en sera la vitesse à chaque moment. Or, après le tems de  $t$  seconde, prenant les intervalles  $BT = Bt = ct$ , à cause de l'appliquée TM négative, nous aurons par le §. 20. la vitesse de l'air en B*b* vers Z.

$$v = \frac{1}{2} (TN + tn + TM + tm) = tm + tn:$$

donc, avant le tems  $= \frac{BK}{c}$ , l'air en B*b* sera en repos; ensuite il recevra ce mouvement, dont la vitesse est égale à la somme des deux appliquées  $tm$  &  $tn$ , tant qu'elles sont toutes les deux positives, mais ce mouvement ne durera que pendant un tems  $= \frac{IK}{c}$

secondes, après lequel l'équilibre sera parfaitement rétabli en B*b*. Ici je remarque que, quoique l'agitation en B*b* soit tout à fait différente de la principale IK, les agitations qui en sont produites dans l'air libre sont pourtant de la même nature que celles dans le tuyau; car on voit par ce qui est expliqué ci-dessus, que de très différentes agitations initiales peuvent résulter les mêmes agitations propagées, pourvu que les deux échelles aient un certain rapport entr'elles: or on s'assurera aisément que ce rapport se trouve précisément dans l'agitation de l'ouverture B*b*.

35. Voyons à présent ce qui doit arriver dans un autre lieu quelconque A du tuyau; & il est d'abord clair qu'après le tems  $= \frac{AI}{c}$  seconde, l'agitation y commencera, & durera pendant le





tems  $\equiv \frac{IK}{c}$  seconde, de sorte qu'après le tems  $\frac{At}{c}$  seconde la densité y sera  $q \equiv b + \frac{b}{2c}(tm - tn)$ , & la vitesse  $v \equiv \frac{1}{2}(tn - tm)$  dirigée vers B; alors une oreille placée en A entendra le son, qui aura été produit en IK. Après cela, l'air en A demeurera tranquille, mais cette tranquillité ne dure que pendant le tems  $\frac{Kk}{c} \equiv \frac{2BK}{c}$ , au bout duquel une nouvelle agitation y sera excitée, provenant de l'agitation imaginaire  $ik$ ; de sorte qu'au tems  $\equiv \frac{AT}{c}$  seconde depuis le commencement, la densité y sera

$$q \equiv b + \frac{b}{2c}(-TM - TN) \equiv b - \frac{b}{2c}(tm + tn),$$

& la vitesse  $v \equiv \frac{1}{2}(TN + TM) \equiv \frac{1}{2}(tm + tn)$ . Cette nouvelle agitation différera de la première, puisque l'une est déterminée par la somme des deux appliquées  $tm$  &  $tn$ ; pendant que l'autre l'est par leur différence. Si dans l'agitation initiale IK il étoit par tout  $tn \equiv tm$ , la première agitation en A évanouiroit entièrement, mais l'autre deviendroit d'autant plus forte; & s'il arrivoit le contraire, qu'il fût  $tn \equiv -tm$ , la seconde évanouiroit.

36. De là il est clair que le même son excité en IK sera entendu deux fois en A, & partout ailleurs dans le tuyau AB, hormis près de l'embouchure Bb: & que, si le lieu A est pris derrière l'espace IK, la répétition du son suit après le tems  $\equiv \frac{2BK}{c}$ , où il faut remarquer que  $c$  désigne l'espace que le son parcourt dans une seconde, qui est de 1040 pieds de Paris environ. Voilà donc un cas bien remarquable d'un *écho* simple, dont l'origine suit très naturellement des principes de la Mécanique, quoiqu'aucune réflexion n'y puisse avoir lieu. Un tel écho se formera donc dans un  
tuyau





tuyau ouvert d'un côté, & continué de l'autre à l'infini; & quoique dans ce calcul la largeur du tuyau ait été supposée très petite, le même phénomène doit aussi arriver dans de tuyaux très larges, comme par exemple dans des galeries voûtées: où plus un homme s'y trouvera éloigné du bout  $Bb$ , & plus entendra-t-il tard la répétition de sa propre voix: comme, s'il en étoit éloigné de 520 pieds, l'écho viendrait précisément après une seconde.

## SECOND CAS.

Fig. 6.

37. Le même phénomène aura également lieu, quand le tuyau est fermé en  $Bb$ , en le supposant encore infini vers l'autre côté. Pour appliquer nos formules à ce cas, il faut considérer que l'air en  $Bb$  ne sauroit avoir aucun mouvement. Donc la continuation des deux échelles vers  $Z$  doit être telle, que notre construction donne toujours pour le lieu  $B$  la vitesse  $v = 0$ ; quelle qu'y puisse être la densité. Pour cet effet, prenons du point  $B$  de part & d'autre les intervalles égaux  $BT = Bt$ , & puisque les appliquées  $tm$  &  $tn$  sont connues au point  $t$ , soyent  $TM$  &  $TN$  celles au point  $T$ , d'où en vertu du §. 20. la vitesse en  $B$  résulte  $v = \frac{1}{2}(TN + tn - TM + tm)$ , qui devant toujours être  $= 0$ , il faut qu'il soit  $TN = -tn$ , &  $TM = tm$ . L'agitation initiale en  $IK$  étant donc représentée par l'échelle des densités  $ImK$ , & celle des vitesses  $InK$ , on n'a qu'à prendre les intervalles  $Bi = BI$ , &  $Bk = BK$ : & y décrire l'échelle des densités  $iMk$  égale à  $ImK$ , & celle des vitesses  $iNk$  égale, mais contraire à  $InK$ . Partout ailleurs les deux échelles sont réunies avec l'axe.

38. En  $Bb$  la vitesse demeurant toujours  $= 0$ , la densité après le tems  $= t$ , en prenant  $BT = Bt = ct$ , à cause de l'appliquée  $TN$  négative, y fera  $q = b + \frac{b}{2c}(TM + tm + TN + tn) = b + \frac{b}{c}(tm + tn)$ . Mais, pour tout autre endroit  $A$  dans le

tuyau,



tuyau, derrière l'agitation initiale IK, après que le son en sera entendu en A, l'écho y parviendra après le tems  $\equiv \frac{Kk}{c} \equiv \frac{2BK}{c}$ . Cet intervalle de tems sera d'autant plus grand, plus l'agitation initiale IK se trouvera reculée du bout Bb, d'où l'on voit que les phénomènes de l'écho seront les mêmes, soit que le bout Bb soit fermé ou ouvert; la seule différence consistera dans la nature de l'agitation, qui n'affecte point l'intervalle du tems écoulé entre le son principal & sa répétition. Ici on pourroit bien dire, que l'écho provient de la réflexion du fond Bb; mais, puisque le même écho se forme, lorsque le tuyau est ouvert en Bb, on voit bien que l'idée de la réflexion ne fournit point la juste explication de ce phénomène, mais que cette explication demande des recherches beaucoup plus profondes.

### TROISIEME CAS.

Fig. 7.

39. Considérons maintenant un tuyau terminé des deux côtés en A & B, & puisque nous avons déjà vu, que les phénomènes sont à peu près les mêmes, soit que les bouts soient fermés ou ouverts, je supposerai le tuyau AB ouvert des deux côtés. Ensuite, pour ne pas trop embrouiller les idées, je conçois l'agitation initiale comme faite dans un seul point  $t$ , la densité y étant  $\equiv b + \frac{b}{c} \cdot tm$ , & la vitesse  $\equiv tn$ , & que partout ailleurs sur AB les deux appliquées évanouissent. Qu'on prolonge la droite AB de part & d'autre à l'infini, & qu'on prenne les intervalles AB', BA'; A'B'', B'A'' &c. égaux à la longueur du tuyau AB: & puisque le tuyau est ouvert en B à la distance BT  $\equiv Bt$ , il faut établir les appliquées TM & TN; & à cause de l'ouverture Aa par la même raison, il faut établir en  $t'$ , prenant At'  $\equiv At$ , les appliquées  $t'm'$  &  $t'n'$ ; ensuite aussi, à la distance At''  $\equiv AT$ , les appliquées  $t''m''$  &  $t''n''$ : Selon la même loi, en prenant BT'  $\equiv Bt'$ , il y faut mettre les appliquées T'M' & T'N', & ainsi de suite; d'où l'on voit,

com-



comment on doit établir dans tous les intervalles  $AB'$ ,  $BA'$ ,  $A'B''$ , &c. les deux appliquées, celles des vitesses étant toutes dirigées en haut, & celles des densités alternativement en haut & en bas.

40. Soit à présent une oreille en  $A$ , & après le tems  $\frac{At}{c}$  elle recevra la première impression, causée par les deux agitations  $tmn$  &  $t'm'n'$  conjointement; c'est le son principal, qu'elle entendra alors. Ensuite après le tems  $\frac{tT}{c} = \frac{t't''}{c} = \frac{2Bt}{c}$  elle entendra le premier écho, qui sera suivie du second après le tems  $\frac{2At}{c}$ ; depuis du troisième après le tems  $\frac{2Bt}{c}$ , ensuite du quatrième après le tems  $\frac{2At}{c}$ , & ainsi de suite. Le son principal sera donc répété une infinité de fois, les intervalles de chaque écho au suivant étant alternativement de  $\frac{2Bt}{c}$  &  $\frac{2At}{c}$  secondes. Si le bruit étoit excité au lieu  $A$  même, la multitude des échos se réduiroit à la moitié, & les intervalles de tems entr'eux seroient tous égaux &  $\frac{2AB}{c}$  secondes; de sorte que, si la longueur du tuyau  $AB$  étoit de 520 pieds, tous ces échos se suivroient toutes les secondes.

41. Que le premier son s'excite en  $t$ , & que l'oreille soit placée au même endroit; dans ce cas le premier écho suivra le son principal après le tems  $\frac{tt'}{c} = \frac{2At}{c}$ , le second après le tems  $\frac{tT}{c} = \frac{2Bt}{c}$ , le troisième après le tems  $\frac{tT'}{c} = \frac{tt''}{c} = \frac{2AB}{c}$ , qui étant produit par les deux agitations  $T'M'N'$  &  $t''m''n''$  égales & semblables à la principale, sera plus fort & plus distinct. Or celui-



ci fera suivi en même ordre de nouveaux après le tems  $\frac{2At}{c}$ ,  $\frac{2Bt}{c}$  &  $\frac{2AB}{c}$ , & ainsi de suite. D'où l'on voit que, si le point  $t$  étoit pris au milieu du tuyau  $AB$ , tous les échos se succédroient à intervalles égaux, chacun étant  $= \frac{AB}{c}$  secondes. Si l'oreille se trouvoit dans un autre endroit  $S$ , le nombre des échos feroit encore plus multiplié, & cela par des intervalles de tems plus inégaux entr'eux: pour en juger mieux, on n'a qu'à s'imaginer qu'en tous les endroits  $t$ ,  $T$ ,  $t'$ ,  $T'$ ,  $t''$ ,  $T''$  &c. le même cri soit produit au même instant, & voir à quel instant chacun d'eux parvient au lieu proposé  $S$  dans le tuyau, selon la loi de la propagation.

42. Si la longueur du tuyau est au dessous de 100 pieds, de sorte que les intervalles de tems entre les échos constructifs ne fauroient être distingués, tous les échos se réduiront à une résonnance confuse; d'où l'on comprend clairement ce que c'est qu'une résonnance. Mais, si le tuyau est beaucoup plus long que 100 pieds, & que les intervalles de tems entre les échos successifs deviennent assez sensibles: alors on entendra plusieurs échos de suite, dont le nombre devroit même être infini, si par des causes physiques les répétitions ne devenoient de plus en plus foibles. Or ce que je viens d'exposer, pourra selon toute apparence être appliqué à des galeries fort longues & bien fermées de tous côtés, quoiqu'à la rigueur ces recherches ne s'étendent qu'à des tuyaux fort étroits: cependant il n'y a presque point de doute qu'on y observera une telle multiplicité d'échos. On trouve même quelques observations dans les Oeuvres de Kircher, qui semblent très bien confirmer cette production des échos.

43. Mais on comprend aisément, que tout ce que je viens de développer, ne regarde qu'un cas très particulier, & qu'on se tromperoit bien grossièrement, si l'on vouloit assigner à tous les échos

Fig. 1.



Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.





Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.



échos cette même origine. Je n'ai considéré que des tuyaux également larges par toute leur étendue; ce qui est sans doute un cas très particulier, auquel les bornes de l'Analyse m'ont attaché, vu qu'il est encore impossible de définir le mouvement de l'air dans les tuyaux, dont la largeur varie d'une manière quelconque. Cependant on avouera que ce cas, quelque particulier qu'il soit, nous a fourni des éclaircissémens très importans tant sur la génération & propagation du son, que sur la formation des *échos*: d'où nous pourrions puiser des idées beaucoup plus justes qu'on n'en a eu jusqu'ici. Mais, comme cette recherche est fondée sur une branche tout à fait nouvelle de l'Analyse, elle doit principalement exciter tous les Géomètres à la cultiver; puisque c'est de là qu'on peut attendre les plus importantes découvertes, qui sont entièrement inaccessibles à l'Analyse ordinaire, & parmi lesquelles il faut surtout compter celles où le mouvement de l'air entre en considération.

44. Donc, si nous possédons encore à peine les premiers principes pour connoître le mouvement de l'air, & si tout ce que nous en savons se réduit à certaines especes de tuyaux; combien sommes-nous encore éloignés de déterminer toutes les modifications que le son reçoit dans des cavités quelconques? La cavité de la bouche humaine nous en fournit un exemple frappant, dont nous ne connoissons que fort en gros l'effet dans la formation de la voix: ne sachant presque rien de la manière dont les articulations & autres modifications sont opérées. Mais il n'y a aucun doute que, s'il nous étoit possible de pénétrer dans ces mystères, nous découvririons aussi dans la figure de la bouche un vrai chef-d'oeuvre de la souveraine sagesse, qui surpasse infiniment tout ce que le plus sublime Géometre est capable d'imaginer. C'est ainsi que partout le Créateur a mis l'empreinte de son infinie sagesse, même dans les choses qui en paroissent le moins susceptibles.







S U R  
LES COURBES TAUTOCHRONES.

PAR M. DE LA GRANGE \*).

---

On appelle en général courbe *tautochrone* une courbe telle, que si un corps se meut le long de sa concavité, soit en montant soit en descendant, il emploie toujours le même tems à parcourir un arc quelconque pris du point le plus bas.

M. Huyghens ayant démontré dans son fameux Ouvrage intitulé *horologium oscillatorium*, que la cycloïde étoit la tautochrone des corps pesans dans le vuide, cette découverte excita la curiosité des Géometres, & les engagea à chercher une méthode directe & analytique pour résoudre le probleme du tautochronisme dans une hypothese quelconque; probleme qui est peut être un des plus curieux & en même tems des plus difficiles de la mécanique.

Mrs. Jean Bernoulli & Euler se sont particulièrement appliqués à cette recherche, & ont donné presqu'en même tems, l'un dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, pour l'année 1730, & l'autre dans le Tome IV, des commentaires de l'Académie de Petersbourg, & ensuite dans le second volume de sa Mécanique, des méthodes tres ingénieuses pour déterminer les tautochrones dans un milieu résistant comme le quarré de la vitesse, & dans quelque hypothese de pesanteur que ce soit. Ces méthodes qui sont les mêmes quant au fond, consistent à faire en sorte que l'expression générale du tems  $\int \frac{dx}{u}$  devienne égale à une fonction de dimension nulle de deux quantités quelconques, l'une constante A, & l'autre variable X, telles, qu'en faisant  $X = A$ , on ait le tems total

\*) Lu dans l'assemblée du 4 Mars 1767.





total depuis le commencement du mouvement jusqu'à la fin. Car alors la quantité  $A$  qui dépend de l'arc total que le corps doit parcourir, s'évanouit nécessairement de la formule  $\int \frac{dx}{u}$ , lorsque

$X = A$ , & par conséquent l'expression du tems se trouve entièrement indépendante de la longueur de cet arc. Or pour cela il suffit que la quantité différentielle  $\frac{dx}{u}$  soit elle-même une fonction de

dimension nulle de  $X$  & de  $A$ , comme par exemple  $\frac{dP}{\sqrt{(A^2 - P^2)}}$

& d'autres semblables ; condition à laquelle il n'est pas difficile de satisfaire lorsqu'on peut avoir l'expression de la vitesse  $u$ , ce qui arrive quand la résistance est nulle, & quand elle est proportionnelle au quarré de la vitesse ; mais il n'en est pas tout à fait de même dans les autres cas où l'équation en  $u$  n'est point intégrable. Aussi les deux grands Géometres dont nous venons de parler, n'ont-ils considéré d'autres hypothèses de résistance que celle du quarré de la vitesse ; & M. Fontaine est le seul qui ait fait jusqu'ici quelques pas de plus dans cette recherche. Sa méthode est fondée sur un calcul particulier qu'il appelle fluxio-différentiel, & qui consiste à faire varier les mêmes quantités de deux manieres différentes ; & on peut regarder l'ouvrage qu'il a donné sur cette matiere, comme un des plus beaux qui se trouvent parmi les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris, & surtout comme celui qui a le plus contribué à la célébrité de cet illustre Mathématicien.

Mais, quelque profonde & quelque ingénieuse que soit cette nouvelle théorie des tautochrones, il faut avouer qu'elle laisse encore beaucoup à desirer. Lorsqu'il n'y a point de résistance, & que par conséquent la force accélératrice du corps est entièrement indépendante de la vitesse, on sait depuis longtems que le tautochronisme exige que cette force soit proportionnelle à l'espace qui reste à parcourir. Mais quelle est en général la force nécessaire pour pro-



duire le tautochronisme, en la regardant comme une fonction quelconque de l'espace & de la vitesse ? Voilà le problème qu'il faut résoudre pour avoir une théorie générale & complète des tautochrones. M'étant occupé de ce problème, voici la solution que j'en ai trouvée, & qui est, si je ne me trompe, générale & nouvelle.

*Solution du problème des tautochrones.*

Soit  $u$  la vitesse du corps en un point quelconque de la ligne qu'il décrit,  $p$  la force accélératrice dans ce point,  $x$  l'espace qu'il a encore à parcourir, &  $a$  l'espace total depuis le point d'où le corps est parti jusqu'à celui où il doit arriver; on aura, comme l'on fait, (à cause que  $x$  croissant  $u$  diminue,) l'équation

$$u du + p dx = 0.$$

Et le tems que le corps doit employer à parcourir l'espace  $x$  sera exprimé par  $\int \frac{dx}{u}$ ; de sorte qu'en faisant, après l'intégration,  $x = a$ , on aura le tems total depuis le commencement du mouvement jusqu'à la fin. Or ce tems doit être indépendant de l'espace parcouru  $a$ , par la nature du problème; donc il faut que la valeur de  $\int \frac{dx}{u}$  soit telle qu'en faisant  $x = a$ ,  $a$  s'évanouisse entièrement.

Soit  $X$  une fonction quelconque de  $x$ , &  $A$  une pareille fonction de  $a$ ; il est clair que la condition dont il s'agit aura lieu, si en faisant  $X = zA$ , & substituant la valeur de  $x$  tirée de cette équation dans la formule  $\int \frac{dx}{u}$ , cette substitution y fait disparaître la quantité  $a$ , & la réduit à n'être qu'une fonction de  $z$ ; car alors la supposition de  $x = a$  donnera  $X = A$ , & par conséquent  $z = 1$ ; de sorte que la formule  $\int \frac{dx}{u}$  aura dans ce cas une valeur déter-

minée



minée & indépendante de  $n$ . Donc, si on différentie cette formule en faisant varier  $x$  &  $n$ , qu'ensuite on suppose  $dx = X' dX$ ,  $dn = A' dA$  ( $X'$  étant une fonction de  $X$ , ou  $x$ , &  $A'$  une pareille fonction de  $A$ , ou  $n$ ) & qu'on mette à la place de  $dX$  la valeur  $A dz + z dA$ , il faudra que le coefficient de  $dA$  soit  $= 0$ . Cela posé, comme la vitesse  $u$  doit dépendre des deux quantités  $x$ , &  $n$ , supposons qu'en les faisant varier toutes deux en même tems on ait la différentielle  $du = P dx + Q dn$ , il est clair qu'on aura d'abord en vertu de l'équation  $u du + p dx = 0$ ,  $P = -\frac{p}{u}$ ;

Ensuite la différentielle de  $\int \frac{dx}{u}$  fera, dans la même supposition,  $\frac{dx}{u} = dn \int \frac{Q dx}{u^2}$ ; laquelle, en faisant les substitutions convenables, c'est à dire, en mettant  $X' (A dz + z dA)$  au lieu de  $dx$ , &  $A' dA$  au lieu de  $dn$ , deviendra

$$\frac{A X' dz}{u} + \left( \frac{X' z}{u} - A' \int \frac{Q dx}{u^2} \right) dA.$$

Donc il faudra que l'on ait  $\frac{X' z}{u} - A' \int \frac{Q dx}{u^2} = 0$ ; c'est à dire en remettant pour  $z$  sa valeur  $\frac{X}{A}$ , & faisant pour plus de simplicité  $XX' = \xi$ , &  $AA' = \alpha$ ,  $\frac{\xi}{u} - \alpha \int \frac{Q dx}{u^2} = 0$ .

D'où, en faisant varier  $x$  seul, on tire  $Q = \frac{u d\xi - \xi du}{\alpha dx}$ , & mettant pour  $\frac{du}{dx}$  sa valeur  $P$ , ou bien  $-\frac{p}{u}$ ,

$$Q = \frac{\frac{u d\xi}{dx} + \frac{p \xi}{u}}{\alpha}$$

De sorte que la valeur complète de  $du$  sera en général

$$du = -\frac{p dx}{u} + \left( \frac{u d\xi}{dx} + \frac{p\xi}{u} \right) \frac{da}{a},$$

$\xi$  étant une fonction quelconque de  $x$ , &  $a$  une pareille fonction de  $a$ .

Maintenant, soit  $R$  le facteur composé de  $x$ , & de  $u$ , qui multipliant l'équation  $du + \frac{p dx}{u} = 0$ , dans laquelle  $a$  est supposé constant, la rendroit intégrable, il est évident que ce même facteur étant regardé comme une fonction de  $u$ ,  $x$ , &  $a$  doit aussi rendre intégrable l'équation

$$du + \frac{p dx}{u} - \left( \frac{u d\xi}{dx} + \frac{p\xi}{u} \right) \frac{da}{a} = 0;$$

Donc il faut que l'équation

$$R \left( \frac{u d\xi}{dx} + \frac{p\xi}{u} \right) \left( \frac{u du + p dx}{\frac{u^2 d\xi}{dx} + p\xi} + \frac{da}{a} \right) = 0.$$

soit intégrable; & comme le terme  $\frac{da}{a}$  est une fonction de  $a$  seul,

& que les termes  $\frac{u du + p dx}{\frac{u^2 d\xi}{dx} + p\xi}$  ne contiennent point  $a$ , mais

seulement  $x$  &  $u$ , il s'ensuit 1<sup>o</sup>, que le multiplicateur commun

$R \left( \frac{u d\xi}{dx} + \frac{p\xi}{u} \right)$  doit être une quantité constante, c'est à dire,

que  $R$  doit être réciproquement proportionnel à  $\frac{u d\xi}{dx} + \frac{p\xi}{u}$ ;

2<sup>o</sup> que

2°. que par conséquent la quantité  $\frac{u du + p dx}{\frac{u^2 d\xi}{dx} + p\xi}$  doit être une différentielle complète de  $x$  & de  $u$ .

Soit  $\frac{u^2 d\xi}{dx} + p\xi = r$ , ce qui donne  $p = \frac{r}{\xi} - \frac{u^2 d\xi}{\xi dx}$ ,  
& l'on aura la transformée  $\frac{\xi u du - u^2 d\xi}{\xi r} + \frac{dx}{\xi}$ , laquelle, en faisant  $\frac{u}{\xi} = y$  se changera en celle-ci  $\frac{u^2 dy}{ry} + \frac{dx}{\xi}$ .

Or, comme  $\xi$  est une fonction de  $x$ , il est visible que cette quantité ne sauroit être une différentielle complète à moins que  $\frac{u^2}{r}$  ne soit une fonction de  $y$  seule.

Donc, si on dénote par  $\phi y$  une fonction quelconque de  $y$ , il faudra que l'on ait  $r = u^2 \phi y$ , c'est à dire, à cause de  $y = \frac{u}{\xi}$ ,  
 $r = u^2 \phi \left( \frac{u}{\xi} \right)$ . Donc, en substituant cette valeurs de  $r$  dans l'équation  $p = \frac{r}{\xi} - \frac{u^2 d\xi}{\xi dx}$ , on aura

$$p = u^2 \left[ \frac{\phi \left( \frac{u}{\xi} \right)}{\xi} - \frac{d\xi}{\xi dx} \right].$$

Telle est l'expression générale de la force accélératrice nécessaire pour le tautochronisme, où  $\xi$  peut être une fonction quelconque de  $x$ , &  $\phi \left( \frac{u}{\xi} \right)$  une fonction quelconque de  $\frac{u}{\xi}$ .



## REMARQUE.

La solution précédente est fondée sur cette considération qu'en faisant  $X = zA$ , l'expression du tems  $\int \frac{dx}{u}$  doit devenir une fonction de la seule variable  $z$ . Soit donc  $\Pi z$  cette fonction, on aura en général  $\int \frac{dx}{u} = \Pi z + c$ , la constante  $c$  devant être telle que  $\int \frac{dx}{u}$  soit nul lorsque  $x = 0$ . Or, puisque  $X$  est une fonction quelconque de  $x$ , supposons qu'elle devienne  $= f$  quand  $x = 0$ ; & l'on aura dans ce cas  $z = \frac{f}{A}$ ; donc il faudra que  $\Pi \frac{f}{A} + c = 0$ ; & par conséquent que  $c = -\Pi \frac{f}{A}$ ; de sorte qu'on aura  $\int \frac{dx}{u} = \Pi z - \Pi \frac{f}{A}$ : d'où l'on voit que la valeur de  $\int \frac{dx}{u}$  contiendra nécessairement la quantité  $A$ , à moins que  $f$  ne soit  $= 0$ . Donc il faut pour l'exactitude de la solution que la fonction  $X$  soit telle qu'elle s'évanouisse lorsque  $x = 0$ ; & comme  $\xi = XX'$ , il faudra aussi que la quantité  $\xi$  devienne nulle dans le même cas.

## EXEMPLE.

Supposons  $\phi\left(\frac{u}{\xi}\right) = f + g \frac{\xi}{u} + h \frac{\xi^2}{u^2}$ ,  $f, g, h$  étant des constantes quelconques, nous aurons

$$p = h\xi + gu + \left(\frac{f}{\xi} - \frac{d\xi}{\xi dx}\right) u^2.$$

Soit  $\frac{f}{\xi} - \frac{d\xi}{\xi dx} = k$ , en sorte que  $p = h\xi + gu + ku^2$ ,

&



& l'on trouvera par l'intégration  $\xi = Ce^{-kx} + \frac{f}{k}$ ,  $C$  étant une constante arbitraire, qu'on déterminera par la condition que  $\xi$  soit  $= 0$  lorsque  $x = 0$  (Rem. précéd.); de sorte qu'on aura  $C = -\frac{f}{k}$ , & par conséquent  $\xi = f \frac{1 - e^{-kx}}{k}$ .

On voit par là, que pour que le tautochronisme ait lieu dans un milieu dont la résistance seroit en général  $gu = ku^2$ , il faut que le mobile soit sollicité par une force proportionnelle à  $\xi$ , c'est à dire,  $a \frac{1 - e^{-kx}}{k}$ ,  $x$  étant l'espace à parcourir.

Si  $k = 0$ , c'est à dire, si la résistance du milieu étoit simplement proportionnelle à la vitesse, on auroit (en supposant  $k$  infiniment petit) la force proportionnelle  $ax$ ; & il en seroit de même si la résistance étoit tout à fait nulle. Ce qui s'accorde avec ce que l'on fait d'ailleurs.

Au reste ces cas sont les seuls où l'on ait pu jusqu'ici déterminer les loix du tautochronisme; notre méthode donne, comme l'on voit, le moyen d'étendre cette recherche aussi loin qu'il est possible.

### C O R O L L A I R E I.

C'est une chose digne de remarque, que l'expression de la force sollicitatrice qu'on vient de trouver pour le cas de la résistance  $gu + ku^2$  ne dépend en aucune manière du terme  $gu$ ; de sorte que la même courbe qui est tautochrone dans le vuide, ou dans un milieu résistant comme le carré de la vitesse, doit l'être aussi dans un milieu dont la résistance seroit proportionnelle à la vitesse, ou en partie au carré de la vitesse. Pour en trouver la raison, il n'y a qu'à examiner l'expression générale de  $p$ ; & on verra que, comme la quantité  $\phi \frac{u}{\xi}$





exprime une fonction quelconque de  $\frac{u}{\xi}$ , on peut écrire  $\Phi \frac{u}{\xi} + g \frac{\xi}{u}$  au lieu de  $\Phi \frac{u}{\xi}$ ; ce qui donnera simplement dans la valeur de  $p$  le nouveau terme  $g u$ . D'où l'on peut conclure en général, que toute courbe qui est tautochrone dans une hypothèse quelconque de force & de résistance, l'est aussi en supposant la résistance augmentée d'une quantité proportionnelle à la vitesse.

### COROLLAIRE II.

L'équation  $p u du + p dx = 0$  donne, en mettant pour  $p$

sa valeur  $u^2 \left[ \frac{\Phi \left( \frac{u}{\xi} \right)}{\xi} - \frac{d\xi}{\xi dx} \right]$ , & faisant, comme ci-dessus,  $\frac{u}{\xi} = y$ ,  $\frac{dy}{y \Phi y} + \frac{dx}{\xi} = 0$ , d'où l'on tirera la valeur de  $y$  en  $x$ , & par conséquent aussi celle de  $u$ , à cause que  $u = \xi y$ .

Soit  $\int \frac{dy}{y \Phi y} = \Phi y$ , l'intégrale étant prise de manière qu'elle

soit nulle lorsque  $y = 0$ , on aura en substituant  $\frac{dX}{X}$  au lieu de  $\frac{dx}{\xi}$ , & intégrant ensuite  $\Phi y + lX = C$ ,  $C$  étant la valeur de  $X$  lorsque  $y = 0$ . Or, puisque  $y = \frac{u}{\xi}$ , & que  $u$  doit être  $= 0$ , au commencement du mouvement lorsque  $x = a$ , & par conséquent  $X = A$ , on aura  $C = lA$ ; donc  $\Phi y = l \frac{A}{X}$ , & faisant  $X = zA$ ,  $\Phi y = -l/z$ . Dénotons par  $\Psi$  la fonction réciproque de  $\Phi$ , c'est à dire, une fonction telle que  $\Psi(\Phi y) = y$ , & l'on aura



aura  $y = \Psi - lz$ ; donc  $u = \xi \Psi - lz$ ; donc  $\frac{dx}{u} =$   
 $\frac{dx}{\xi \Psi - lz} = \frac{dX}{X \Psi - z} = \frac{dz}{z \Psi - lz}$ ; quantité qui doit être  
 intégrée de manière qu'elle soit nulle lorsque  $z = 0$ . Or  $z$  est  
 donnée en  $x$  par l'équation  $z = \frac{X}{A}$ ; donc on connoitra aussi la vites-  
 se  $u$  & le tems  $\int \frac{dx}{u}$  en  $x$ . Si on veut avoir le tems total employé à dé-  
 crire l'arc  $a$ , il faudra faire  $x = a$ , ou bien  $z = 1$ ; & comme  
 l'expression du tems est une fonction de  $z$  seul, il est clair que le  
 tems total sera indépendant de la longueur de l'arc parcouru  $a$ .

### COROLLAIRE III.

Soit  $t$  le tems employé à parcourir un arc quelconque  $a - x$ ,  
 pris du point où le corps commence à se mouvoir, en sorte que l'on ait  
 $dt = -\frac{dx}{u}$ , & comme  $u = \xi y$ , on aura  $dt = -\frac{dx}{\xi y}$ , &  
 mettant au lieu de  $\frac{dx}{\xi}$  sa valeur tirée de l'équation  $\frac{dy}{y^2 \Phi y} + \frac{dx}{\xi} = 0$ ,  
 il viendra  $dt = \frac{dy}{y^2 \Phi y}$ . Or, au commencement du mouvement, on  
 a  $x = a$ , &  $u = 0$ , donc  $y = 0$ ; & à la fin on a  $x = 0$ ,  
 & par conséquent aussi  $\xi = 0$ , (par la Remarque préc.) donc  $y =$   
 $\frac{u}{\xi} = \infty$ . Ainsi, pour déterminer le mouvement du corps, il n'y a  
 qu'à intégrer les équations  $\frac{dy}{y^2 \Phi y} + \frac{dx}{\xi} = 0$ , &  $dt = \frac{dy}{y^2 \Phi y}$ ,  
 de manière que  $y$  soit nulle lorsque  $t = 0$ , &  $x = a$ ; & l'on  
 aura  $y$  en  $x$ , &  $t$  en  $y$ ; ou bien, à cause de  $y = \frac{u}{\xi}$ , on aura  $u$



en  $x$ , &  $t$  en  $x$ , &  $u$ . A l'égard du tems total, on le trouvera en faisant dans l'expression de  $t$ ,  $y = \infty$ .

#### COROLLAIRE IV.

Soit comme dans l'exemple ci-dessus

$$\phi y = f + \frac{g}{y} + \frac{h}{y^2}; \quad \& \quad \xi = f \frac{1 - e^{-kx}}{k},$$

en sorte que la résistance du milieu soit  $gu + ku^2$ , & la force sollicitatrice  $hf \frac{1 - e^{-kx}}{k}$ , l'équation  $\frac{dy}{y \phi y} + \frac{dx}{\xi} = 0$ , devien-

$$\text{dra } \frac{dy}{fy + g + \frac{h}{y}} + \frac{k dx}{f(1 - e^{-kx})} = 0, \quad \text{ou bien}$$

$$\frac{y dy}{h + gy + fy^2} + \frac{ke^{kx} dx}{f(e^{kx} - 1)} = 0,$$

dont l'intégrale prise de manière que  $y = 0$  lorsque  $x = a$ , est

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2f} \int \frac{h + gy + fy^2}{h} - \frac{g}{2f \sqrt{fh - \frac{1}{4}g^2}} \times \\ & \left( \text{Arc. tang. } \frac{fy + \frac{1}{2}g}{\sqrt{fh - \frac{1}{4}g^2}} - \text{Arc. tang. } \frac{\frac{1}{2}g}{\sqrt{fh - \frac{1}{4}g^2}} \right) \\ & + \frac{1}{f} \int \frac{e^{kx} - 1}{e^{ka} - 1} = 0, \end{aligned}$$

$$\text{c'est à dire, } \frac{e^{kx} - 1}{e^{ka} - 1} \times \sqrt{1 + \frac{g}{h}y + \frac{f}{h}y^2}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{g}{2 \sqrt{fh - \frac{1}{4}g^2}} \text{Arc. tang. } \frac{fy + \frac{1}{2}g}{\sqrt{fh - \frac{1}{4}g^2}}}{\frac{g}{2 \sqrt{fh - \frac{1}{4}g^2}} \text{Arc. tang. } \frac{\frac{1}{2}g}{\sqrt{fh - \frac{1}{4}g^2}}}, \end{aligned}$$

d'où



d'où l'on tirera la valeur de  $y$  en  $x$ . Ensuite on aura

$$u = fy \frac{1 - e^{kx}}{k}, \quad \&$$

$$t = \int \frac{dy}{y^2 \Phi y} = \int \frac{dy}{h + gy + fy^2},$$

c'est à dire en intégrant de manière que  $t = 0$ , lorsque  $y = 0$ ,

$$t = \frac{1}{V(fh - \frac{1}{4}g^2)} \times \left( \text{Arc.tang.} \frac{fy + \frac{1}{2}g}{V(fh - \frac{1}{4}g^2)} - \text{Arc.tang.} \frac{\frac{1}{2}g}{V(fh - \frac{1}{4}g^2)} \right).$$

Faisant  $y = \infty$ , on aura le tems total égal à

$$\frac{1}{V(fh - \frac{1}{4}g^2)} \left( \frac{\pi}{2} - \text{Arc. tang.} \frac{\frac{1}{2}g}{V(fh - \frac{1}{4}g^2)} \right),$$

$\pi$  étant l'angle de  $180^\circ$ .

$$\text{Soit } g = 0, \text{ on aura } \frac{e^{kx} - 1}{e^{ka} - 1} V \left( 1 + \frac{fy^2}{h} \right) = 1,$$

$$\text{d'où } V \left( 1 + \frac{fy^2}{h} \right) = \frac{e^{ka} - 1}{e^{kx} - 1}. \quad \text{On aura de plus}$$

$$t = \frac{1}{V(fh)} \text{Arc. tang.} \frac{fy}{V(fh)}.$$

$$\text{Or Arc. tang.} \frac{fy}{V(fh)} = \text{Arc. cof} \frac{1}{V \left( 1 + \frac{fy^2}{h} \right)}, \quad \text{donc}$$

$$t = \frac{1}{fh} \text{Arc. cof} \frac{e^{kx} - 1}{e^{ka} - 1},$$

$$\& \text{ faisant } x = 0, \quad \text{on aura le tems total} = \frac{\pi}{2 V(fh)}.$$



## S C H O L I E.

Si on vouloit que le tems employé à parcourir l'espace  $a$  fut proportionel à  $\Lambda^m$ , le probleme pourroit se résoudre de la même manière, en supposant  $\int \frac{dx}{u} = Z \Lambda^m$  ( $Z$  étant une fonction quelconque de  $z$ ) ce qui donneroit par la différentiation

$$\frac{\text{diff. } \int \frac{dx}{u}}{\int \frac{dx}{u}} = \frac{dZ}{Z} + \frac{m d\Lambda}{\Lambda},$$

c'est à dire, en substituant à la place de la différence de  $\int \frac{dx}{u}$  sa valeur trouvée dans le probleme précédent

$$\frac{\frac{\Lambda X' dz}{u} + \left( \frac{X' z}{Z} - A' \int \frac{Q dx}{u^2} \right) d\Lambda}{\int \frac{dx}{u}} = \frac{dZ}{Z} + \frac{m d\Lambda}{\Lambda}.$$

Donc, comparant ensemble les termes de  $d\Lambda$ ,

$$\frac{\frac{X' z}{u} - A' \int \frac{Q dx}{u^2}}{\int \frac{dx}{u}} = \frac{m}{\Lambda},$$

c'est à dire, en multipliant par  $\Lambda \int \frac{dx}{u}$ , & substituant  $\frac{X}{\Lambda}$  à la place de  $z$ ,  $\xi$  à la place de  $XX'$ , &  $\alpha$  à la place de  $\Lambda A'$ ,

$$\frac{\xi}{u} - \alpha \int \frac{Q dx}{u^2} = m \int \frac{dx}{u},$$

d'où



d'où en différenciant, on aura  $Q = \frac{u(d\xi - m dx) - \xi du}{u dx}$ ,

ou bien à cause de  $\frac{du}{dx} = -\frac{p}{u}$ ,

$$Q = \frac{u\left(\frac{d\xi}{dx} - m\right) + \frac{p\xi}{u}}{u}.$$

Ainsi on trouvera que la quantité  $\frac{u du + p dx}{u^2\left(\frac{d\xi}{dx} - m\right) + p\xi}$  doit être

une différentielle complète; de sorte qu'en faisant

$$u^2\left(\frac{d\xi}{dx} - m\right) + p\xi = r,$$

la question se réduira à rendre la quantité

$$\frac{\xi u du - u^2(d\xi - m dx)}{\xi r}$$

une différentielle exacte.

Qu'on mette  $\frac{dX}{X}$  à la place de  $\frac{dx}{\xi}$ , & qu'on divise le haut & le bas de la fraction par  $u^2$ , elle se changera en celle-ci

$$\frac{\frac{du}{u} - \frac{d\xi}{\xi} + \frac{m dX}{X}}{\frac{r}{u^2}},$$

c'est à dire en  $\frac{d, l \frac{u X^m}{\xi}}{\frac{r}{u^2}}$ ; d'où l'on voit que  $\frac{r}{u^2}$  doit être une

fonction de  $l \frac{u X^m}{\xi}$ , c'est à dire, de  $\frac{u X^m}{\xi}$ ; de sorte qu'on aura

$$r = u^2 \phi \left( \frac{u X^m}{\xi} \right), \text{ \& par conséquent}$$

$$p = u^2 \left[ -\frac{\phi \left( \frac{u X^m}{\xi} \right)}{\xi} - \frac{d\xi}{\xi dx} + \frac{m}{\xi} \right].$$

A l'égard de la valeur de X on la déterminera par le moyen de l'équation  $\frac{dX}{X} = \xi dx$ , laquelle donne  $X = e^{\int \xi dx}$ . Au reste on prouvera encore ici, comme on a fait dans la Remarque précédente, que la valeur de  $\xi$  doit être nulle lorsque  $x = 0$ .

$$\text{Soit } \phi \left( \frac{u X^m}{\xi} \right) = f + \frac{h\xi}{u^2 X^{2m}}, \text{ on aura}$$

$$p = \frac{h\xi}{X^{2m}} + u^2 \left( \frac{f + m}{\xi} - \frac{d\xi}{\xi dx} \right),$$

$$\text{\& faisant } \frac{f + m}{\xi} - \frac{d\xi}{\xi dx} = k, \text{ on aura}$$

$$\xi = \frac{f + m}{k} (1 - e^{-kx});$$

$$\text{donc } \frac{dX}{X} = \frac{dx}{\xi} = \frac{k e^{kx} dx}{(f + m)(e^{kx} - 1)}, \text{ d'où l'on tire}$$

$$lX = \frac{1}{f + m} l \frac{e^{kx} - 1}{k}, \text{ \& ensuite}$$

$$X = \left( \frac{e^{kx} - 1}{k} \right)^{\frac{1}{f + m}}.$$

Donc





Donc si on fait pour abrégér  $\frac{m}{f+m} = n$ , &  $h(f+m) = g$ ,  
on aura  $p = ge^{-kx} \left( \frac{e^{kx} - 1}{k} \right)^{1-2n} + ku^2$ , & le tems  
total employé à parcourir l'espace  $a$  sera proportionel à  $\left( \frac{e^{ka} - 1}{k} \right)^n$ .

Si  $k = 0$ , alors  $p = gx^{1-2n}$ , & le tems total devient  
proportionel à  $a^n$ .

#### A P P E N D I C E \*).

En examinant la solution que nous venons de donner du problème des tautochrones, il est aisé de voir qu'elle se réduit à faire en sorte que l'élément du tems  $dt$  soit de cette forme  $Ydy$ ,  $Y$  dénotant une fonction quelconque de  $y$ , &  $y$  étant  $= \frac{u}{\xi}$ . En effet, puisque au commencement du mouvement on a  $u = 0$ , & à la fin  $x = 0$ , & par conséquent aussi  $\xi = 0$  (hyp.), il est clair que le tems total sera égal à l'intégrale de  $Ydy$  prise de manière quelle soit nulle lorsque  $y = 0$ , & qu'elle finisse lorsque  $y = \infty$ , & qu'ainsi il fera tout à fait indépendant de l'arc parcouru, comme la nature du problème exige.

De là il s'ensuit que l'on peut rendre notre solution beaucoup plus générale en prenant pour  $y$  une fonction quelconque de  $u$  & de  $x$ , pourvu qu'elle soit nulle lorsque  $u = 0$ , & qu'elle soit infinie lorsque  $x = 0$ ; conditions qui peuvent avoir lieu d'une infinité de manières.

Soit donc  $y$  une fonction quelconque de  $u$ , & de  $x$ , telle que  $y = 0$  quand  $u = 0$ , &  $y = \infty$  quand  $x = 0$ , & soit  $dy = Mdu + Ndx$ ; qu'on dénote par  $Y$  une fonction quelconque de  $y$ , & l'on aura en général dans le cas du tautochro-

\*) Lu à l'Académie le 30. Avril 1767.



nisme  $dt = Y dy$ , c'est à dire, en mettant pour  $dt$  la valeur  $\frac{dx}{u}$ ,  
& pour  $dy$ ,  $M du + N dx$ ,

$$\left(\frac{1}{u} - YN\right) dx - YM du = 0.$$

Or l'équation  $u du + p dx = 0$  donne  $du = -\frac{p dx}{u}$ ; donc  
faisant cette substitution, & divisant toute l'équation par  $dx$ , on aura

$$\frac{1}{u} - YN + \frac{YMp}{u} = 0,$$

d'où l'on tire

$$p = \frac{Nu}{M} - \frac{1}{MY}.$$

C'est là, ce me semble, la solution la plus simple, & en même tems la plus générale, qu'on puisse donner du probleme dont il s'agit.





S U R

## LES TAUTOCHRONES.

PAR M. D'ALEMBERT.

I.

L'illustre M de la Grange m'ayant communiqué, il y a peu de tems, sans démonstration une formule générale & très simple qu'il a trouvée pour la solution du probleme des Tautochrones, cette formule a reveillé d'anciennes vues que j'avois pour cette solution, & a donné lieu aux recherches suivantes. J'exposerai mes idées dans l'ordre à peu près où elles se sont présentées à mon esprit; on verra d'abord comment, en généralisant & simplifiant la méthode de M. Fontaine, (v. Mém. Acad. des Sciences de Paris 1734.) je suis parvenu à une formule très simple pour le cas où les tems sont comme une fonction des arcs, formule dans laquelle celle de M. de la Grange est renfermée; on verra ensuite comment j'ai été conduit à une autre solution beaucoup plus simple & plus générale que la première. On trouvera enfin dans cet écrit quelques autres réflexions que la solution de la question propre m'a donné occasion de faire, & qui pourront, je crois, n'être pas sans utilité en quelques occasions.

2. Soit  $u$  la vitesse du corps,  $x$ , l'arc qui lui reste à parcourir,  $p$ , la force accélératrice le long de la courbe qu'il décrit, en sorte que l'on ait  $p dx + u du = 0$ . Soit à présent un autre arc  $x + \delta x$ , différent du précédent d'une quantité infiniment petite,  $p + \delta p$ , la force accélératrice, à l'extrémité supérieure de cet arc,  $u + \delta u$  la vitesse, on aura de même

$$(p + \delta p) d(x + \delta x) + (u + \delta u) d(u + \delta u) = 0,$$

Bbb 3

ou



ou  $p dx + \delta p dx + p d\delta x + u du + \delta u du + u d\delta u = 0$ ,  
 qui se réduit à  $\delta p dx + p d\delta x + \delta u du + u d\delta u = 0$ ,  
 à cause de  $p dx + u du = 0$ .

3. Maintenant, soit  $X$  l'arc total descendu ou remonté,  
 &  $\Delta(X)$  la fonction de cet arc qui représente le tems: cela posé,  
 imaginons (ce qui est permis) que le tems total par l'arc  $x$  est au  
 tems total par l'arc  $x + \delta x$  comme  $\Delta(X)$  est à  $\Delta(X + \delta X)$ ,  
 & que les tems par les arcs  $dx$  &  $d(x + \delta x)$  sont aussi dans  
 la même proportion; on aura

$$\frac{d(x + \delta x)}{u + \delta u} = \frac{dx}{u} : \frac{dx}{u} :: d(\Delta X) : \Delta X;$$

donc 
$$\frac{d\delta x}{u} = \frac{\delta u dx}{u^2} = \frac{dx}{u} \times \frac{d\Delta X}{\Delta X};$$

&  $\delta u = \frac{u d\delta x}{dx} = \frac{u d\Delta X}{\Delta X}$  donc en regardant, ce qui  
 est permis,  $dx$  &  $d\Delta X$  ainsi que  $X$  comme constans, on aura

$$d\delta u = \frac{du d\delta x}{dx} + \frac{u d d\delta x}{dx} = \frac{du d\Delta X}{\Delta X};$$

donc substituant ces valeurs dans l'équation

$$\delta p dx + p d\delta x + \delta u du + u d\delta u = 0,$$

& supposant, suivant les formules connues des Géomètres,

$$\delta p = \frac{dp}{dx} \delta x + \frac{dp}{du} \delta u = \frac{dp}{dx} \delta x + \frac{dp}{du} \left( \frac{u d\delta x}{dx} - \frac{u d\Delta X}{\Delta X} \right);$$

on aura l'équation

$$p dx d\delta x + u du dx \left( \frac{2 d\delta x}{dx} - \frac{2 d\Delta X}{\Delta X} \right) + u u d d\delta x \\ + \frac{dp}{dx} \delta x . dx^2 + \frac{u dp}{du} \left( \frac{d\delta x}{dx} - \frac{d\Delta X}{\Delta X} \right) = 0;$$

donc



donc divisant par  $\frac{2 d \delta x}{d x} - \frac{2 d \Delta X}{\Delta X}$ , & mettant pour  $u du$  la valeur  $-p dx$ , on aura l'équation finale

$$-\frac{p \delta v + \frac{2 p d \Delta X}{\Delta X} \frac{dp}{dx} \delta x \cdot dx}{\frac{2 \delta v}{dx} - \frac{2 d \Delta X}{\Delta X}} + \frac{\frac{dp}{dx} \delta x \cdot dx}{\frac{2 \delta v}{dx} - \frac{2 d \Delta X}{\Delta X}} + \frac{u p dx}{\frac{2 \delta v}{dx} - \frac{2 d \Delta X}{\Delta X}} + \frac{u u d d \delta x}{\frac{2 \delta v}{dx} - \frac{2 d \Delta X}{\Delta X}} = 0.$$

3. Soit maintenant  $p = u u k$ ,  $\delta x = d \omega c^{\int \zeta dx}$ ;  $d \omega$  étant une constante telle que  $\lambda d \omega = \frac{d \Delta : X}{\Delta X}$ ; on aura  $d \delta x = \zeta d \omega c^{\int \zeta dx}$ ;  $d d \delta x = d \omega (\zeta \zeta dx + d \zeta) c^{\int \zeta dx}$ ; & divisant par un & réduisant, il vient  $-k \frac{(\zeta^{\int \zeta dx} - 2 \lambda)}{2 (\zeta c^{\int \zeta dx} - \lambda)} + \frac{d k c^{\int \zeta dx}}{d x \cdot 2 (\zeta c^{\int \zeta dx} - \lambda)}$

$$+ k + \frac{u d k}{d u} + \frac{\left( \zeta \zeta + \frac{d \zeta}{d x} \right) c^{\int \zeta dx}}{2 (\zeta c^{\int \zeta dx} - \lambda)} = 0; \text{ d'où l'on tire}$$

l'équation fondamentale

$$k \zeta + \frac{d k}{d x} + \frac{u d k}{d u} (\zeta - \lambda c^{-\int \zeta dx}) + \zeta \zeta + \frac{d \zeta}{d x} = 0.$$

qui renferme la condition du problème.

4. Soit  $k = \xi + \xi' \lambda'$ ,  $\xi$  &  $\xi'$  étant des fonctions inconnues de  $x$ , &  $\lambda$  une fonction inconnue de  $x$  & de  $u$ , on aura

$$\xi \zeta + \frac{d \xi}{d x} + \frac{\lambda' d \xi'}{d x} + \frac{\xi' d \lambda'}{d x} + \xi' \zeta \lambda' + \frac{u \xi' d \lambda'}{d u} (\zeta - \lambda c^{-\int \zeta dx})$$

+



$+ \zeta \zeta + \frac{d\zeta}{dx} = 0$ ; faisons d'abord, ce qui est permis,

$\xi \zeta + \frac{d\xi}{dx} + \zeta \zeta + \frac{d\zeta}{dx} = 0$ , nous aurons

$d(\xi e^{f\zeta dx}) + d(\zeta e^{f\zeta dx}) = 0$ , d'où  $\xi = -\zeta + E e^{-f\zeta dx}$ ;

$E$  étant une constante quelconque; faisons ensuite, ce qui est permis

encore,  $\xi' \zeta \lambda' + \frac{\lambda' d\xi'}{dx} = 0$ , nous aurons  $\xi' = \Lambda e^{-f\zeta dx}$ ,  $\Lambda$

étant encore une constante quelconque; & enfin il ne nous restera

plus que l'équation  $\frac{\xi' d\lambda'}{dx} + \frac{u \xi' dx'}{du} (\zeta - \lambda e^{-f\zeta dx}) = 0$ ,

qui doit donner, en faisant  $d\lambda' = F dx + G du$ , l'équation

identique  $F = -G u (\zeta - \lambda e^{-f\zeta dx})$ ; d'où l'on voit que

$G du - G (\zeta u dx - \lambda u dx e^{-f\zeta dx})$  doit être une diffé-

rentielle complete. Donc, faisant  $\zeta dx - \lambda e^{-f\zeta dx} = \varrho dx$ ,

on aura  $G du - G u \varrho dx$  une différentielle complete, ou

$G e^{f\zeta dx} d(u e^{-f\zeta dx})$  une différentielle complete égale à  $d\lambda'$ ,

donc  $\lambda'$  doit être évidemment une fonction de  $u e^{-f\zeta dx}$ ; donc,

puisque  $k = \xi + \xi' \lambda'$ , & que  $p = u u k$ , on aura

$p = -u u \zeta + E u u e^{-f\zeta dx} + \Lambda e^{-f\zeta dx} \times u u \times \Phi(u e^{-f\zeta dx})$ .

5. Soit  $e^{\int \xi dx} = \varrho'$ , on aura  $\xi = \frac{d\varrho'}{\varrho' dx}$ ; &

$$\varrho = \frac{d\varrho'}{\varrho' dx} - \frac{\lambda}{\varrho'}, \text{ d'où } e^{-\int \xi dx} = \frac{1}{\varrho'} e^{\frac{\int \lambda dx}{\varrho'}}. \quad \text{Donc}$$

$$p = uu \left[ \frac{\phi \left( \frac{uc}{\varrho'} \right)}{\varrho'} - \frac{d\varrho'}{\varrho' dx} + \frac{E}{\varrho'} \right];$$

qui peut se réduire évidemment à

$$p = uu \left[ \frac{\Delta \left( \frac{uc}{\varrho'} \right)}{\varrho'} - \frac{d\varrho'}{\varrho' dx} \right].$$

6. Si la courbe est tautochrone, c'est à dire, si  $\Delta(X)$  est constant, alors  $\lambda = 0$ , & on aura

$$p = uu \left[ \frac{\phi \left( \frac{u}{\varrho'} \right)}{\varrho'} - \frac{d\varrho'}{\varrho' dx} \right];$$

c'est la formule que M. de la Grange m'a communiquée.

7. Les transformations que nous avons employées ci-dessus de  $p = uk$ , & de  $k = \xi + \xi' \lambda$ , n'ont eu pour objet que de simplifier la solution, & on auroit pu s'en passer. En effet, si nous n'avions point fait la transformation  $p = uk$ , nous aurions eu l'équa-

$$\text{tion } p\xi + \frac{dp}{dx} + \left( \frac{u}{du} \frac{dp}{du} - 2p \right) (\xi - \lambda e^{-\int \xi dx}) + \xi\xi + \frac{d\xi}{dx} = 0,$$





qu'on peut réduire à cette forme  $p\mu + \frac{dp}{dx} + \frac{uvdp}{du} + \varrho = 0$ ,  
 $\mu$ ,  $v$  &  $\varrho$  étant des fonctions données de  $u$  & de  $x$ . Supposons  
 maintenant  $p = \sigma\theta$ , ( $\sigma$  &  $\theta$  étant deux indéterminées variables)  
 on aura

$$\sigma\theta\mu + \frac{\sigma d\theta}{dx} + \frac{\theta d\sigma}{dx} + \frac{u\sigma v d\theta}{du} + \frac{u\theta v d\sigma}{du} + \varrho = 0;$$

qu'on peut séparer en ces deux-ci (à cause des deux indéterminées  $\sigma$   
 &  $\theta$ )  $\theta\mu + \frac{d\theta}{dx} + \frac{uvd\theta}{du} = 0$ , &

$$\frac{\theta d\sigma}{dx} + \frac{u\theta v d\sigma}{du} + \varrho = 0;$$

soit  $\theta = e^{\omega}$ , la première équation deviendra

$$\mu + \frac{d\omega}{dx} + \frac{uvd\omega}{du} = 0;$$

& supposant  $d\omega = A dx + B du$ , on aura

$$\mu + A + uvB = 0;$$

donc  $-\mu dx - uvB dx + B du$  doit être une différentielle  
 complète; donc  $B e^{-\int v dx} d(u e^{\int v dx}) - \mu dx$  doit être une diffé-  
 rentielle complète; d'où l'on tirera aisément  $B$  par les méthodes  
 connues, & par conséquent  $\omega$  &  $\theta$ ; ensuite l'équation

$$\frac{d\sigma}{dx} + \frac{uv d\sigma}{du} + \frac{\varrho}{\theta} = 0,$$

donnera (en faisant  $d\sigma = A' dx + B' du$ )  $-uvB' dx$   
 $- \frac{\varrho dx}{\theta} + B' du$  une différentielle complète, d'où l'on tirera  $B$ ,  
 par une méthode semblable, & la formule qui résultera de cette solu-  
 tion



tion reviendra à celle de l'art. 5, comme on peut s'en assurer par le calcul: mais revenons à cette formule.

8. On doit remarquer 1°. que puisque

$$\delta x = d\omega c^{\int \zeta dx} = \varrho' d\omega = \varrho' X' dx,$$

$X'$  étant une fonction de  $X$ , il faut que cette fonction  $X'$  soit telle que  $\varrho' X'$  soit  $= 0$  lorsque  $x = 0$ , &  $= 1$  lorsque  $x = X$ ;

donc, puisque  $\frac{d\omega}{dX} = \frac{d\Delta(X)}{\lambda \Delta(X)}$ , on aura évidemment  $X' = \frac{d\Delta(X)}{\lambda \Delta(X) dX}$ ,

& par conséquent  $\varrho' X' = \varrho' \frac{d\Delta(X)}{\lambda \Delta(X) dX}$ ; d'où l'on voit que si on

met dans  $\frac{\lambda \Delta(X) dX}{d\Delta(X)}$ ,  $x$  à la place de  $X$ , on aura la valeur de  $\varrho'$ ,

puisque  $\varrho' \frac{d\Delta(X)}{\lambda \Delta(X) dX}$  doit être  $= 1$  quand  $x = X$ .

2°. On voit de plus que  $du = \frac{u d\delta x}{dx} - \frac{u d\Delta X}{\Delta X}$ ; d'où

il s'ensuit qu'à cause de  $dx = \varrho' d\omega$ , on aura

$$du = u \left( \frac{d\varrho' d\omega}{dX} - \frac{d\Delta(X)}{\Delta(X)} \right);$$

donc, comme  $\frac{\delta u}{dx}$  n'est ni nulle ni infinie quand  $x = 0$ , il s'ensuit

que quand  $x = 0$ ,  $\frac{d\varrho'}{dx}$  ne doit en général être ni nulle ni infinie

(ainsi que M. de la Grange l'observe); nous ferons cependant plus bas quelques remarques à ce sujet.



9. Soit  $\Delta(X) = X^m$ , on aura  $\frac{\lambda \Delta(X) dX}{d\Delta(X)} = \frac{\lambda \cdot X}{m}$ ; donc

$$\varrho' = \frac{\lambda X}{m}; \text{ donc } e^{\int \frac{\lambda dx}{\varrho'}} = e^{m \int \frac{dx}{x}} = x^m; \text{ donc}$$

$$p = uu \left[ \frac{\phi \left( \frac{mu x^m}{\lambda x} \right)}{\frac{\lambda X}{m}} - \frac{1}{x} \right].$$

$$\text{Soit } \phi \left( \frac{mu x^m}{\lambda x} \right) = F + \frac{B \lambda^n x^n}{m^n u^n x^{mn}} + \frac{D \lambda^2 x^2}{m^2 u^2 x^{2m}}; \quad \&$$

$$p = \xi'' + \gamma u^p \text{ on aura}$$

$$\xi'' + \gamma u^p = uu \left( \frac{Fm}{\lambda x} - \frac{1}{x} \right) + B \lambda^{n-1} x^{n-1-mn} u^{2-n} \\ + \frac{D \lambda x^{2-2m}}{m^2};$$

$$\text{d'où l'on tire } \frac{Fm}{\lambda} = 1; \quad 2-n=p, \quad n-1-mn=0;$$

$$B \lambda^{n-1} = \gamma; \quad \xi'' = \frac{D \lambda x^{2-2m}}{m^2}, \text{ donc}$$

$$1-p-m(2-p) = 0;$$

$$\text{donc } p = \frac{1-2m}{1-m}, \quad \& \quad m = \frac{1-p}{2-p}; \text{ ce qui est conforme à ce qu'on fait d'ailleurs *)}.$$

On voit aussi qu'en nommant  $g$  la pesanteur &  $s$  l'abscisse, on aura  $g \frac{dS}{dx} = \xi'' = \frac{D \lambda x^{2-2m}}{m^2}$  d'où l'on tire  $gs = \frac{D' \lambda}{m^2} x^{2-2m}$ ,  $D'$  exprimant une constante.

10.

\*) Voyez Euler Mech. art. 593. T. II. on y nomme  $m$  ce que nous appelons ici  $p$ .



10. En général soit  $\frac{d \Delta x}{\lambda \Delta x dx} = \frac{1}{\varphi'}$ , ou plus simplement

$$\frac{d \Delta x}{\lambda \Delta x dx} = \xi, \quad \text{on aura } p = uu \frac{\Phi \left( \frac{u \Delta x \cdot d \Delta x}{\lambda \Delta x dx} \right) \times d \Delta x}{\lambda \Delta x dx}$$

$$+ \frac{u u d \xi}{\xi \cdot x} = uu \Phi \left( \frac{u d \Delta x}{\lambda dx} \right) \times \frac{d \Delta x}{\lambda \Delta x dx} + \frac{u u d d \Delta x}{d \Delta x \cdot dx} - \frac{u u d \Delta x}{\Delta x dx};$$

donc, si on fait  $\Delta x = \theta$ , on aura

$$p = uu \Phi \left( \frac{u d \theta}{\lambda dx} \right) \times \frac{d \theta}{\lambda \theta dx} + \frac{u u d d \theta}{d \theta dx} - \frac{u u d \theta}{\theta dx}.$$

$$\text{Soit } \Phi \left( \frac{u d \theta}{\lambda dx} \right) = F + \frac{B \lambda^n dx^n}{d \theta^n u^n} + \frac{C \lambda^2 dx^2}{d \theta^2 u^2}; \quad \& \text{ soit}$$

$$p = \xi'' + g u^2 + R u^k, \quad \text{on aura } \frac{F d \theta}{\lambda \theta dx} + \frac{d d \theta}{d \theta dx} - \frac{d \theta}{\theta dx} = g;$$

$$2 - n = k; \quad \frac{B \lambda^{n-1} dx^{n-1}}{\theta d \theta^{n-1}} = R; \quad \xi'' = \frac{C \lambda^2 dx^2}{d \theta^2}; \quad \text{d'où}$$

$$\frac{B^{\frac{1}{n-1}} \lambda dx}{\theta^{n-1} d \theta} = R^{\frac{1}{n-1}} \quad \& \quad \frac{\theta^{\frac{1}{n-1}} d \theta}{dx} = \frac{B^{\frac{1}{n-1}} \lambda}{R^{\frac{1}{n-1}}}; \quad \text{il est}$$

aisé de voir, que pour satisfaire à ces équations,  $\theta$  doit être une

puissance de  $x$ ; car l'équation  $\theta^{\frac{1}{n-1}} d \theta = \frac{B^{\frac{1}{n-1}} \lambda dx}{R^{\frac{1}{n-1}}}$  étant in-

tégrée ne doit point renfermer de constantes, puisque  $x = 0$  doit donner  $\theta = 0$  de plus  $g$  doit être  $= 0$ , car  $\theta$  étant une puissance de  $x$ , l'équation qui donne la valeur de  $g$  ne sauroit subsister



à moins que  $g$  ne soit nulle ; puisque cette équation se réduit à  $\frac{K dx}{x} = g$ , ainsi la valeur de  $p$  qu'on vient de trouver, retombe dans le cas de l'art. précédent.

11. Si on fait  $\lambda = 0$ , en sorte que la courbe soit tautochrone, & qu'on suppose avec M. de la Grange

$$\Phi \left( \frac{u}{\varrho'} \right) = F + \frac{G\varrho'}{u} + \frac{D\varrho'^2}{u^2} \quad \& \quad p = \xi'' + \Phi + \gamma u + \eta u^2,$$

$\Phi$ ,  $\gamma$  &  $\eta$ , étant des constantes données, &  $\xi'$  une fonction de  $x$ , on aura  $\xi'' + \Phi + \gamma u + \eta u^2 = \left( \frac{F}{\varrho'} - \frac{d\varrho'}{\varrho' dx} \right) u^2 + Gu + D\varrho'$ ; & mettant pour  $\xi''$  la valeur  $\frac{g ds}{dx}$ , & comparant on aura  $G = \gamma$ ;  $\frac{F}{\varrho'} - \frac{d\varrho'}{\varrho' dx} = \eta$ ;  $\frac{g ds}{dx} + \Phi = D\varrho'$ ; d'où l'on tire la valeur de  $\varrho'$  en  $x$ , savoir  $F dx = d\varrho' + \varrho' \eta dx$ , ou  $\frac{F}{\eta} + A e^{-\eta x} = \varrho'$ ; &  $ds = -\frac{\Phi dx}{g} + \frac{D\varrho' dx}{g}$ ; ou  $s = -\frac{\Phi x}{g} + \frac{F x}{g} + \frac{A \cdot D e^{-\eta x}}{-g\eta} (c-1)$ ; & comme  $\varrho'$  doit être  $= 0$  lorsque  $x = 0$ , on aura de plus  $A = -\frac{F}{\eta}$ ; donc  $\frac{g dx}{ds} + \Phi = \frac{DF}{\eta} (1 - e^{-\eta x})$ .

12. Voici maintenant par quelle suite de réflexions je suis parvenu à une solution plus générale & plus simple que la précédente.

Puisque dans les Tautochrones  $p = u u \left[ \Phi \frac{\left( \frac{u}{\varrho'} \right) - \frac{d\varrho'}{dx}}{\varrho'} \right]$ ,  
soit



soit  $\frac{u}{\varrho'} = z$ , on aura  $u = \varrho' z$  & à cause de  $p dx + u du = 0$

$\frac{dx \Phi z}{\varrho'} - \frac{d\varrho'}{\varrho} + \frac{du}{u} = 0$ , ou en mettant pour  $u$  la valeur

$\frac{dx \Phi z}{\varrho} + \frac{dz}{z} = 0$ , donc  $dx = -\frac{\varrho' dz}{z \Phi z}$  &  $dt = -\frac{dx}{u}$

ou  $-\frac{dx}{\varrho' z} = +\frac{dz}{z z \Phi z}$ ; or cette dernière quantité est

l'aire d'une courbe dont l'abscisse est  $z$ , & l'ordonnée  $\frac{1}{z z \Phi z}$ ; &

lorsque  $x = 0$  & par conséquent  $\varrho' = 0$ , comme il a été remarqué ci-dessus,  $z$  est infinie; d'où il est très aisé de voir que le

tems total  $\int -\frac{dx}{u}$ , finissant à  $x = 0$ , ou à  $z = \infty$ , sera

représenté par l'aire totale de cette courbe qui par conséquent sera toujours constante, puisque cette aire ne renferme que la variable  $z$ .

13. On doit pourtant remarquer deux choses 1°. que lorsque  $z$  est  $= 0$ , il faut que  $\frac{1}{z z \Phi z}$  soit finie, ou du moins telle

que l'aire  $\int \frac{dz}{z z \Phi z}$ , en prenant  $z$  très petite, ne soit pas infinie,

autrement le tems  $\int -\frac{dx}{u}$  seroit infini, ce qui ne doit pas être

supposé dans le probleme des Tautochrones. 2°. Que quand  $x = 0$ ,

& par conséquent  $z = \infty$ , il faut que  $\frac{1}{z z \Phi z}$  soit tel que l'aire

$\int \frac{dz}{z z \Phi z}$  ne soit pas infinie, afin que le tems  $\int \frac{dx}{u}$  soit encore

toujours fini & constant, d'où il s'enfuit



1°. que  $\Phi z$  doit être telle, qu'en prenant  $z$  très petite,  $zz\Phi z$  soit  $\equiv$  à une puissance  $z^k \equiv A z^{1-m}$ ,  $m$  étant un nombre positif.

2°. que par la même raison, en supposant  $z$  fort grand,  $zz\Phi z$  doit être  $\equiv B z^{1+m'}$ ,  $m'$  étant positif; le tout afin que l'intégrale dans le premier cas soit  $\equiv A z^m$ ,  $z$  étant très petit, & dans le second  $\equiv B z^{-m}$ ,  $z$  étant infini, ce qui rendra l'intégrale totale  $\int \frac{dx}{u}$  finie & constante.

14. On peut ajouter que lorsque  $u \equiv 0$ , il est nécessaire que  $z$  soit  $\equiv 0$ , afin que le tems  $\int \frac{dx}{u}$  soit  $\equiv 0$  lorsque  $u \equiv 0$ , & qu'il commence à  $z \equiv 0$ ; car, si  $z$  n'étoit pas  $\equiv 0$  lorsque  $u \equiv 0$ , l'aire  $\int \frac{dx}{u}$  pourroit n'être pas constante, puisqu'elle commenceroit ou du moins pourroit commencer à différentes valeurs de  $z$ ; d'où il s'ensuit, que  $\rho'$  doit être tel, non seulement qu'il soit  $\equiv 0$  lorsque  $x \equiv 0$ , mais qu'il ne soit  $\equiv 0$  que quand  $x \equiv 0$ .

15. Soit maintenant, pour généraliser s'il est possible la formule de l'art. 6.  $p \equiv u^m \rho' \left( \frac{\Phi u^m}{\rho'} \right) \equiv u^m \times \left( \frac{u^m}{\rho'} \right)^k \times X$ ,

$m, q, k$  étant des indéterminées,  $\rho'$  une fonction quelconque de  $x$ , &  $\xi, X$  des fonctions inconnues de  $x$ , on aura en faisant  $\frac{u^m}{\rho'} \equiv z$ ,

ce qui donne  $\frac{du}{u} \equiv \frac{d\rho'}{m\rho'} - \frac{dz}{mz}$ , l'équation

$$dx \Phi z$$





$$\frac{dx \phi z}{\xi} - z^k X dx + \frac{d\varrho}{m\varrho} \cdot \varrho^{\frac{2-mq}{m}} z^{\frac{2-mq}{m}} + \frac{dz}{mz} \varrho^{\frac{2-mq}{m}} z^{\frac{2-mq}{m}} = 0;$$

d'où faisant évanouir les deux termes du milieu on a

$$k = \frac{2-mq}{m}, \quad X = -\frac{d\varrho}{m} \times \varrho^{\frac{2-mq}{m}-1}; \quad \&$$

$$dx = -\frac{\xi dz}{\phi z \cdot m z} \varrho^{\frac{2-mq}{m}} z^{\frac{2-mq}{m}}; \quad \text{donc } \frac{dx}{u} \quad \text{ou}$$

$$\frac{\frac{dx}{\varrho^{\frac{1}{m}} z^{\frac{1}{m}}}}{\frac{1}{\varrho^{\frac{1}{m}} z^{\frac{1}{m}}}} = -\frac{\xi dz}{m z \phi z} \varrho^{\frac{2-mq}{m}} z^{\frac{2-mq}{m}}; \quad \text{donc il faut que } \xi \text{ soit}$$

$$B = \varrho^{\frac{-1+mq}{m}} \quad \text{pour que } \frac{dx}{u} \text{ ne soit exprimé qu'en } dz \text{ \& en } z.$$

16. Donc on aura l'équation générale

$$p = u^{mq} \frac{\left(\phi \frac{u^m}{\varrho'}\right)}{B \varrho'^{-\frac{1}{m}} + q} - u^{mq} \times \left(\frac{u^m}{\varrho'}\right)^{\frac{2-mq}{m}} \times \frac{d\varrho'}{m dx} \left(\varrho'^{\frac{2-mq}{m}} - 1\right),$$

qui se réduit à

$$p = u^{mq} \frac{\phi \left(\frac{u^m}{\varrho'}\right)}{B \varrho^{-\frac{1}{m}} + q} - \frac{u^2 d\varrho'}{\varrho' m dx}.$$



17. Comme  $m$  est indéterminée, soit supposé pour plus de

simplicité  $m = 1$ , & on aura  $p = \frac{u^q \Phi \frac{u}{\rho'}}{B \rho'^q - 1} - u^2 \times \frac{d\rho}{\rho dx}$ ; & en effet l'équation  $p dx + u du = 0$ , donne en ce cas

$$\frac{u^q \Phi z dx}{B \rho'^q - 1} - \frac{u^2 d\rho}{\rho} + u du = 0,$$

$$\text{ou } \frac{u^{q-2} \Phi z \cdot dx}{B \rho'^q - 1} + \frac{dz}{z} = 0, \quad \&$$

$$\frac{dx}{u} = - \frac{dz}{z} \cdot \frac{B \rho'^q - 1}{u^{q-1} \Phi z} = - \frac{dz}{z} \times \frac{B}{z^{q-1} \Phi z}, \quad \text{donc \&c.}$$

nous verrons dans un moment que la formule de la valeur de  $p$ , qui donne ce résultat, n'est pas au fond plus générale que celle de l'art. 6, quoiqu'elle le paroisse davantage; mais nous nous sommes proposé d'exposer dans ce mémoire les pas successifs que nous avons faits pour arriver à la formule générale qu'on trouvera plus bas art. 20. nous avons cru que l'exposé & le détail de notre marche pourroit être de quelque utilité aux Géomètres.

18. Avant donc que d'en venir à cette formule, nous remarquerons qu'on peut encore généraliser le calcul en cette sorte; soit

$$p = u^{mq} \frac{\Phi \left( \frac{u^m}{\rho'} \right)}{\xi} - u^{mq} \cdot u^{m\lambda} z^k X,$$

on aura

$$\frac{dx \Phi z}{\xi} - \frac{1}{\rho'^m} \cdot m\lambda \cdot \frac{1}{z^m} \cdot m\lambda \cdot z^k X dx + \left( \frac{d\rho}{m\rho} + \frac{dz}{mz} \right) \rho^{\frac{2-mq}{m}} z^{\frac{2-mq}{m}} = 0,$$

d'où



d'où l'on tire en faisant évanouir le terme du milieu  $z^{\lambda+k} = z^{\frac{2-mq}{m}}$ ,  
d'où  $k = z^{\frac{2-mq}{m} - \lambda}$ ,  $X = -\frac{d\rho}{m} \times \rho^{\frac{2-mq}{m} - 1 - \lambda}$ , &  
 $\frac{dx}{u} = -\frac{\xi}{\phi z} \times \frac{dz}{mz} \rho^{\frac{1-mq}{m}} z^{\frac{1-mq}{m}}$ ; donc  $\xi$  doit être  $= B \rho^{\frac{-1+mq}{m}}$ ;

donc  $p = u^{mq} \frac{\phi \frac{u^m}{\rho'}}{B \rho'^{q - \frac{1}{m}}} = \frac{u^2 d\rho'}{m \rho' dx}$  formule qui est la même  
que la précédente.

19. Elle paroît d'abord plus générale que la formule trouvée  
ci-dessus  $p = \frac{u^2}{\rho'} \phi \frac{u}{\rho'} = \frac{u^2 d\rho'}{\rho' dx}$ ; mais il est facile de se détrom-

per; en effet soit  $\rho'^{\frac{1}{m}} = \rho$  on aura  $\phi \left( \frac{u^m}{\rho'} \right) \times \frac{1}{B} = \frac{1}{B} \phi \left( \frac{u^m}{\rho^m} \right)$   
 $= \phi' \frac{u}{\rho}$ ;  $\frac{u^{mq}}{\rho'^q} = \left( \frac{u}{\rho} \right)^m$ ;  $\frac{d\rho'}{m\rho'} = \frac{d\rho}{\rho}$ ; donc la formule

$$p = \frac{u^{mq} \phi \left( \frac{u^m}{\rho'} \right)}{B \rho'^{q - \frac{1}{m}}} = \frac{u^2 d\rho'}{m \rho' dx} = \frac{u^m}{\rho^m} \times \rho \times \phi' \left( \frac{u}{\rho} \right) = \frac{u^2 d\rho}{\rho dx},$$

ou  $\rho \Delta \left( \frac{u}{\rho} \right) = \frac{u^2 d\rho}{\rho dx}$ ; or la formule trouvée ci-dessus

$$p = \frac{u^2}{\rho} \phi \left( \frac{u}{\rho} \right) = \frac{u^2 d\rho}{\rho dx} \text{ se change aisément en } p = \rho \Delta \frac{u}{\rho} \\ = \frac{u^2 d\rho}{\rho dx} \text{ puisque } \frac{u^2}{\rho} \phi \left( \frac{u}{\rho} \right) = \rho \cdot \frac{u^2}{\rho^2} \phi \left( \frac{u}{\rho} \right) = \rho \Delta \left( \frac{u}{\rho} \right).$$

Donc &c.

20. Mais voici une méthode très générale & très simple pour avoir la valeur de  $p$ ; on considérera que le tems  $t$  ou  $\int - \frac{dx}{u}$ , pour être toujours constant & fini, doit être égal à une fonction de  $u$  & de  $x$ , qui soit  $= 0$  quand  $u = 0$ , & qui ne soit ni infinie ni  $= 0$ , mais finie & constante, quand  $x = 0$ ,  $u$  étant alors finie; on prendra donc pour exprimer le tems  $t$ , une telle fonction à volonté de  $u$  & de  $x$ , ce qui se peut faire d'une infinité de manières (comme il est évident;) Soit  $A dx + B du$  la différentielle de cette fonction on aura  $-\frac{dx}{u} = A dx + B du$ ; donc  $-dx = A u dx + B u du$ ; & à cause de  $p = -\frac{u du}{dx}$ , on aura  $p = + \frac{1 + A u}{B}$ .

21. Soit par exemple  $t = \Delta \left( \frac{u}{\xi} \right)$ ; (en prenant  $\Delta \left( \frac{u}{\xi} \right)$  telle qu'elle ait les conditions requises,) on aura

$$A = - \frac{d\xi}{\xi^2} \frac{u}{dx} \times \Gamma \left( \frac{u}{\xi} \right); \quad B = \frac{1}{\xi} \times \Gamma \frac{u}{\xi};$$

donc  $p = + \xi \Gamma \left( \frac{u}{\xi} \right) - \frac{u^2 d\xi}{\xi dx}$ , formule qui revient à celle de

Part. 6. puisque  $\frac{u u \phi \left( \frac{u}{\xi} \right)}{\xi} = \xi \left( \frac{u^2}{\xi^2} \right) \phi \left( \frac{u}{\xi} \right) = \xi \Gamma \left( \frac{u}{\xi} \right)$ ,

comme on l'a déjà vu plus haut.

22. Soit  $p = g\xi' + \phi u$ ,  $\xi'$  étant une fonction inconnue de  $x$ , on aura en général  $g\xi' + \phi u = + \frac{1 + A u}{B}$ ;  

donc



donc  $A = \frac{g\xi'B + \Phi u \cdot B - 1}{u}$ ; donc puisque  $A dx + B du$  est une différentielle complète (hyp.) il est clair que

$$\frac{g\xi'B dx}{u} + \frac{B dx \Phi u}{u} - \frac{dx}{u} + B du$$

doit être une différentielle complète.

23. On peut voir par le calcul suivant un essai de la bonté de cette formule. Soit  $z = \int \frac{dz}{F + Gz + Hz^2}$ ;  $z$  étant  $= \frac{u}{\xi}$ ; la valeur supposée à  $z$  aura en ce cas les conditions requises, & on aura  $\frac{dx}{u} = \left( \frac{du}{\xi} - \frac{u d\xi - dx}{\xi^2 dx} \right) : \left( F + \frac{Gu}{\xi} + \frac{Hu^2}{\xi^2} \right)$ ;

par conséquent  $B = + \frac{1}{F\xi + Gu + \frac{Hu^2}{\xi^2}}$ ; donc  $p$ , ou

$$+ \frac{1}{B} + \frac{Au}{B} = + F\xi + Gu + \frac{Hu^2}{\xi} - \frac{u^2 d\xi}{\xi dx};$$

donc si on suppose  $p = g\xi' + Gu + Ku^2$ , on aura  $g\xi' = + F\xi$ ;

$$+ \frac{H}{\xi} - \frac{d\xi}{\xi dx} = K; \quad \Phi u = Gu + Ku^2;$$

donc la quantité  $\frac{g\xi'B dx}{u} + \frac{B dx \Phi u}{u} - \frac{dx}{u} + B du$  qui doit être une différentielle complète, deviendra

$$+ \frac{\frac{F\xi dx}{u} + \frac{Gudx}{u} + \frac{Ku^2 dx}{u}}{F\xi + Gu + \frac{Hu^2}{\xi}} - \frac{dx}{u} - \frac{du}{F\xi + Gu + \frac{Hu^2}{\xi}};$$



qui se réduit, en mettant pour  $K$  la valeur  $+\frac{H}{\xi} - \frac{d\xi}{\xi dx}$ , & en faisant  $\frac{u}{\xi} = z$ , à la quantité  $\frac{dz}{F + Gz + Hz^2}$ , la quelle est en effet une différentielle complete, & a d'ailleurs les propriétés exigées ci-dessus, savoir d'être  $= 0$  quand  $z = 0$ , & finie & constante quand  $z = \infty$ .

24. On vient de voir que  $t$  peut être  $=$  à une fonction de  $x$  & de  $u$  qui soit finie quand  $x = 0$ , & nulle quand  $u = 0$ , donc si on fait  $t = \Delta\left(\frac{u}{\xi}\right)$ ; il faut que  $\Delta\left(\frac{u}{\xi}\right)$  remplisse ces conditions; donc si on fait  $\frac{u}{\xi} = Z$ , il faudra que  $\Delta\left(\frac{u}{\xi}\right)$ . Soit  $= \int \psi z dz$ ,  $\psi z$  étant (art. 13.) une quantité qui, lorsque  $Bz^m$ ,  $m$  étant positif, ou  $= Bz^{-q}$ ,  $q$  étant  $< 1$ , & qui lorsque  $z = \infty$ , soit  $= Cz^{-s}$ ,  $s$  étant  $> 1$ .

25. Puisque  $t$  ou  $f - \frac{dx}{u} = \Delta\left(\frac{u}{\xi}\right)$ ; donc

$$\delta t = \left( \frac{\delta u}{\xi} - \frac{u d\xi}{\xi^2 dx} \delta x \right) \Gamma\left(\frac{u}{\xi}\right);$$

par conséquent puisque  $\delta t$  doit être égal  $= 0$ , on aura  $\frac{\delta u}{u} = \frac{d\xi \delta x}{\xi dx}$ ; ce qu'on peut voir d'ailleurs en considérant, que  $t$

fera le même pour deux arcs  $x$  &  $x + \delta x$ , si  $\frac{u}{\xi}$  est le même pour ces deux arcs, c. à d. si  $\delta\left(\frac{u}{\xi}\right) = 0$ , ou  $\frac{\delta u}{u} = \frac{d\xi \delta x}{\xi dx}$ ,  
main-

maintenant la condition de  $\delta t = 0$ , donne  $\frac{dx}{u} = d \frac{(x + \delta x)}{u + \delta u}$ ,  
 d'où  $\frac{\delta u}{u} = \frac{d\delta x}{dx}$ ; donc  $\frac{d\delta x}{dx} = \frac{d\xi \delta x}{\xi dx}$ , &  $\frac{d\delta x}{\delta x} = \frac{d\xi}{\xi}$ ;  
 donc on aura comme ci-dessus  $\delta x = \xi d\omega$ ,  $d\omega$  étant une constante;  
 donc  $\xi = 0$  quand  $x = 0$ , &  $d\xi = dx$  lorsque  $x = 0$ ,  
 au moins en supposant que  $\delta u$  ne soit pas  $= 0$  quand  $x = 0$ .

26. Une autre raison pour laquelle  $\xi$  doit être  $= 0$  quand  $x = 0$ , c'est que la quantité  $t = \Delta \left( \frac{u}{\xi} \right)$  doit être telle qu'elle soit  $= 0$  quand  $u = 0$ , & finie & constante quand  $x = 0$ , or cela ne se peut faire que par la condition que  $\xi$  soit nulle quand  $x = 0$ ; autrement, comme  $u$  est variable quand  $x = 0$ , si  $\xi$  étoit finie alors,  $\Delta \left( \frac{u}{\xi} \right)$  seroit variable, quand  $x = 0$ , ce qui ne doit pas être; & si  $\xi$  étoit infinie,  $\Delta \left( \frac{u}{\xi} \right)$  seroit ou pourroit être être  $= 0$ , (ou finie & variable) quand  $x = 0$ , ce qui ne doit pas être non plus.

27. Quant la condition de  $\frac{d\xi}{dx} = a$  à une quantité finie  $a$  lorsque  $x = 0$ , elle ne paroît pas si essentiellement nécessaire; car la condition que  $t = \int \frac{dz}{z^2 \Phi z}$  soit fini lorsque  $z = \infty$ , (art. 13.) donne seulement, en faisant  $z = y^{-1}$ ,  $\int \frac{dy}{\Phi \frac{1}{y}}$  finie quand  $y = 0$ ;

mais la condition que  $\frac{d\xi}{dx}$  soit  $= a$  quand  $x = 0$ , demande que  
quand





quand  $x$  est infiniment petite,  $\xi$  se réduit à une quantité de cette forme  $ax$ , or cette dernière condition ne paroît pas absolument nécessaire, il est seulement indispensable que  $\xi = 0$  quand  $x = 0$ ; par exemple si  $\xi$  est  $= Ax^2 + Bx^3$ , &  $t = \int \frac{dz}{a + bz + cz^2}$ , la courbe sera tautochrone, quoique  $\frac{d\xi}{dx}$  soit  $= 0$ , quand  $x = 0$ , de même si  $\xi = A\sqrt{x} + Bx^2$ ,  $t$  conservant la même valeur, la courbe sera tautochrone quoique  $\frac{d\xi}{dx}$  soit  $= \infty$  lorsque  $x = 0$ . En un mot il paroît suffire pour le tautochronisme que  $\xi = 0$  lorsque  $x = 0$ , & que  $t$  soit exprimé alors par une fonction finie & constante laquelle soit aussi  $= 0$  quand  $u = 0$ .

28. Nous avons vu que pour que  $\int \frac{dz}{zz\phi z}$  soit  $= 0$  quand  $z = 0$ , & finie constante quand  $x = 0$ ; il faut 1°. que  $z$  soit infinie quand  $x = 0$ , 2°. que  $z^2\phi z$  (art. 12.) puisse être réduite quand  $z = 0$ , à une quantité de cette forme  $Bz^q$ ,  $q$  étant  $= 0$ , ou  $< 1$ ; & quand  $z = \infty$  à une quantité de cette forme  $Az^k$ ,  $k$  étant  $> 1$ , donc on peut supposer  $zz\phi z = Bz^q \dots + Az^k$ ; donc puisque  $p = \xi(zz\phi z) - \frac{u^2 d\xi}{\xi dx}$ , on peut supposer

$$p = \xi(Bz^q + \dots + Az^k) - \frac{u^2 d\xi}{\xi dx} = \frac{u}{z} (Bz^q + \dots + Az^k) - z\xi \frac{d\xi}{dx},$$

on sent bien au reste que cette formule n'est qu'un cas particulier des valeurs infiniment variées, qu'on peut supposer à volonté à la quantité  $zz\phi z$ .

29. Pour que  $t$  soit fini & constant quand  $x = 0$ , il faut comme nous venons de le voir que  $t = \int \frac{dz}{Z}$ ,  $z$  étant une fonction

tion



tion de  $u$  & de  $x$  qui soit  $= 0$  quand  $u = 0$ , & infinie quand  $x = 0$ ; &  $Z$  une fonction de  $z$  qui soit  $= C$  ou  $Bz^q$  quand  $z = 0$ ,  $q$  étant négatif ou  $< 1$ , &  $= Az$  quand  $z = \infty$ ,  $q$  étant  $> 1$ . De là il résulte que, si on fait  $t = \int \frac{dz}{Z} + \int \frac{dz'}{Z'} + \&c.$  à l'infini,  $z$  &  $z'$  &c. étant des fonctions quelconques de  $u$  & de  $x$  &  $Z, Z' \&c.$  des fonctions de  $z, z' \&c.$  formées suivant ces conditions, on aura  $t =$  à une constante; & si on ajoute de plus à cette valeur (pour la rendre aussi générale qu'il est possible) la quantité quelconque  $\Phi(u, x)$  telle qu'elle soit  $= 0$ , quand  $x = 0$  & quand  $u = 0$ , on aura encore une valeur plus générale de  $t$ ; ce qui conduit à une formule infiniment générale.

30. Il est aisé de voir que  $p = \xi \Gamma \left( \frac{u}{\xi} \right) - \frac{u u d\xi}{\xi dx}$  ne sauroit être  $= \xi'' + \Phi u$ , que dans le cas où l'on aura  $\Gamma \frac{u}{\xi} = F = G \frac{u}{\xi} + \frac{Hu^2}{\xi^2}$ . Mais est clair par ce qui précède que l'on peut supposer par exemple  $t = \Delta \left( \frac{u}{\xi} \right) + \Gamma \left( \frac{u}{X} \right) + \&c.$   $+ \Phi(u, x)$  ou  $dt = \frac{dz}{Z} + \frac{dz'}{Z'} + \frac{dz''}{Z''} + \&c. + p dx + \sigma du$ ; d'où l'on voit que, à cause de  $dz = \frac{dz}{dx} dx + \frac{dz}{du} du \&c.$  on aura les équations,  $A = p + \frac{dz}{dx \cdot Z} + \frac{dz'}{Z' dx} + \frac{dz''}{Z'' dx} \&c.$   $B = \sigma + \frac{dz}{du \cdot Z} + \frac{dz'}{du \cdot Z'} + \frac{dz''}{du \cdot Z''} \&c.$  Donc à cause de  $p = \frac{1 + A u}{B}$ ,



on aura

$$p = \frac{\left( \rho Z Z' Z'' + \frac{dz}{dx} Z' Z'' + \frac{dz'}{dx} Z Z'' + \frac{dz''}{dx} Z Z' \right) u + Z Z' Z''}{\sigma Z Z' Z'' + \frac{dz}{du} Z' Z'' + \frac{dz'}{du} Z Z'' + \frac{dz''}{du} Z Z'}$$

31. Si donc on a  $p = \xi'' + \Phi u$ , on tâchera de déterminer les quantités  $\rho, \sigma, z, z', z'', Z, Z', Z''$  &c. à être telles que la formule précédente soit  $\equiv$  à cette fonction; ce qui ouvre un vaste champ aux recherches des analystes.

32. Soit, par exemple, pour abrégér  $\rho = 0, \sigma = 0$ , c.àd.

$\Phi(u, x) = 0, z' = 0, z'' = 0$  &  $z = \frac{\Delta u}{\xi}$ , on aura

$$Z = B \frac{\Delta u^{-q}}{\xi^q} + \text{&c.} + A \frac{\Delta u^{-k}}{\xi^k}, \quad \frac{dz}{dx} = - \frac{d\xi}{\xi^2 dx} \Delta u;$$

$$\frac{dz}{du} = \frac{d\Delta u}{du \xi} \quad \text{donc} \quad p = Z \xi \frac{du}{d\Delta u} - \frac{d\xi}{\xi dx} \times \frac{\Delta u du}{d\Delta u}$$

$$= \frac{\xi du}{d\Delta u} \left[ \frac{B \Delta u^{-q}}{\xi^q} + \dots + \frac{A \Delta u^{-k}}{\xi^k} \right] - \frac{u d\xi}{\xi dx} \cdot \frac{du \Delta u}{d\Delta u}.$$

On sent qu'il seroit facile de pousser beaucoup plus loin ces recherches que j'abandonne à d'autres.

33. Si on fait  $t = \Delta(u, x)$  avec les conditions énoncées ci-dessus, on aura  $\delta t = 0$ , &  $A \delta x + B \delta u = 0$ ,

$$\text{ou } \delta u = - \frac{A \delta x}{B}, \text{ de plus } \frac{\delta u}{u} = \frac{d\delta x}{dx}; \text{ donc } - \frac{A \delta x}{B} = \frac{u d\delta x}{dx};$$

$$\text{donc } - \frac{A dx}{B} = \frac{d\delta x}{dx}; \text{ donc } \delta x = d\omega e^{\int - \frac{A dx}{B}}; \text{ donc}$$

$$\delta u =$$



$\delta u = - \frac{A u d\omega}{B} e^{\int - \frac{A dx}{B}}$ ; d'où il est clair 1°. que  $e^{\int - \frac{A dx}{B}}$  doit être  $= 0$  lorsque  $x = 0$ , afin que  $\delta x$  soit alors  $= 0$ ; 2°. que, si  $\delta u$  n'est pas alors  $= 0$ ,  $-\frac{A}{B}$  doit être  $= \infty$  lorsque  $x = 0$ . Mais la condition que  $\delta u$  ne soit pas  $= 0$ , ne paroît pas absolument nécessaire; comme il résulte des art. 25 & 27. ci-dessus.

34. Au lieu de faire  $\int - \frac{dx}{u} = \Delta(u, x)$  avec les conditions requises, on pourroit croire qu'il suffit de supposer  $\int \frac{dx}{u} = \Delta(u, x) + C$ ,  $C$  étant une constante, &  $\Delta(u, x)$  une telle fonction de  $x$  & de  $u$ , qu'elle soit  $= 0$  quand  $x = 0$  & quand  $u = 0$ . Dans cette équation, qui seroit beaucoup plus simple que les précédentes,  $\int \frac{dx}{u}$  représenteroit non pas les tems  $t$  employés à parcourir les différentes parties de l'arc  $x$  jusqu'au point le plus bas, mais les complémens de ces tems. Mais il est aisé de voir que cette équation  $\int - \frac{dx}{u} = \Delta(u, x) + C$ , doit être rejetée; parce qu'en faisant  $x = 0$ , on auroit  $\int \frac{dx}{u} = C$ , ce qui ne doit pas être, puisque  $\int \frac{dx}{u}$  doit être alors  $= 0$ ; & qu'en supposant  $C = 0$ , on auroit  $\int \frac{dx}{u} = 0$  lorsque  $u = 0$ , ce qui ne doit pas être non plus.

25. Cependant, si on veut que les tems  $t$  soient proportionnels à  $\Phi(x)$ , on peut très bien supposer  $\int \frac{dx}{u} = \Delta(u, x) + \Phi x$ ,



$\Delta(u, x)$  étant  $\equiv 0$  lorsque  $x \equiv 0$ , & lorsque  $u \equiv 0$ , pourvu que  $\Phi x$  soit aussi  $\equiv 0$  lorsque  $x \equiv 0$ ; en ce cas on aura

$$\frac{dx}{u} = A dx + B du + X dx, \quad X \text{ étant une fonction de } x;$$

$$\text{ou } dx = A u dx + B u du + X u dx$$

& p ou  $-\frac{u du}{dx} = -\frac{1 + A u + X u}{B}$ ; formule générale

de la valeur de  $p$ , quand les tems sont comme  $\int X dx$ . Il faut seulement remarquer 1°. que comme  $\Delta(u, x)$  est  $\equiv 0$  lorsque

$u \equiv 0$  &  $x \equiv 0$ , & que  $\int \frac{dx}{u}$  doit toujours aller en augmen-

tant depuis  $x \equiv 0$ , jusqu'à  $u \equiv 0$ ,  $\Phi x$  doit être tel que  $\Phi x + \Delta(u, x)$  aille toujours en augmentant depuis  $x \equiv 0$  jusqu'à  $u \equiv 0$ . 2°. que cette formule ne peut servir (arr. précéd.) pour les cas du tautochronisme, c. à d. pour le cas où  $\Phi x$  est  $\equiv$  à une constante  $C$ .

36. A l'occasion de ces solutions que je viens de donner du problème des tautochrones je dirai un mot des tautochrones dans les milieux qui résistent peu; on a dans ce cas (en appelant  $y$  les abscisses répondantes aux arcs  $x$ )  $g dy + a \Phi u dx + u du \equiv 0$ ; si  $a$  étoit  $\equiv 0$ , on auroit  $g dy \equiv A x dx$ , comme l'on fait,

&  $u u \equiv \frac{A g}{2} (BB - x x)$ ; supposons  $\Phi u \equiv u^m$ ,  $m$  étant  $\equiv$  ou  $> 0$ , comme il est évident que cela doit être, car autrement la résistance seroit d'autant plus grande que  $u$  seroit plus petite, ce

qui seroit absurde, on aura  $g dy + a N (BB - x x)^{\frac{m}{2}} dx + u du \equiv 0$ ; soit  $dy \equiv A x dx + C x^q dx$ ,  $C$  &  $q$  étant des constantes indéterminées, on aura

$$u^2 \equiv \frac{A g}{2} (BB - x x) + \frac{g C}{q+1} (B^{q+1} - x^{q+1}) - \int a N (BB - x x)^{\frac{m}{2}} dx;$$

d'où



d'où il est aisé de tirer la valeur de  $C$  & celle de  $q$  par les méthodes connues. V. Euler Méchan. T. II. p. 404.

37. Je ferai seulement ici deux remarques

1°. Comme  $m$  n'est jamais négatif,  $\int a N (BB - xx)^{\frac{m}{2}} dx$  n'est jamais  $> \int a N dx = a N (B - X)$ ; d'où il s'ensuit que  $BB - xx$  ou  $(B - x) (B + x)$  est toujours beaucoup plus grand que  $a N (B - x)$  & à plus forte raison que

$\int a N (BB - xx)^{\frac{m}{2}} dx$  lorsque  $m$  n'est pas  $= 0$ ; par la même raison, dans la quantité  $B^{q+1} - x^{q+1}$ ,  $q$  n'est jamais  $< 0$ ; en sorte que  $BB - xx$  est toujours beaucoup plus grand que  $c (B^{q+1} - x^{q+1})$  & par conséquent que le développement de  $\frac{dx}{\sqrt{(u)}}$  en série n'entraîne aucun inconvénient, parce que  $\frac{dx}{\sqrt{(u)}}$

$$\text{étant} = \frac{dx}{\sqrt{(BB - xx + k)}} = \frac{dx}{\sqrt{(BB - xx)}} - \frac{k dx}{2(BB - xx)^{\frac{3}{2}}}$$

le terme  $k$  est toujours beaucoup plus petit que  $BB - xx$ .

2°. Si, au lieu de supposer  $dy = Ax dx + Cx^q dx$ , on supposoit, comme il semble très naturel,  $dx = \frac{B dy}{\sqrt{y}} + Ey^k dy$ , on

tomberoit dans un résultat très fautif en certains cas. Car on auroit alors  $g dy + a \phi u dx + u du = 0$ , ou  $u du + g dy$

$$+ \frac{B dy}{\sqrt{y}} \times a \phi (k - y) = 0; \text{ ou } u = g(k - y) - \int a (k - y)^{\frac{m}{2}} \frac{dy}{\sqrt{(y)}};$$

$$\text{donc } \frac{dx}{u} = \frac{\frac{B dy}{\sqrt{y}} + Ey^k dy}{\sqrt{\left(g(k - y) - \int a (k - y)^{\frac{m}{2}} \frac{dy}{\sqrt{(y)}}\right)}}; \text{ or dans}$$

le radical que cette quantité renferme, le terme  $f a (k - y)^{\frac{m}{2}} \frac{dy}{\sqrt{y}}$

n'est jamais  $> \int \frac{a dy}{\sqrt{y}}$  c. à d.  $> f a (\sqrt{k} - \sqrt{y})$ ; donc, puisque

$k - y = (\sqrt{k} - \sqrt{y}) \times (\sqrt{k} + \sqrt{y})$ , il est visible que

$k - y$  est toujours beaucoup plus grand que  $f a (k - y)^{\frac{m}{2}} \frac{dy}{\sqrt{y}}$ ;

supposons donc  $m =$  ou  $< 1$ , en sorte que  $m = 1 - \omega$ ,  $\omega$  étant 0

ou positif &  $< 1$ , il est aisé de voir que  $\frac{B}{\sqrt{y} (k - y)^{\frac{1}{2}}} \times f (k - y)^{\frac{m}{2}} \frac{dy}{\sqrt{y}}$

sera de l'ordre de  $\frac{1}{y^{\frac{3-m}{2}}} = \frac{1}{y^{1+\frac{\omega}{2}}}$ ,  $\omega$  étant positif ou  $= 0$ ,

donc  $\frac{y^k}{\sqrt{k - y}}$  qui est de l'ordre de  $y^{k-\frac{1}{2}}$ , doit être de l'ordre

de  $y^{-1-\frac{\omega}{2}}$ ; donc  $k = -\frac{1}{2} - \frac{\omega}{2}$ ; donc  $dx = \frac{B dy}{\sqrt{y}}$

$+ \frac{E dy}{\sqrt{y} \times y^{\frac{\omega}{2}}}$  &  $x = A \sqrt{y} + \frac{E y^{\frac{1}{2}-\frac{\omega}{2}}}{\frac{1}{2}-\frac{\omega}{2}}$ . Or cette

solution est évidemment fautive, 1°. parce que dans le cas où  $m = 0$

& par conséquent  $\omega = 1$ , le coefficient  $\frac{E}{\frac{1}{2}-\frac{\omega}{2}} = \infty$ , au lieu

qu'il doit être très petit. 2°. parce que  $\omega$  étant positif &  $< 1$ ,

le terme  $E y^{\frac{1}{2}-\frac{\omega}{2}}$  n'est pas très petit par rapport à  $A \sqrt{y}$ , lorsque  $y$  est supposé très petit; puisque le rapport de ces termes



termes est  $\frac{E}{A y^2}$ ; cependant la solution exige que le terme ajouté à  $A\sqrt{y}$  soit très petit; donc la solution seroit fautive; donc il ne faut pas chercher la valeur de  $x$  en  $y$ , mais celle de  $y$  en  $x$ .

38. Voici le dénouement de ce paradoxe. Soit d'abord  $y = Axx + Cx^k$ ; & soit  $k' = 1$ , ce qui est le cas de  $m = 0$ , & de  $\omega = 1$ ; on aura  $y = Axx + Cx$ ; donc  $xx + \frac{Cx}{A} = \frac{y}{A}$ ; donc  $x = -\frac{C}{2A} \pm \sqrt{\left(\frac{y}{A} + \frac{C^2}{4A^2}\right)}$ ;

or on ne peut réduire  $\sqrt{\left(\frac{y}{A} + \frac{C^2}{4A^2}\right)}$  à deux termes  $\frac{C}{2A} + \frac{\sqrt{y}}{A}$ , que dans le cas où  $y$  est très petit; ni à deux termes  $\frac{\sqrt{y}}{A}$

+  $\frac{C^2 \sqrt{A}}{2 \cdot 4A^2 \sqrt{(y)}}$ , que dans le cas où  $y$  est grand par rapport à  $\frac{C}{4A}$ .

Ainsi, dans aucun cas, l'équation  $y = Axx + Cx$  ne peut se réduire à cette forme  $x = B\sqrt{(y)} + Cy^{q'}$ ,  $q'$  étant une quantité positive comme il le doit être; l'équation  $y = Axx + Cx$  donne

$x = \sqrt{\left(\frac{y - Cx}{A}\right)}$ , & si on mettoit pour  $x$  sa valeur appro-

chée  $B\sqrt{(y)}$  ou  $\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{A}}$ , on auroit  $x = \sqrt{\left(\frac{y}{A} - \frac{C\sqrt{y}}{A\sqrt{A}}\right)}$ ,

& en réduisant en série  $x = \frac{\sqrt{(y)}}{\sqrt{A}} - \frac{C}{2A}$ , ce qui ne se peut,

puisque  $x$  doit être  $= 0$  quand  $y = 0$ .

39. Soit en général  $y = Axx + Cx^{k'}$ , on aura  $k' = q + 1$ ; or  $q + 1$  doit être  $= 2 \times \frac{m}{2} + 1 = m + 1$ ,  
d'où

d'où  $q = m = 1 - \omega$ ; &  $k' = q + 1 = 2 - \omega$

donc  $x = \sqrt{\left(\frac{y}{A} - \frac{Cx^{k'}}{A}\right)} = \sqrt{\left(\frac{y}{A} - \frac{Cy^{\frac{2}{k'}}}{A \cdot A^{\frac{2}{k'}}}\right)}$ , en

réduisant en série,

$$\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{A}} - \frac{Cy^{\frac{k'-1}{2}}}{2 A \cdot A^{\frac{2}{k'}}} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{A}} - \frac{C}{2 A} \frac{y^{\frac{1-\omega}{2}}}{A^{\frac{2}{k'}}$$

équation qui s'accorde avec celle qu'on a trouvée précédemment art. 37. mais qui n'en est pas plus exacte.

40. On trouvera dans la Mécanique de M. Euler Tom. II. art. 742. quelques autres réflexions sur le cas où la solution de ce problème est imparfaite, même en prenant  $y = Axx + Cx^{k'}$ , & non  $x = \sqrt{Ay + By^k}$ . M. Euler remarque avec raison que cette solution est fautive toutes les fois que  $m < 1$ . Il faut cependant observer, que la solution est bonne quand  $m = 0$ , & que l'équation  $y = Axx + Bx$  qu'on trouve pour ce cas, est la vraie équation de la courbe, même en ne supposant pas la résistance très petite.

41. Il n'est pas difficile de voir que, si la résistance est  $Au^m + Bu$ , la tautochrone aura pour équation  $y = Axx + Cxx + Qx^{m+1}$ , d'où l'on voit qu'elle sera la même, ou du moins aura la même équation que dans le cas de  $B = 0$ . Mais, quoiqu'on ait trouvé que la tautochrone, lorsque la résistance est  $F + Gu + Ku^2$ , a la même équation que quand la résistance est  $F + Ku^2$ , cependant, il n'en faut pas conclure en général que la tautochrone, dans le cas où la résistance est  $Au^m + Bu$ , soit la même que dans le cas où la résistance est  $Au^m$ ; car la quantité

$$y \xi' \frac{dx}{u} \cdot B + \frac{B dx \Phi u}{u} = \frac{dx}{u} + B du \quad \text{trou-$$



trouvée ci-dessus art. 22. doit être une différentielle complète; or, quand on aura trouvé une quantité  $B$  qui satisfait à cette équation en supposant  $\Phi u = Au^m$ ; il n'est pas clair que laissant  $\xi'$  tel qu'il est, on trouvera une valeur de  $B$  convenable en faisant  $\Phi u = Au^m + Bu$ . En effet, supposons qu'on ait trouvé  $B$  pour le cas où la résistance est  $\Phi u$ , & soit  $B + \epsilon$  la valeur de  $B$  lorsque la résistance est  $\Phi u + A'u$ , on auroit donc (en supposant que  $\xi'$  demeure le même dans les deux cas)

$$\gamma \xi' \frac{\epsilon dx}{u} + \frac{\epsilon dx \Phi u}{u} + A'B dx + \epsilon du$$

une différentielle complète; il faudra par cette condition déterminer  $\epsilon$ , & il faudra de plus que  $\xi'' + \Phi u + A'u$  soit  $= \&$  identique à  $\frac{1 + Au}{B + \epsilon'}$ .

42. Par les méthodes connues jusqu'ici, on ne peut gueres déterminer  $B$  en général dans le problème de l'art. 22. que lorsque

l'équation  $\gamma \xi' \frac{dx}{u} + \frac{dx \Phi u}{u} + du = 0$  peut être intégrée; ce-

pendant il est certain que si  $\Phi u$  est par exemple  $= F + Du^2 + Eu$ , ( $E$  n'étant pas  $= 0$ ), l'équation dont il s'agit n'est point intégrable; & néanmoins on peut trouver dans ce cas la quantité  $B$ , comme on l'a vu ci-dessus art. 23. Donc les méthodes pour trou-

ver  $B$ , qui demandent que  $\gamma \xi' \frac{dx}{u} + \frac{dx \Phi u}{u} + du = 0$ , soit

intégrable, ne sont pas générales; aussi est-il certain, comme nous pourrions le faire voir ailleurs, qu'on peut trouver  $B$  dans d'autres

cas. Soit par exemple  $\frac{d\eta}{dx} + \frac{X - \omega}{V} \times \frac{d\eta}{du} + \omega = 0$ ,  $X$  &

$V$  étant des fonctions de  $x$  & de  $u$ , &  $\omega$  tout ce qu'on voudra, on



pourra trouver aisément  $q$ , quoique l'équation  $du + \frac{(X-\omega)dx}{V} = 0$ , ne soit pas aisément intégrable; de même l'équation  $\xi' + \Phi u = 1 + \frac{\Lambda u}{B}$ , donne (en faisant  $\Lambda = \frac{dq}{dx}$ ;  $B = \frac{dq}{du}$ )  $\frac{dq}{dx} - \left( \frac{\xi' + \Phi u}{u} \right) \frac{dq}{du} + \frac{1}{u} = 0$ ; ce qui donneroit en comparant,  $\frac{X - \frac{1}{u}}{V} = - \frac{\xi - \Phi u}{u}$ ; donc  $V = nu$ , &  $\Phi u = \frac{b}{u}$ ; hypothèse qui n'est point à la vérité dans la nature, mais qui fait voir qu'on peut trouver  $B$  quoique l'équation

$$y\xi' \frac{dx}{u} + \frac{dx\Phi u}{u} + du = 0,$$

ne soit pas intégrable. Mais en voilà assez sur ce sujet, que nous ne nous proposons pas de traiter à fond quant à présent.

43. Lorsque la courbe doit être tautochrone, la formule générale ou équation qui donne la valeur de  $k$ , devient, en faisant  $\lambda = 0$ ,  $k\xi + \frac{dk}{dx} + \frac{u dk}{du} + \xi\xi + \frac{d\xi^2}{dx} = 0$ ; donc, si on fait  $p = \xi'' + \Phi u$ , on aura, à cause de  $\frac{d\xi}{du} = uk$ , l'équation  $k = \frac{\xi''}{u^2} + \frac{\Phi u}{u^2}$ ; d'où, en substituant, on aura une équation dans laquelle il n'y aura que  $\xi$  &  $\xi''$  d'inconnues; & dans laquelle il ne se trouvera plus de  $du$ , or  $\xi'' = \frac{g dy}{dx}$ , en nommant  $y$  les abscisses de la courbe répondantes aux arcs  $x$ ; par conséquent, puisqu'on a l'équation

tion

tion  $k dx = - \frac{du}{u}$ , on tirera de la première équation la valeur de  $u$  en  $x$ ,  $\zeta$  &  $\xi''$ , d'où, en substituant dans l'équation  $k dx = - \frac{du}{u}$ , ou  $(\xi'' + \Phi u) dx + u du = 0$ , on aura une équation en  $\xi''$ ,  $\zeta$  &  $x$ ; il faut de plus que  $\zeta$  soit tel que

$$\frac{\delta u}{u} = \frac{d\delta x}{dx} = \zeta e^{\int \xi dx} \delta \omega = \zeta \delta x;$$

d'où l'on voit que  $u$  doit être une telle fonction de  $x$ ,  $\xi''$  &  $\zeta$ , qu'en la différentiant & effaçant  $\delta x$ , elle soit  $= u \zeta$ ; ce qui servira à faire évanouir  $\zeta$ : ainsi il ne restera plus qu'une équation entre  $\xi''$  &  $x$ ,

d'où l'on tirera  $\xi''$  ou  $\frac{dy}{dx}$ . On voit donc qu'il n'est pas nécessaire que

l'équation  $k \zeta + \frac{dk}{dx} + \frac{u dk}{du} + \zeta \zeta + \frac{d\zeta}{dx} = 0$  soit identique, comme la solution le suppose.

44. Cette réflexion peut servir à résoudre l'objection suivante; en mettant dans l'équation  $k \zeta + \frac{dk}{dx}$  &c.  $= 0$ ,  $- \frac{du}{u dx}$  à la place de  $k$ , & faisant  $dk = A dx + B du$ , on auroit  $- \zeta \frac{du}{u} + A dx + \zeta u B dx + \zeta \zeta dx + d\zeta = 0$ , d'où  $A dx = + \zeta \frac{du}{u} - \zeta u B dx - \zeta \zeta dx - d\zeta = 0$ ; donc, puisque  $A dx + B du$  est une différentielle complète, il s'ensuit que  $\zeta \frac{du}{u}$



—  $\zeta u B dx - \zeta \zeta dx - d\zeta + B du$  est une différentielle complète; donc aussi  $\zeta \frac{du}{u} - \zeta u B dx + B du$  doit être une différentielle complète; donc  $B e^{\int \zeta dx} d(u e^{-\int \zeta dx}) + \zeta \frac{du}{u}$  doit être une différentielle complète; donc, en faisant  $u e^{-\int \zeta dx} = t$ , ce qui donne  $u = t e^{\int \zeta dx}$ , on aura  $B e^{\int \zeta dx} dt + \zeta \frac{dt}{t} + \zeta \zeta dx$  une différentielle complète; donc  $B e^{\int \zeta dx} dt + \zeta \frac{dt}{t}$  doit être une différentielle complète; donc cette différentielle doit avoir pour intégrale  $\Phi t$ ; donc l'intégrale  $\int A dx + B du$  est  $\Phi t + \int \zeta \zeta dx - \int (\zeta \zeta dx + d\zeta) = \Phi t - \int \zeta = \Phi t - \zeta$ ; donc  $k = \Phi(u e^{-\int \zeta dx}) - \zeta$ , & par conséquent  $p = u u k = u u \Phi(u e^{-\int \zeta dx}) - u u \zeta$ ; ce qui diffère de la valeur  $u u \Phi \frac{(u e^{-\int \zeta dx})}{e^{\int \zeta dx}} = u u \zeta$  trouvée par la solution générale de l'article 6.


45. La réponse à cette difficulté est que, quoique  $A dx + B du$  doit être une différentielle complète, cependant si on a la quantité  $\zeta \frac{du}{u} - \zeta u B dx$  &c.  $= A dx$ , cette quantité ou valeur de  $A dx$  étant ajoutée à  $B du$ , ne doit pas donner pour cela une différentielle complète; parce que la quantité  $\zeta \frac{du}{u} - \zeta u B dx$  &c. n'est pas *identique* à  $A dx$ , quoiqu'elle lui soit égale. Pour qu'on puisse substituer une valeur à  $A dx$  dans la différentielle complète  $A dx + B du$ , il



il faut que  $A$  soit égal (comme dans l'art. 22.) à une fonction de  $x$  & de  $u$  qui ne renferme point la différentielle  $du$ , comme il arrive ici.

46. Voilà les réflexions que m'a fait naître la formule dont M. de la Grange a bien voulu me faire part. Je ne doute point qu'on ne puisse pousser beaucoup plus loin cette théorie des tautochrones; mais je me contente d'avoir mis sur la voie ceux qui croiront ma méthode assez simple & assez générale pour pouvoir en faire usage, soit dans la solution complète de ce problème, soit dans plusieurs autres recherches.

à Paris, ce 24 Avril 1767.







# RECHERCHES DES FORCES

## DONT LES CORPS CÉLESTES SONT SOLLICITÉS ENTANT QU'ILS NE SONT PAS SPHÉRIQUES.

PAR M. J. A. EULER.

---

**L**orsqu'on détermine le mouvement progressif des corps célestes, on les regarde comme sphériques; & on suppose qu'ils éprouvent de la gravité universelle les mêmes forces, que si toute leur masse étoit réunie dans leur centre d'inertie.

Mais, si un corps qui n'est pas sphérique, est attiré vers un autre corps, ni la moyenne direction ne passe plus par son centre d'inertie, ni la force moyenne ne se trouve plus exactement en raison réciproque du carré de la distance, quoique les forces dont chaque particule est sollicitée suivent cette loi.

Si la figure des corps célestes différoit énormément de la sphérique, & qu'ils ne fussent pas extrêmement éloignés entr'eux, l'aberration des forces sollicitantes de cette loi pourroit devenir très considérable; mais, puisque les corps célestes sont pour la plus-part assez exactement sphériques, on se dispense d'avoir égard à cette aberration, surtout lorsque les recherches ne roulent que sur le mouvement progressif.

Mais, lorsqu'il s'agit de déterminer le mouvement de rotation de quelque planète, il est très essentiel de tenir compte de cette aberration; car, quelque petite qu'elle soit par rapport au mouvement progressif, son effet peut devenir très considérable à l'égard du mouvement de rotation.

C'est



C'est de là que tire son origine la précession des équinoxes & la nutation de l'axe de la terre, comme M. d'Alembert l'a prouvé incontestablement; quoique l'aberration de la figure sphérique soit à peine sensible dans la Terre.

Car, quelque petite qu'elle soit, la force dont la terre est poussée tant vers la lune que vers le soleil, en souffre toutefois une altération, d'où résulte un *moment* par rapport à l'axe de la terre, lequel agissant sans relâche produit avec le tems les phénomènes de la précession des équinoxes & de la nutation de l'axe de la terre.

On n'a qu'à jeter les yeux sur l'excellent ouvrage de M. d'Alembert pour voir combien de calculs pénibles & embarrassans cette recherche demande. Il falloit introduire la véritable figure de la terre, qu'il a supposée elliptique; & puisqu'il n'est pas probable qu'elle soit formée d'une matière homogène, il l'a considérée comme composée d'une infinité de couches elliptiques, dont chacune ait une densité particulière.

Ensuite il a examiné les forces dont chaque élément est sollicité, ou vers le centre de la lune, ou vers celui du soleil, pour en conclure les forces totales & leurs *momens* à l'égard de l'axe de rotation. Or on comprend aisément, que la nature de cette infinité de couches elliptiques, & l'obliquité des forces qui y agissent, doivent rendre le calcul extrêmement embarrassé; & qu'il le deviendrait encore beaucoup plus, si au lieu de la figure elliptique on étoit obligé d'y introduire d'autres figures plus compliquées.

On voit donc qu'on est encore fort éloigné du problème général, qu'on pourroit énoncer en ces termes.

*La figure d'un corps & l'arrangement de la matière dont il est composé étant quelconques; si toutes les particules de ce corps sont poussées vers un point par des forces qui suivent une loi quelconque des distances; trouver la force totale dont le corps sera sollicité?*

Cepen-



Cependant, quoique ce problème paroisse surpasser bien loin les forces du calcul, la découverte des trois axes principaux dont chaque corps est nécessairement doué me fournira même une méthode fort aisée de le résoudre.

I. De quelque manière qu'un corps céleste soit formé, je suppose qu'on sache premièrement tant sa masse entière que son centre d'inertie. Ensuite, je regarde aussi comme connus les trois axes principaux du corps, de même que les momens d'inertie à leur égard.

II. La méthode de déterminer ces deux derniers élémens pour chaque corps se trouve expliquée dans les différens Mémoires où mon pere a traité du mouvement de rotation des corps autour d'un axe variable & entr'autres dans sa nouvelle Mécanique Chap. V. Or, quand même cette recherche auroit quelque difficulté, si on la vouloit appliquer aux corps célestes, cela ne regarde pas la force sollicitante qu'on se propose de rechercher ici : & d'ailleurs, dès qu'on veut connoître le mouvement d'un tel corps, ces élémens doivent absolument être connus.

III. Outre cela, au lieu d'attribuer au corps une certaine figure elliptique, composée de couches elliptiques d'une densité différente, on lui peut supposer d'abord une certaine inégalité dans les momens d'inertie par rapport à ses trois axes principaux; ce qui s'étend infiniment plus loin & renferme toutes les figures possibles. La figure des corps peut varier à l'infini, mais cette différence n'entre ici en considération que par rapport à l'inégalité entre les trois momens principaux.

Planche IX.

Fig. 1.

IV. Cependant, si le corps est un sphéroïde elliptique formé par la révolution d'une ellipse  $AIB$  autour d'un de ses axes  $IA$ , & qu'il soit composé des couches elliptiques quelconques concentriques  $PIQ$ , dont chacune ait sa densité particulière, il est aisé d'en déterminer ses momens principaux. Car soient les demi-axes du corps entier  $IA = A$ ;  $IB = B$ , & la densité par toute la surface



surface  $\equiv D$ . Ensuite, pour une couche quelconque engendrée par la révolution de l'ellipse PIQ autour de l'axe commun IP, soient les demi-axes IP  $\equiv p$ ; IQ  $\equiv q$  & la densité dans la surface  $\equiv r$ , de sorte que  $p$  &  $q$  puissent être regardés comme des fonctions quelconques de la variable  $r$ . Quand cette couche devient la dernière, on aura  $p \equiv A$ ,  $q \equiv B$  &  $r \equiv D$ , & avant que d'y arriver ces quantités  $p$ ,  $q$ ,  $r$ , seront nos variables. Il est évident que ce cas s'étend plus loin qu'on ne l'a traité jusqu'ici. Le sphéroïde elliptique étant déterminé en général, il est d'abord clair que son centre d'inertie se trouve dans le centre de la figure I; & posant le rapport du diamètre à la circonférence comme 1 à  $\pi$ , la masse de ce corps que je nomme M sera  $\frac{4}{3} \pi A B D - \frac{4}{3} \pi \int p q q dr$ , en prenant cette intégrale par toute l'étendue du corps. Ensuite l'axe de révolution IA sera un des axes principaux, & les deux autres tombent dans la section moyenne, perpendiculaire à l'axe IA, & auront leurs momens d'inertie égaux entr'eux. Si nous posons le moment d'inertie par rapport à l'axe IA  $\equiv M a a$  & le moment d'inertie par rapport aux deux autres axes  $\equiv M b b$ , on trouvera

$$M a a \equiv \frac{8}{15} \pi A B^3 D - \frac{8}{15} \pi \int p q^3 dr$$

$$M b b \equiv \frac{4}{15} \pi A B B (A A + B B) D - \frac{4}{15} \pi \int p q q (p p + q q) dr.$$

V. Faisons quelques applications de ces formules générales; & d'abord, si la densité est la même D par toute l'étendue du corps, on aura  $r \equiv D$  &  $dr \equiv 0$ ; dont la Masse

$$M \equiv \frac{4}{3} \pi A B B D, \quad \text{\& les momens d'inertie}$$

$$M a a \equiv \frac{8}{15} \pi A B^3 D;$$

$$M b b \equiv \frac{4}{15} \pi A B B (A A + B B) D; \quad \text{par conséquent}$$

$$a a \equiv \frac{2}{3} B B \quad \text{\&} \quad b b \equiv \frac{1}{3} (A A + B B).$$

VI. Or, si l'inégalité des couches fuit une loi quelconque des puissances, de sorte que  $p = \frac{A r^m}{D^m}$  &  $q = \frac{B r^n}{D^n}$ , en faisant les substitutions, on obtiendra

$$M = \frac{4}{3} \pi A B B D - \frac{4}{3} \pi \frac{A B B D}{m+2n+1} = \frac{4}{3} \pi \times \frac{m+2n}{m+2n+1} A B B D$$

$$M a a = \frac{8}{15} \pi A B^4 D - \frac{8}{15} \pi \frac{A B^4 D}{m+4n+1} = \frac{8}{15} \pi \times \frac{m+4n}{m+4n+1} A B^4 D$$

$$M b b = \frac{4}{15} \pi A B B (A A + B B) D - \frac{4}{15} \pi A B B \left( \frac{A A}{3m+2n+1} + \frac{B B}{m+4n+1} \right) D$$

ou

$$M b b = \frac{4}{15} \pi A B B D \left( \frac{3m+2n}{3m+2n+1} A A + \frac{m+4n}{m+4n+1} B B \right)$$

& par conséquent

$$a a = \frac{2}{3} \times \frac{(m+4n)(m+2n+1)}{(m+2n)(m+4n+1)} B B$$

&

$$b b = \frac{1}{3} \times \frac{m+2n+1}{m+2n} \left( \frac{3m+2n}{3m+2n+1} A A + \frac{m+4n}{m+4n+1} B B \right).$$

VII. Je remarque ici en passant, que si le corps est un sphéroïde aplati & homogène par toute son étendue, de sorte que  $A < B$ , il y aura  $a a - b b = \frac{1}{3} (B B - A A)$ , & partant  $a a > b b$ .

.Mais



Mais, si le corps n'est pas homogène, & qu'on pose pour ses couches

$$p = \frac{A r^m}{D^m} \quad \& \quad q = \frac{B r^n}{D^n}; \quad \text{on aura}$$

$$aa - bb = \frac{1}{3} \times \frac{m+2n+1}{m+2n} \left( \frac{m+4n}{m+4n+1} BB - \frac{3m+2n}{3m+2n+1} AA \right);$$

d'où il ne suit pas que  $aa > bb$ , quoiqu'il soit  $BB > AA$ . On voit qu'il pourroit même arriver qu'il fût  $aa = bb$  ou  $aa < bb$ . Mais, si toutes les couches sont semblables entr'elles, ou  $m = n$ , on

$$\text{aura} \quad aa - bb = \frac{1}{3} \times \frac{3n+1}{5n+1} (BB - AA). \quad \text{On}$$

comprend de là que, quoiqu'on connoisse parfaitement la figure du corps. on n'en sauroit rien conclure pour l'égalité ou l'inégalité de ses momens principaux.

Je me tiendrai donc uniquement aux momens principaux, sans avoir égard à la figure du corps.

VIII. Après ces remarques je retourne à notre problème général. Soit donc proposé un corps quelconque dont la masse soit  $= M$ , son centre d'inertie en  $I$ , & que ses axes principaux soient  $IA, IB, IC$  & par rapport à eux les momens d'inertie  $Maa, Mbb, Mcc$ , que je suppose donnés. Qu'on considère un élément quelconque du corps en  $Z$ , dont la masse soit  $dM$ ; & ayant tiré les lignes  $ZY$  perpendiculaire au plan  $ΔIB$

Fig. 2.

&  $YZ$  perpendiculaire à l'axe  $IA$ ,

pour avoir les trois coordonnées orthogonales

$$IX = x; \quad XY = y; \quad \& \quad YZ = z$$

parallèles aux trois axes principaux.

IX. Maintenant, puisque  $I$  est le centre d'inertie, on aura

$$\int x dM = 0; \quad \int y dM = 0; \quad \int z dM = 0$$

Ggg 2

&



& la propriété des axes principaux donne

$$\int x y dM = 0; \quad \int x z dM = 0; \quad \int y z dM = 0.$$

Or, à cause des momens d'inertie donnés, nous avons les trois équations suivantes

$$Maa = \int (yy + zz) dM; \quad Mbb = \int (xx + zz) dM; \quad Mcc = \int (xx + yy) dM$$

d'où nous concluons les valeurs des intégrales

$$\begin{aligned} \int x x dM &= \frac{1}{2} M (bb + cc - aa) \\ \int y y dM &= \frac{1}{2} M (aa + cc - bb) \\ \int z z dM &= \frac{1}{2} M (aa + bb - cc). \end{aligned}$$

X. Soit R un point vers lequel tous les élémens du corps sont poussés en raison réciproque du carré des distances, dont la position soit déterminée par les coordonnées  $IP = p$ ;  $PQ = q$ ;  $QR = r$ ; & sa distance au centre d'inertie  $IR = s$ .

XI. Pour la grandeur absolue de cette force, on la connoitra en posant la distance au point R, à laquelle un élément de matière est autant poussé vers R qu'il seroit poussé en bas sur la terre  $= e$ . Et alors, si l'élément  $dM$  étoit éloigné du point R du même intervalle  $e$ , il y seroit poussé par la force  $dM$ , puisqu'on se sert de la même mesure pour les masses & les poids. Mais, puisque  $ZR$  est la véritable distance de l'élément  $dM$  au point R, la force dont il y est poussé sera  $\frac{e e dM}{Z R^2}$ .

XII. Si nous voulions que la loi d'attraction suivit une puissance quelconque de la distance  $ZR$ , cette force seroit  $\frac{Z R^n}{e^n} dM$ , en supposant l'attraction proportionnelle à la puissance des distances dont l'exposant  $= n$ , de sorte qu'on auroit pour le cas dont il s'agit ici  $n = -2$ .

XIII.





XIII. Quant à la distance  $ZR$ , elle est exprimée en sorte

$$ZR = \sqrt{(p-x)^2 + (q-y)^2 + (r-z)^2}$$

ou, puisque  $pp + qq + rr = IR^2 = ss$ ,

$$ZR = \sqrt{ss - 2qx - 2qy - 2rz + xx + yy + zz}.$$

XIV. La force  $\frac{ZR^n}{e^n} dM$  passant par le point  $R$  selon

la direction  $ZR$ , pour en trouver la force totale, le moyen le plus propre sera de la décomposer au point  $R$  suivant les directions fixes  $Rp$ ,  $Rq$  &  $Rr$ , parallèles aux axes principaux  $IA$ ,  $IB$  &  $IC$ , d'où l'on tirera les forces élémentaires

$$\text{suivant } Rp = \frac{ZR^{n-1} (p-x) dM}{e^n}$$

$$\text{suivant } Rq = \frac{ZR^{n-1} (q-y) dM}{e^n}$$

$$\text{suivant } Rr = \frac{ZR^{n-1} (r-z) dM}{e^n}$$

dont il s'agit de chercher les intégrales pour toute l'étendue du corps proposé.

XV. Dans l'application de ce problème aux corps célestes, on peut regarder la distance  $IR = s$  comme très grande à l'égard de l'étendue du corps proposé, & partant réciproquement les variables  $x, y, z$ , comme très petites à l'égard de la distance  $s$ . Or ceci nous fournit la grande commodité d'exprimer la valeur de  $ZR^{n-1}$  par une série dont il sera permis de négliger les termes où les quantités  $x, y, z$ , ont plus de deux dimensions.



XVI. De là nous obtiendrons

$$\begin{aligned} ZR^{n-1} &= s^{n-1} - (n-1)s^{n-3}(px + qy + rz) \\ &+ \frac{1}{2}(n-1)s^{n-3}(xx + yy + zz) \\ &+ \frac{1}{2}(n-1)(n-3)s^{n-5}(px + qy + rz)^2, \end{aligned}$$

& en arrangeant ces termes

$$\begin{aligned} ZR^{n-1} &= s^{n-1} - (n-1)s^{n-3}(px + qy + rz) \\ &+ \frac{1}{2}(n-1)s^{n-3}(xx + yy + zz) \\ &+ \frac{1}{2}(n-1)(n-3)s^{n-5}(ppxx + qqyy + rrrz) \\ &+ (n-1)(n-3)s^{n-5}(pqxy + prxz + qryz). \end{aligned}$$

XVII. Multiplions cette formule successivement par  $p - x$ ,  $q - y$ , &  $r - z$ , & négligeant toujours les termes, où les variables  $x, y, z$  montent à plus de deux dimensions; nous aurons

$$\begin{aligned} ZR^{n-1}(p-x) &= s^{n-1}p - s^{n-3}(npp + qq + rr)x \\ &- (n-1)s^{n-3}p(qy + rz) + (n-1)s^{n-3}(qxy + rxz) \\ &+ \frac{1}{2}(n-1)s^{n-3}(3pxx + pyy + pzz) \\ &+ \frac{1}{2}(n-1)(n-3)s^{n-5}p(ppxx + qqyy + rrrz) \\ &+ (n-1)(n-3)s^{n-5}p(pqxy + prxz + qryz), \end{aligned}$$

d'où l'on tire aisément les deux autres formes  $ZR^{n-1}(q - x)$  &  $ZR^{n-1}(r - x)$ .

XVIII. Comme donc  $\int x dM = 0$ ;  $\int y dM = 0$ ;  $\int z dM = 0$ , & de plus  $\int xy dM = 0$ ;  $\int xz dM = 0$ ;  $\int yz dM = 0$ ; l'intégrale  $\int ZR^{n-1}(p - x) dM$  s'exprimera très simplement de cette façon

$$\begin{aligned} \int ZR^{n-1}(p-x) dM &= Ms^{n-1} + \frac{1}{2}(n-1)s^{n-3}p \int dM(3xx + yy + zz) \\ &+ \frac{1}{2}(n-1)(n-3)s^{n-5}p \int dM(ppxx + qqyy + rrrz). \end{aligned}$$

Et



Et en y introduisant les momens d'inertie principaux

$$\int ZR^{n-1}(p-x)dM = Ms^{n-1}p + \frac{1}{4}(n-1)Ms^{n-3}p(3bb+3cc-aa) \\ + \frac{1}{4}(n-1)(n-3)Ms^{n-5}p(aa(ss-2pp)+bb(ss-2qq)+cc(ss-2rr))$$

ou bien

$$\int ZR^{n-1}(p-x)dM = Ms^{n-1}p + \frac{1}{4}(n-1)Ms^{n-3}p(n(bb+cc)+(n-4)aa) \\ - \frac{1}{2}(n-1)(n-3)Ms^{n-5}p(aapp+bbqq+ccrr);$$

& de la même manière

$$\int ZR^{n-1}(q-y)dM = Ms^{n-1}q + \frac{1}{4}(n-1)Ms^{n-3}q(n(aa+cc)+(n-4)bb) \\ - \frac{1}{2}(n-1)(n-3)Ms^{n-5}q(aapp+bbqq+ccrr);$$

$$\int ZR^{n-1}(r-z)dM = Ms^{n-1}r + \frac{1}{4}(n-1)Ms^{n-3}r(n(aa+bb)+(n-4)cc) \\ - \frac{1}{2}(n-1)(n-3)Ms^{n-5}r(aapp+bbqq+ccrr).$$

XIX. Maintenant on n'a qu'à diviser ces trois expressions par  $e^n$  pour avoir les trois forces totales  $R_p$ ,  $R_q$ , &  $R_r$ , dont le corps sera sollicité. Or il est évident que ces trois forces se réduisent premièrement à une force qui agit suivant la direction IR & qui est

$$\frac{M_s^n}{e^n} \left( 1 + \frac{1}{4}n(n-1) \cdot \frac{aa+bb+cc}{ss} - \frac{1}{2}(n-1)(n-3) \cdot \frac{aapp+bbqq+ccrr}{s^4} \right);$$

& outre cela à trois petites forces, qui sont

$$\text{suivant } R_p = - \frac{(n-1)Ms^{n-3}aap}{e^n};$$

$$\text{suivant } R_q = - \frac{(n-1)Ms^{n-3}bbq}{e^n};$$

$$\text{suivant } R_r = - \frac{(n-1)Ms^{n-3}ccr}{e^n}.$$



XX. On peut encore représenter ces forces par une infinité d'autres manières différentes, parmi lesquelles la suivante est surtout remarquable.

Les forces dont le corps est sollicité du point R se réduisent premièrement à une force selon la direction IR, qui est

$$\frac{Ms^n}{e^n} \left( 1 + \frac{1}{12} (n-1)(3n-4) \cdot \frac{aa+bb+cc}{ss} - \frac{1}{2} (n-1)(n-3) \frac{aapp+bbqq+ccrr}{s^4} \right),$$

& à ces trois petites forces appliquées au point R,

$$\text{suivant } Rp = \frac{(n-1) Ms^{n-3} p (bb+cc-2aa)}{3e^n},$$

$$\text{suivant } Rq = \frac{(n-1) Ms^{n-3} q (aa+cc-2bb)}{3e^n},$$

$$\text{suivant } Rr = \frac{(n-1) Ms^{n-3} r (aa+bb+2cc)}{3e^n}.$$

XXI. On voit donc que ces trois petites forces évanouissent au cas que les trois momens principaux du corps soient égaux entr'eux, & alors la force selon M devient,

$$\frac{Ms^n}{e^n} \left( 1 + \frac{(n-1)(n+2)}{4} \cdot \frac{aa}{ss} \right)$$

laquelle ne convient avec celle que le corps éprouveroit, si toute sa masse étoit réunie au point I, que lorsque ou  $n = 1$ , ou  $n = -2$ .

XXII. Au lieu des lignes  $p, q, r$ , introduisons plutôt les angles que la direction IR fait avec les trois axes principaux du corps: posons pour cet effet ces angles

$$AIR = \zeta; \quad BIR = \eta; \quad CIR = \theta,$$

&c



& puisqu'on aura  $p = s \cos \zeta$ ;  $q = s \cos \eta$ ;  $r = s \cos \theta$ , de sorte que  $\cos^2 \zeta + \cos^2 \eta + \cos^2 \theta = 1$ , les forces dont le corps est sollicité au centre de forces R seront premièrement la force selon IR, qui est

$$\frac{Ms^n}{e^n} \left( 1 + \frac{1}{4}n(n-1) \cdot \frac{aa+bb+cc}{ss} - \frac{1}{2}(n-1)(n-3) \cdot \frac{aa \cos^2 \zeta + bb \cos^2 \eta + cc \cos^2 \theta}{ss} \right);$$

& ensuite les trois petites forces

$$\text{suivant } Rp = - \frac{(n-1) Ms^{n-2} aa \cos \zeta}{e^n};$$

$$\text{suivant } Rq = - \frac{(n-1) Ms^{n-2} bb \cos \eta}{e^n};$$

$$\text{suivant } Rr = - \frac{(n-1) Ms^{n-2} cc \cos \theta}{e^n}.$$

XXIII. Ou bien, si nous aimons mieux nous servir de l'autre représentation, les forces sollicitantes se réduisent premièrement à la force principale selon la direction IR,

$$\frac{Ms^n}{e^n} \left( 1 + \frac{1}{12}n(n-1)(3n-4) \cdot \frac{aa+bb+cc}{ss} - \frac{1}{2}(n-1)(n-3) \cdot \frac{aa \cos^2 \zeta + bb \cos^2 \eta + cc \cos^2 \theta}{ss} \right),$$

& aux trois petites forces

$$\text{suivant } Rp = \frac{(n-1) Ms^{n-2} (bb + cc - 2aa) \cos \zeta}{3e^n},$$

$$\text{suivant } Rq = \frac{(n-1) Ms^{n-2} (aa + cc - 2bb) \cos \eta}{3e^n},$$

$$\text{suivant } Rr = \frac{(n-1) Ms^{n-2} (aa + bb - 2cc) \cos \theta}{3e^n}.$$

Cette dernière représentation est plus propre que la précédente, quand les trois momens principaux sont presque égaux entr'eux,



comme cela arrive à peu près dans la terre & les autres corps célestes, auxquels on voudroit faire l'application.

XXIV. Posons maintenant, comme il arrive en effet dans le système du monde, que les corps soient attirés vers le point R en raison réciproque du quarré des distances, ou bien soit  $n = -2$ , & la première représentation nous donnera ces forces

premierement la force suivant la direction IR

$$\frac{Mee}{ss} \left( 1 + \frac{3}{2} \cdot \frac{aa+bb+cc}{ss} - \frac{1}{2} \cdot \frac{aa \cos^2 \zeta + bb \cos^2 \eta + cc \cos^2 \theta}{ss} \right),$$

& ensuite les trois petites forces

$$\text{suivant } Rp = \frac{3Mee aa \cos \zeta}{s^4},$$

$$\text{suivant } Rq = \frac{3Mee bb \cos \eta}{s^4},$$

$$\text{suivant } Rr = \frac{3Mee cc \cos \theta}{s^4}.$$

XXV. L'autre représentation donnera la force principale suivant

$$IR = \frac{Mee}{ss} \left( 1 + \frac{3}{2} \cdot \frac{aa+bb+cc}{ss} - \frac{1}{2} \cdot \frac{aa \cos^2 \zeta + bb \cos^2 \eta + cc \cos^2 \theta}{ss} \right),$$

avec ces trois petites forces

$$\text{suivant } Rp = \frac{Mee}{s^4} (2aa - bb - cc) \cos \zeta,$$

$$\text{suivant } Rq = \frac{Mee}{s^4} (2bb - aa - cc) \cos \eta,$$

$$\text{suivant } Rr = \frac{Mee}{s^4} (2cc - aa - bb) \cos \theta,$$

XXVI.



XXVI. J'ai supposé dans la détermination présente que les quantités  $aa$ ,  $bb$ ,  $cc$ , qui dépendent de l'étendue du corps, sont très petites par rapport à la distance  $IR = s$ , ou plutôt à son carré  $ss$ ; & c'est par cette raison qu'il m'a été permis de négliger les termes, où de plus hautes puissances de  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , seroient divisées par les semblables puissances de la distance  $s$ .

XXVII. En effet, si le corps proposé, étoit la terre & le point R le centre de la lune, ce qui est le cas le moins favorable à cette approximation, les fractions  $\frac{a}{s}$ ,  $\frac{b}{s}$ ,  $\frac{c}{s}$  seroient moindres que  $\frac{1}{80}$  & partant leurs carrés moindres que  $\frac{1}{6400}$ , d'où il est clair que les plus hautes puissances peuvent être regardées comme évanouissantes.

Outre cela, il faut encore considérer que les petites quantités, qui se trouvent dans nos formules dépendent de l'inégalité entre les quantités  $aa$ ,  $bb$ ,  $cc$ , de sorte que, si elles étoient égales entr'elles, les aberrations évanouiroient entièrement.

XXVIII. Après avoir déterminé les forces dont un corps proposé quelconque est sollicité vers un centre d'attraction R; leur effet se réduit à deux questions, dont l'une roule sur le mouvement progressif du corps, & l'autre sur son mouvement de rotation.

XXIX. Quand il s'agit seulement du mouvement progressif, on conçoit toutes ces forces comme compliquées au centre d'inertie I, & toute la masse du corps comme réunie au même point, de sorte que la question revient à déterminer le mouvement du point I, auquel est réunie la masse M, qui soit sollicitée par les forces suivantes,

premierement vers le point d'attraction R, ou dans la direction IR, par la force

$$\frac{Mcc}{ss} \left( 1 + \frac{5aa}{2ss} (1 - 3 \cos^2 \zeta^2) + \frac{5bb}{2ss} (1 - 3 \cos^2 \eta^2) + \frac{5cc}{2ss} (1 - 3 \cos^2 \theta^2) \right),$$





& ensuite par les trois petites forces

$$\text{suivant IA} = \frac{Mee}{s^4} (2aa - bb - cc) \cos \zeta,$$

$$\text{suivant IB} = \frac{Mee}{s^4} (2bb - aa - cc) \cos \eta,$$

$$\text{suivant IC} = \frac{Mee}{s^4} (2cc - aa - bb) \cos \theta,$$

XXX. Faisons quelques réflexions sur ces forces qui déterminent le mouvement progressif du corps, & remarquons d'abord, que s'il étoit permis de négliger les fractions  $\frac{aa}{ss}$ ,  $\frac{bb}{ss}$ ,  $\frac{cc}{ss}$ , on n'au-

roit qu'une seule force selon la direction IR, qui seroit  $= \frac{Mee}{ss}$ .

Ou bien le corps seroit sollicité vers le point R, précisément dans la raison réciproque du carré de sa distance à ce point, de même que si toute sa masse étoit effectivement réunie au centre d'inertie I. C'est aussi cette seule force qu'on considère dans la Théorie de l'Astronomie, quand on veut déterminer le mouvement progressif des corps célestes; & on ne s'est pas encore avisé de rechercher les petites inégalités qui pourroient résulter des petites aberrations des forces sollicitantes que nous venons de trouver.

XXXI. Mais, quoique les fractions  $\frac{aa}{ss}$ ,  $\frac{bb}{ss}$ ,  $\frac{cc}{ss}$ , ne soient pas évanouissantes, il y a encore un autre cas, où toutes les forces se réduisent à la seule force  $\frac{Mee}{ss}$  & qui a lieu lorsque  $aa = bb = cc$ ; ou bien lorsque le corps a une telle figure, que tous ses momens d'inertie soient égaux entr'eux.

XXXII. Donc, puisque la terre & la plupart des autres corps célestes que nous connoissons, ont cette propriété, que leurs  
momens



momens d'inertie font à peu près égaux entr'eux, on est d'autant plus autorisé de ne considérer que la seule force  $\frac{Mee}{ss}$ , & de négliger les petites aberrations que nos formules renferment.

XXXIII. Car, posant

$aa = (1 - \alpha)kk$ ;  $bb = (1 + \epsilon)kk$ ;  $cc = (1 + \gamma)kk$ ;  
de sorte que  $\alpha$ ,  $\epsilon$ ,  $\gamma$ , soient des fractions extrêmement petites, outre que  $\frac{kk}{ss}$  soit déjà très petit, les forces trouvées seront exprimées en sorte

Premierement, la force dans la direction IR fera

$$\frac{Mee}{ss} + \frac{5Mee kk}{2s^4} (\alpha(1-3\cos^2\zeta) + \epsilon(1-3\cos^2\eta) + \gamma(1-3\cos^2\theta)),$$

& ensuite les trois autres forces

$$\text{suivant IA} = \frac{Mee kk}{s^4} (2\alpha - \epsilon - \gamma) \cos\zeta,$$

$$\text{suivant IB} = \frac{Mee kk}{s^4} (2\epsilon - \alpha - \gamma) \cos\eta,$$

$$\text{suivant IC} = \frac{Mee kk}{s^4} (2\gamma - \alpha - \epsilon) \cos\theta,$$

XXXIV. Il est bon de prendre ici  $kk$  en sorte qu'il devienne  $\alpha + \epsilon + \gamma = 0$ ; ou bien  $kk = \frac{1}{3}(aa + bb + cc)$ , donc

$$\alpha = \frac{2aa - bb - cc}{aa + bb + cc}; \quad \epsilon = \frac{2bb - aa - cc}{aa + bb + cc}; \quad \gamma = \frac{2cc - aa - bb}{aa + bb + cc};$$

car  $\alpha$ ,  $\epsilon$ ,  $\gamma$  deviennent de cette façon les plus petites qu'il soit possible, eu égard à l'inégalité qui regne entre les momens d'inertie principaux du corps  $Maa$ ,  $Mbb$ ,  $Mcc$ .



XXXV. Cela posé, les forces qui agissent sur le corps proposé seront; premièrement, la force principale suivant la direction

$$IR = \frac{Mee}{ss} - \frac{15 Mee k k}{2 s^4} (\alpha \cos^2 \zeta + \epsilon \cos^2 \eta + \gamma \cos^2 \theta),$$

& ensuite les trois petites forces

$$\text{suivant } IA = \frac{3 Mee k k}{s^4} \alpha \cos \zeta;$$

$$\text{suivant } IB = \frac{3 Mee k k}{s^4} \epsilon \cos \eta;$$

$$\text{suivant } IC = \frac{3 Mee k k}{s^4} \gamma \cos \theta;$$

XXXVI. Donc, s'il y avoit des cas, où tant les nombres  $\alpha, \epsilon, \gamma$  que  $\frac{k k}{ss}$  seroient encore assez considérables, pour qu'on ne les pût négliger; alors, en ne considérant que la force principale, qui agit selon la direction IR, elle ne seroit plus exactement proportionnelle au carré renversé de la distance, mais elle renfermeroit encore une particule réciproquement proportionnelle au carré-quarré de la distance. Encore dépendroit-elle outre cela de la situation des axes principaux du corps par rapport à la ligne IR, de sorte qu'à cause du mouvement de rotation, il pourroit arriver que cette particule devint tantôt plus grande tantôt plus petite; tantôt positive, tantôt négative. Une semblable circonstance auroit aussi lieu dans les trois autres forces suivant les directions IA, IB, IC: par cette raison, on pourroit assurer hardiment, qu'on ne sauroit jamais déterminer le mouvement d'un tel corps, à moins que l'Analyse ne soit portée à un beaucoup plus haut degré de perfection. Mais peut-être qu'un tel cas n'existe pas dans le monde.

XXXVII. Quoique ces aberrations soient en effet si petites, qu'on les puisse tout à fait négliger dans la détermination du mouvement progressif; il n'en est pas de même dans la détermination du mou-



mouvement de rotation. Car ici il ne s'agit pas tant des forces mêmes, que de leurs momens par rapport aux axes principaux; & puisque les forces  $Rp$ ,  $Rq$ ,  $Rr$ , sont appliquées fort loin, & qu'elles agissent par des leviers fort longs, elles en acquièrent un accroissement très considérable. Outre cela, une force quelque petite qu'elle soit, si elle agit sur le mouvement de rotation d'un corps, peut y produire avec le tems un effet très considérable. En effet la précession des équinoxes & la nutation de l'axe de la terre, qui est causée par les forces de la lune & du soleil, est un phénomène assez sensible, quoique les mêmes inégalités qui se trouvent dans les forces dont la terre est sollicitée vers la lune & le soleil, ne produisent aucun effet sensible dans le mouvement progressif ou annuel.

XXXVIII. Or, pour déterminer le mouvement de rotation, il faut chercher les momens des forces sollicitantes par rapport aux trois axes principaux du corps.

Ici il est d'abord clair que la première force  $IR$ , dont la direction passe par le centre d'inertie du corps  $I$ , ne produit aucun moment; ces momens ne résultent donc que des petites forces suivant les directions  $Rp$ ,  $Rq$ ,  $Rr$ , parallèles aux axes principaux.

XXXIX. De là naît un moment par rapport à l'axe  $IA$  dans le sens  $BC$  qui sera  $\equiv$  force  $Rr \times PQ -$  force  $Rq \times QR$ ; le quel à cause de  $PQ \equiv q \equiv s \cos \eta$ , &  $QR \equiv s \cos \theta$ , se réduit à  $\frac{3Me e}{s^3} (cc - bb) \cos \eta. \cos \theta$ .

De la même manière, on trouve le moment par rapport à l'axe  $IB$  dans le sens  $CA$   $\frac{3Me e}{s^3} (aa - cc) \cos \zeta. \cos \theta$ , & le moment par rapport à l'axe  $IC$  dans le sens  $AB$ ,

$$\frac{3Me e}{s^3} (bb - aa) \cos \zeta. \cos \eta.$$



XL. Donc, quoique dans les expressions précédentes, qui regardent le mouvement progressif du corps, on n'ait pu négliger les termes divisés par le carré-carré  $s^4$ , la même raison n'a plus lieu pour le mouvement de rotation, puisque nos formules ne sont divisées que par le cube de la distance  $IR = s$ .

XLI. A cet égard nous avons trois momens de forces à considérer, qui sont

I. Le moment des forces par rapport à l'axe principal IA dans le sens BC  $= \frac{3 M e e}{s^3} (cc - bb) \cos \eta. \cos \theta.$

II. Le moment des forces par rapport à l'axe principal IB dans le sens CA  $= \frac{3 M e e}{s^3} (aa - cc) \cos \zeta. \cos \theta.$



III. Le moment de forces par rapport à l'axe principal IC dans le sens AB  $= \frac{3 M e e}{s^3} (bb - aa) \cos \zeta. \cos \eta.$

XLII. De là il est clair, que tous ces momens évanouiroient, si les trois momens principaux de matière du corps étoient égaux entr'eux; ou  $aa = bb = cc$ ; & dans ce cas le mouvement de rotation du corps ne seroit point troublé, mais il demeureroit uniforme.

Ce n'est donc qu'entant que les momens d'inertie sont inégaux, que le mouvement de rotation est assujetti à des dérangemens, qui peuvent changer tant la vitesse que l'axe de rotation même.

Mais c'est encore un problème bien difficile que de déterminer ces dérangemens: & quand on a réussi à l'égard de l'axe de la terre, ce n'est qu'à une circonstance très particulière que l'on est redevable de ce succès.





M É M O I R E S  
D E  
L'ACADÉMIE ROYALE  
D E S  
S C I E N C E S  
E T  
B E L L E S - L E T T R E S.


---

*C L A S S E D E P H I L O S O P H I E  
S P É C U L A T I V E.*

\* \* \*







## DISCOURS

### SUR CES QUESTIONS:

*Quel est le degré de certitude dont sont susceptibles les preuves tirées de la considération de cet Univers pour démontrer l'existence d'une Divinité ?*

*Et quelle est la meilleure manière de faire usage de ces Argumens a posteriori, pour établir cette importante Vérité ?*

PAR M. FORMEY.

---

**O**n a raison d'appeller la Nature un Livre; c'est le plus grand de tous, & celui dont les caractères sont le plus lisibles. Mais il en est comme des Livres ordinaires; tout le monde n'est pas en état d'y lire: il faut avoir certaines connoissances élémentaires, qui rendent d'abord la chose possible, & ensuite facile. Les degrés de facilité varient à l'infini, & dépendent de la justesse des principes, de l'habitude d'en faire l'application, & de cette force d'esprit & de raisonnement qui pousse l'application aussi loin qu'elle peut aller.

Lorsqu'on demande donc: *Quel est le degré de certitude dont sont susceptibles les preuves tirées de la contemplation de l'Univers, pour démontrer l'existence d'une Divinité ?* cette Question peut être prise dans un sens relatif ou absolu. Si on l'entend relativement, c'est comme si l'on demandoit: De quelle façon s'offre à la vue de l'esprit, dans chaque individu raisonnable qui promène ses regards sur



le monde, & sur les ouvrages de la Nature, cette vérité: IL Y A UN DIEU. Incontestablement à cet égard, comme à celui des objets visibles, il y a autant de points de vue que de spectateurs; chacun, suivant la force naturelle de son génie, suivant les secours acquis qu'il joint à cette force, suivant l'attention qu'il apporte à considérer ces objets, & la réflexion qu'il y joint; enfin & malheureusement, suivant le plus & le moins d'influence qu'ont sur lui une foule de préjugés & de passions; chacun, dis-je, lit la grande vérité de l'Existence d'un Dieu en caractères plus ou moins saillans, si je puis ainsi dire, plus ou moins propres à opérer cette conviction, de laquelle dépend la certitude. Ainsi, comme il seroit manifestement impossible de déterminer le nombre infini des degrés de cette certitude par rapport à tous ceux qui, depuis que le spectacle de la Nature est étalé aux yeux de l'homme, ont su s'élever des Créatures au Créateur; & que c'est proprement à l'Histoire philosophique à nous instruire de cette immensité d'opinions, qui ont régné là dessus dans la Théologie & dans la Philosophie de toutes les Nations & de toutes les Sectes: il faut prendre la Question dans le sens absolu, & examiner, jusqu'où peut aller dans l'homme qui a reçu le meilleur génie de la Nature, qui en fait le meilleur usage, & qui est placé le mieux à portée de connoître tous les objets qui appartiennent à cette doctrine, le degré de certitude sur lequel il fonde le Dogme de l'Existence d'un Dieu? Ces conditions sont absolument requises pour poser le véritable état de la Question: tout défaut, auquel de ces trois égards que ce soit, change le cas & rend la discussion inutile, aussi bien que la décision.

Mais ne seroit ce point ici un fait d'expérience? Ne faudroit-il point chercher un Génie supérieur, & dont la force fût incontestable; un Génie qui eût tourné ses vues, ses recherches, ses méditations de ce côté-là; un Génie enfin, qui eût trouvé pour résultat de tous ses travaux, la Vérité de l'Existence d'un Dieu, & qui l'eût hautement professée, & constamment ramenée à la pratique? Ce seroit là, ce me semble, une Démonstration vivante & parlante; un sujet de honte, de confusion & de silence, pour ces petits esprits, toujours occupés



pés à harceler, à faire des escarmouches, à tirer leur coup en fuyant ; mais qui n'ont ni théorie, ni justesse d'esprit, ni droiture & sincérité dans leurs objections, ni surtout desir ardent de trouver la vérité, qu'ils craignent au contraire & fuient avec une aversion mêlée de frayeur. Le grand Philosophe que l'Angleterre a révéré, & que toute l'Europe admire, seroit bien propre à fournir ce bel exemple. Un *Newton* religieux permettroit-il d'écouter un \* & un \*\* impies ?

Mais, comme dans de semblables matieres, & en général dans toutes celles qui sont du ressort de la Philosophie, on doit éviter les moindres apparences du préjugé de l'autorité, & que d'ailleurs les Libertins se plaignent, quoique le plus injustement du monde, qu'on ne veut point entrer en lice avec eux, & qu'on cherche à les opprimer & à les accabler, plutôt qu'à les convaincre, voyons si l'on ne pourroit point assigner le degré de certitude en question, celui qui résulte des preuves tirées de la contemplation de cet Univers pour démontrer l'Existence d'un Dieu, d'une manière qui mette ce Dogme à l'abri de toute attaque, & qui ôte tout prétexte aux adversaires de la Divinité.

Je vois quatre routes à suivre pour arriver à ce but ; une route *Physique*, une route *Physico-mathématique*, une route *Mathématicométaphysique*, & une route *Métaphysique*.

La première consiste dans la simple intuition des objets, dans la revue des différentes parties de l'univers, dans un examen, soit général, soit approfondi & détaillé, de ce qu'on nomme à bon droit les merveilles de la Nature. De cette intuition, de cet examen, on tire immédiatement la conséquence. Il y a un Monde rempli de choses grandes, magnifiques, belles, utiles, & surtout disposées de manière qu'il en résulte un système régulier, & accommodé à l'état & aux besoins des Êtres qui font partie de ce système. Donc il y a un Être, Auteur du Monde, Ordonnateur de ses parties, Conservateur & Directeur des individus & du Tout. C'est l'argument de David: *Les Cieux racontent la gloire de Dieu* ; c'est celui de S. Paul: *Les choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance, éternelle que sa Divinité,*  
Iii 3
se

se voyent comme à l'œil par la création du monde, étant considérées dans ses ouvrages. C'est celui de plusieurs Sages du Paganisme, qui ont vu & reconnu Dieu dans l'Univers. Il est certain en effet, que c'est de toutes les preuves la plus frappante & la plus à portée de tous les hommes. Et quand ils n'ont pas le malheur d'être étourdis & embarrassés par les Sophismes de l'Incrédulité, cette seule contemplation de la Nature suffit pour leur donner une persuasion inébranlable de l'Existence de Dieu, & leur inspirer des sentimens de respect, d'amour & de confiance, d'où dépendent uniquement le repos & la joye de l'âme. Mais on s'élève avec force contre cet Argument, on le traite de préjugé puérile & d'illusion vulgaire; la Fatalité, ou le Hazard paroissent des principes bien plus propres à rendre raison des choses; on met tout en œuvre pour arracher l'Empire de l'Univers à l'Etre souverainement parfait, & le soumettre à ces causes aveugles. Ce qui achève d'ébranler aujourd'hui la certitude que j'ai cru pouvoir nommer *physique* de l'Existence de Dieu, c'est que des Philosophes qui veulent passer pour Théistes & religieux, rejettent hautement les preuves d'où naît cette certitude, en parlent avec un mépris déclaré, & renferment sous une même condamnation les Ouvrages que l'on a nommés *Théologies physiques*. Pour nous, nous laissons ici la chose indécise, jusqu'à ce que nous ayons fait l'énumération des autres routes qu'on a substituées à cette première.

La seconde est celle que nous avons nommée *physico-mathématique*. Elle consiste à s'assurer que Dieu a non seulement fait de grandes & belles choses, mais qu'il les a faites avec poids & mesure; que tous les rapports, toutes les proportions, toutes les combinaisons, sont autant de chefs-d'œuvre où la Géométrie & la Mécanique se trouvent portées au plus haut degré de perfection. Dans le fond cette route ne diffère de la précédente, qu'en ce qu'elle embrasse un nouvel ordre d'idées, un plus grand nombre de détails. La base sur laquelle repose la certitude est toujours la même. J'avois admiré, en simple Physicien, ou même en simple Citoyen du Globe terrestre, ces Astres éclatans qui décrivent fidèlement leurs révolutions autour de



dé moi; j'avois adoré le Dieu qui les a allumés & suspendus dans le Firmament; mais on m'abсорbe dans de nouveaux sujets d'admiration bien plus puissans, quand on me donne les notions de la grandeur de ces masses, de leurs distances, des proportions entre ces masses & ces distances; quand, au lieu d'une Terre environnée de la voûte étoilée, on offre à mes yeux étonnés des Mondes, des Tourbillons, des Espaces immenses où tout fléchit sous la Loi du Très-haut. Cependant ce sont les mêmes faits qui avoient occupé le Physicien, vus seulement sous une toute autre face, & avec une toute autre précision. Par conséquent les mêmes doutes reviennent. Cette Fatalité, ce Hazard, qui ont pu faire l'oeil & l'oreille, l'Homme & la Terre, le Soleil & les Astres, ont saisi, à la faveur d'une infinité d'essais infiniment réitérés, cette aptitude & cette exactitude, que nous croyons l'ouvrage d'un moment, & d'un seul mot sorti de la bouche de Dieu. On fait valoir ces suppositions, on pousse ces idées aussi loin qu'elles peuvent aller; il semble que, pour certains Philosophes, il y ait quelque chose à gagner en se défaisant de la notion d'une Intelligence, aux vues de laquelle sont dues les perfections de l'Univers, tant celles qui se remarquent dans le Tout, que celles dont chaque partie est pourvue. Il y a des chimeres mathématiques, autant & peut-être plus que de chimeres métaphysiques, malgré le penchant qui porte à regarder cette dernière science comme leur région, leur véritable élément. Une tête remplie de figures & de calculs croit pouvoir tout évaluer & compasser: partant de principes abstraits dont l'existence réelle est entièrement contradictoire, le Physico-mathématicien croit analyser la Nature, & il ne fait que jouer, pour ainsi dire, aux problèmes; il tourne & retourne, passe & repasse, des propositions, des définitions, des suppositions qui lui en imposent par l'extrême simplicité & la parfaite netteté avec lesquelles elles s'offrent à son esprit, mais qui par là même devroient le convaincre qu'elles ne sont point représentatives de la Nature, dont les opérations sont également secrètes & compliquées.

La troisième route que j'ai indiquée pour arriver aux preuves de l'Existence de Dieu, c'est celle que je nomme *Mathématico-métaphy-*



*physique* ; & voici en quoi je la fais consister. Des Génies distingués se sont apperçus que la Matière & le Mouvement, les Loix de la Méchanique, de la Dynamique, de la Statique, & des autres Sciences de ce genre, ne suffisoient pas pour dévoiler le Dieu qui se cache dans la Nature, & qu'il restoit toujours un azyle à ses adversaires dans l'assertion des combinaisons nécessaires ou fortuites. Il s'agit donc de mettre au dessus de ces combinaisons & de leurs loix un Principe d'un autre ordre, d'où elles dépendent, & qui ne pouvant se trouver dans des Créatures purement passives & aveugles, dérive incontestablement d'une Intelligence suprême, qui a tout fait de la manière la plus conforme à ses perfections infinies. L'idée est sans contredit vraie en soi ; les phénomènes du Monde matériel vont se résoudre dans les réalités du Monde intelligible ; & celles-ci ont entr'elles une liaison dont la source se trouve dans les vérités du Monde rationel, qui sont les vrais principes universels, & qui coïncident avec les idées mêmes de Dieu. Mais que des Intelligences finies, & en particulier des Intelligences humaines ; qui paroissent placées assez bas dans l'échelle des Êtres spirituels ; que de telles Intelligences puissent assigner le Principe métaphysique, qui fait en même tems la Loi générale de l'Univers, & la Démonstration unique de l'Existence de Dieu, c'est ce qui paroît tout à fait impossible. Nous ne nous récrions point contre cette entreprise, comme quelques uns l'ont fait, en disant que la Démonstration de l'Existence de Dieu ne sauroit dépendre de calculs & de signes algébriques, qu'elle doit être à la portée de tout le monde, & qu'il seroit singulier qu'on fût obligé de faire main basse sur toutes les preuves ordinaires que les Catéchismes & les Cours de Théologie renferment pour y substituer un Principe tel que celui de la moindre Action, ou tout autre du même genre, qu'on voudroit ériger en Principe primitif à cet égard. Ces objections me paroissent peu concluantes. Quiconque a de saines idées de la Démonstration, ne sauroit douter qu'en général elle n'est pas faite pour le peuple, & qu'on ne la trouve point dans les Ouvrages ordinaires des Philosophes & des Théologiens. ... Ces Ouvrages ne sont gueres qu'un tissu de propositions,

liées





liées le plus souvent dans la mémoire & dans l'imagination de leurs Auteurs sans l'être entr'elles par aucune force réelle de raisonnement. L'éloquence, ou l'érudition, qui se trouvent mêlées dans l'exposition de ces Vérités, achevent d'énervier entièrement ce qui pourroit s'y trouver de solide & de concluant; & l'on ne remporte de semblables lectures que des probabilités vagues, dont l'esprit est plus ou moins affecté, suivant que certaines causes externes y contribuent. Voilà, pour dire les choses comme elles sont, l'état où se trouve non seulement le Vulgaire, mais le très-grand nombre de ceux qui ont des connoissances acquises, par rapport aux Vérités susceptibles de démonstration. Rien donc ne seroit plus heureux & plus désirable qu'une Démonstration nette, concise, & à l'abri de toute contestation, qui établiroit l'existence de Dieu sur un fondement unique & inébranlable.

Il seroit inutile de se plaindre de l'*inintelligibilité* d'une semblable Démonstration pour le peuple. Qui dit Démonstration, dit une chose nécessairement inintelligible au peuple, à tous ceux qui n'ont pas étudié les règles du raisonnement, & même à ceux qui les ayant étudiées ont négligé d'acquérir l'habitude de les réduire en pratique. On ne doit pas s'en laisser imposer par l'abus perpétuel qu'on fait du terme de démontrer dans la Conversation, en Chaire, ou dans les Ouvrages. C'est cet abus qui est la principale cause du Pyrrhonisme auquel se livrent ceux qui ont l'esprit assez pénétrant pour appercevoir le ridicule des Dogmatiques téméraires; mais qui, soit par découragement, soit par quelque pente secrète à se débarrasser des Vérités en général, à cause de quelques Vérités particulières qui les importunent, ne savent pas démêler parmi toutes ces assertions vagues & hazardées celles qui peuvent être conduites à l'évidence.

Après avoir ainsi rendu, si je ne me trompe, la plus exacte justice au dessein de ceux que j'ai appelé *Mathématico-Métaphysiciens*, je demeure toujours persuadé qu'ils prennent un vol d'Icare, & que l'entreprise qu'ils n'ont pas simplement conçue, mais que quelques uns croient avoir pleinement exécutée, est au dessus de toutes les

forces humaines réunies, si tant est, comme je l'ai insinué, qu'elle ne surpasse pas celles de toute Intelligence finie. Découvrir la Loi générale de l'Univers, c'est voir d'un coup d'œil l'existence de la Cause dans tous les effets; c'est se placer au centre de l'Univers, & saisir tout à la fois le point où chaque rayon part de ce centre, & celui où il aboutit à un point donné de la circonférence.

Passons donc à une quatrième & dernière classe de preuves, que j'appelle simplement *métaphysiques*. Je vais tâcher d'en donner une idée bien précise. Peu de gens connoissent la Métaphysique; plusieurs la craignent. Certaines difficultés apparentes rebutent d'en acquiescer la connoissance, dès-lors on se tire d'affaire en décrivant cette Science comme inutile & chimérique. J'ai vu des gens qui avoient blanchi dans la Théologie & dans la Littérature, se glorifier fort sérieusement, se féliciter hautement, de ne connoître point la Métaphysique, de ne l'avoir jamais étudiée, & de s'être par conséquent toujours préservés de ses influences tant dans leurs Discours que dans leurs Ecrits. On l'auroit deviné sans qu'ils s'en vantaient. D'un autre côté, les écarts ou de prétendus Métaphysiciens se jettent, produisent aussi un mauvais effet; quand on entend déraisonner d'une manière si étrange des gens qui ont passé toute leur vie à spéculer, & qui se piquent d'être de profonds Métaphysiciens, on se persuade que la science qu'ils étudient est aussi embarrassée que leur cerveau, & aussi déconseillée que leurs productions. Mais un Philosophe judicieux ne s'arrête point à tous ces accessoires, on parle d'une Science, il travaille à la connoître, & ne l'apprécie qu'après en avoir acquis de justes idées.

La Métaphysique est la Science des notions générales, qui se forment par abstraction, à mesure que nous avançons dans la comparaison d'abord des différens individus, ensuite des especes, & enfin des genres, jusqu'à ce que nous nous élevions à la notion la plus abstraite, la plus universelle, au genre le plus éminent auquel nous puissions atteindre. Les opérations par lesquelles se forme la théorie des notions, sont précisément les mêmes qui font l'objet de la Logique,

que; il faut commencer par une intuition exacte & attentive des objets, passer de là à la réflexion pour les comparer & en juger, & combiner ensuite ces jugemens d'une manière qui en forme des raisonnemens concluans, & des suites de raisonnement qui aient le caractère de la Démonstration. Ce n'est pas ici le lieu d'enseigner plus au long comment on procède à cet égard, & ce qu'exige la construction d'un Systeme de Métaphysique: mon but est uniquement de faire sentir que toute certitude, de quelque genre qu'elle soit, dépend des premières notions de la Métaphysique. Il suffit, pour s'en convaincre, de remarquer que toutes les Sciences particulières n'étant que des Théories d'Êtres individuels, spécifiques, ou génériques, renfermées sous quelque notion commune, il faut que ces Théories soient subordonnées à celle de l'Être en général, qu'elles en tirent leur vérité, & pour ainsi dire, leur légitimité; en sorte que la ruine de la Certitude métaphysique emporte celle de toutes les autres.

Pour me rapprocher après cela du but de ce Discours, je dis, & je ne vois pas comment on pourroit le nier; que toute Démonstration de l'Existence de Dieu, *physique*, *physico-mathématique*, ou *mathématico-métaphysique*, n'est vraie qu'autant qu'elle est métaphysiquement certaine & démontrée; d'où j'infère que la route la plus sûre, ou même l'unique, pour arriver à une Démonstration quelconque, & par là même à celle de l'Existence de Dieu, c'est de résoudre les preuves sur lesquelles on l'appuie par une analyse qui remonte jusqu'à ces notions communes où gît toute certitude. Sans cela vous retombez inévitablement dans quelcune des difficultés auxquelles nous avons vu que les routes précédentes étoient exposés; & vous n'avez aucun moyen de vous délivrer de toutes ces difficultés; parce qu'en effet elles sont irrésolubles, tant que vous ne fondez que sur des principes *physiques*, *mathématiques*, ou en général sur les principes de quelque Science particulière que ce soit. J'ose dire que voilà pourquoi il y a tant d'Ouvrages manqués sur cet important sujet. Les Incrédules sentent fort bien leurs avantages & en profitent; ils font une vigoureuse résistance, tant qu'on ne leur oppose que les merveilles,

ou les Loix de la Nature ; ils ne font véritablement ferrés, & poursuivis jusques dans leurs derniers retranchemens, que quand on les force d'opter entre les maximes du bon sens, (car voilà à quoi se réduisent les notions communes de la Métaphysique,) ou les paradoxes insoutenables qu'ils ont l'art de pallier, dès qu'on les laisse maîtres de choisir le terrain à leur avantage.

Ici donc commence la discussion du second Article compris dans la Question proposée, *sçavoir, quelle est la meilleure maniere de faire usage de ces argumens à posteriori, pour établir l'existence de Dieu ?* Si je voulois y répondre pleinement, il faudroit m'acquitter moi-même de la tâche prescrite ; mais ce seroit faire un Livre au lieu d'un Discours. Je crois donc qu'on trouvera que j'ai rempli le plan de celui-ci, pourvu que je pose des regles, à l'aide desquelles on puisse faire usage de ces argumens *à posteriori*, ou juger si ceux qui les mettent en œuvre, le font avec succès. L'essentiel des quatre routes précédentes se trouve compris dans ces regles ; & les inconveniens attachés à chacune d'elles en particulier disparaîtront.

I. On doit commencer par une exposition des faits de la Nature, aussi étendue que l'état présent des connoissances naturelles le permet, aussi liée que les divers rapports des parties de l'Univers qui s'offrent à nos regards, ou à nos recherches, en fournissent les moyens, aussi nette & dégagée de toute fausse merveille, de tous ces récits fabuleux dont on a chargé de tout tems l'Histoire naturelle, que le génie observateur & l'esprit philosophique, qui ont fait tant de progrès dans ces derniers siècles, peuvent y contribuer ; en un mot, où l'Expérience & le Raisonnement agissent toujours de concert, & ne fassent pas un pas sans s'être bien assuré de la solidité du terrain. Il est aisé de sentir que l'existence & les perfections de Dieu ne sçauroient être déduites d'un amas d'idées confuses, & en partie chimériques ; c'est comme si l'on vouloit tirer l'Eloge d'un grand Prince de quelque Roman qui auroit paru sur son sujet. Cette premiere partie de la tâche dont nous prescrivons ici les regles, est immense, prise  
sous





sous un certain point de vue, & entant qu'on voudroit articuler tous les faits de détail, ou bien dans la supposition qu'on voudroit faire par soi-même toutes les Observations & toutes les Expériences; mais ce n'est pas là notre pensée. D'un côté, on peut réduire cette immensité de faits à un certain nombre de classes, & y rapporter ce qu'il y a de certain, d'avéré, d'incontestable dans chaque genre, en Astronomie, en Chymie, en Botanique, &c. & de l'autre, il est permis de regarder comme prouvé & démontré en matière de fait tout ce qui a pour base des Observations & des Expériences exactes, répétées, faites par des Philosophes dont personne ne conteste l'habileté & la véracité. C'étoit là ce qu'on se promettoit du grand Ouvrage; auquel deux célèbres Modernes ont donné le nom d'*Histoire Naturelle*. Mais, quelques preuves qu'on y trouve de leur génie & de leur sçavoir, ils n'ont pourtant pas rempli l'idée que je viens de fournir; ils ont perdu trop souvent de vue la Nature; & se lassant du pénible métier d'observer & de décrire, ils ont donné l'essor à leur imagination, & par des hypothèses singulieres, & presque entièrement précaires, ils ont ébranlé cette certitude qui devoit être le résultat de leur travail, & à laquelle nous voudrions mettre en état de parvenir ceux qui s'occuperont désormais d'un pareil travail.

II. Pour cet effet, après qu'ils auront accompli la première règle que nous venons d'indiquer, nous les invitons à ne point s'arrêter à des conclusions de détail, de l'ordre de celles qui se trouvent dans les différentes Théologies Physiques, à ne point tirer encore immédiatement l'idée du premier Être, de la grandeur & de la magnificence des Cieux, de la structure admirable de l'œil & de l'oreille, de la sagacité & des diverses manoeuvres industrieuses des Animaux, des Insectes, & en général de conséquences quelconques dérivées de l'Histoire Naturelle, sans aucune notion intermédiaire, sans aucun principe métaphysique, qui mette en évidence que ces conclusions sont justes, & à l'abri de toute exception. Or je ne connois d'autre notion, d'autre principe, qui puisse produire cet effet, que la contingence de ces divers Êtres individuels dont on a appris à connoître, par l'étude de

Histoire Naturelle, l'existence, les propriétés, les relations, l'ordre & l'enchaînement. Il est inutile de s'écrier d'abord : O merveille ! O puissance ! O sagesse ! O bonté ! L'Incrédule ne prendra jamais cela que pour de vaines figures, de froides déclamations ; il se cantonnera dans le fort inexpugnable, (au moins à de pareilles batteries,) de la Fatalité, du Hazard, du Spinozisme. Pour le déloger de là, il faut le convaincre que ces choses si nombreuses, si belles, si variées, ont pu ne point être, & pourroient être autrement qu'elles ne sont. Dès-là il est impossible qu'aucune partie considérée en particulier, ni que le Tout formé de l'assemblage de ces parties, renferme en soi le principe de son existence, possède cette *essence* qu'on voudroit lui attribuer pour se passer de l'idée d'un autre Être, distinct du Monde & de la Matière, qui ait seul la prérogative d'exister nécessairement.

Cette preuve bien maniée est assurément la plus forte de toutes ; elle est la seule démonstrative. Observez, mesurez, pesez, calculez, tant que vous voudrez ; vous n'avancerez absolument rien, avant que d'avoir rompu la redoutable barrière de la nécessité absolue. Mais, dès que ce pas est franchi, l'Univers rentre, pour ainsi dire, dans le néant, & ne peut plus en sortir qu'à la voix de l'Être véritablement infini, de cet infini réel, que si peu de Philosophes ont su connoître & définir. Cette idée mérite que nous nous y arrêtions un moment. Les hommes en général, & presque tous les Philosophes, ont confondu l'Infini avec l'Incommensurable, avec ce qui surpasse les bornes de nos conceptions. Trouvant ensuite dans la Nature des objets dont les uns ont une immensité en grandeur, & les autres en petitesse, qui échappe à notre imagination ; ils ont cru avoir saisi la vraie notion de l'Infini ; & l'appliquant à l'Univers, où ces différens objets se rencontrent, ils ont été portés à en faire un Tout infini ; idée purement négative, qui ne signifie autre chose que l'impuissance où nous sommes d'embrasser la connoissance de cet Tout. Des Cartes, embarrassé par les conséquences qu'il découvroit dans cette

asser-



assertion, la déguisa en quelque sorte, & voulut faire d'affaire en substituant le terme d'Indéfini à celui d'Infini. Mais on apperçoit assez que les idées abstraites de l'Etendu & de l'Espace, qu'il transportoit des Mathématiques à la Physique, l'induisoient à croire que le Monde ne sçauroit avoir de limites. Une erreur en entraîne une autre. Ceux qui étoient mal intentionnés contre l'Existence de Dieu; ont prétendu que l'Infini étant une fois trouvé dans le Monde, il étoit superflu de le chercher ailleurs; que le Monde avoit tous les caractères & toutes les perfections de l'Etre existant par soi-même, & que le principe de tous ses états, passés, présents & à venir, se trouvoit dans la force essentielle, tant représentative que motrice, dont il étoit doué. On ne sçauroit détruire ces suppositions, qu'en faisant voir que l'Infini imaginaire n'a aucun rapport avec l'Infini réel, & qu'un assemblage quelconque d'Etres successifs, ou simultanés, ne sçauroit produire une substance vraiment infinie; parce que tout nombre est fini; & qu'il implique contradiction qu'il ne le soit pas; ensuite, parce que chaque chaînon de cette chaîne pouvant être détaché, anéanti, il ne résultera jamais de semblables parties un Tout nécessaire; enfin, & surtout, parce que l'Infini réel emporte un acte unique, simple, indivisible, où les modifications, altérations & successions, qui forment les décorations perpétuelles de ce Monde; ne sçauroient subsister. C'est, si je ne me trompe, dans le développement de ces notions que consiste la véritable force des Argumens *à posteriori* au sujet de l'Existence de Dieu. Tous ces Argumens se réduisent alors à un seul. Après avoir avancé l'Enthymème; Il y a des Etres: Donc il y a un Dieu; on tire de la considération de ces Etres la démonstration de la Thèse qu'on se propose d'établir, non d'une considération physique, qui se borne à exposer leur nombre, leur ordre, leurs rapports, & leurs perfections; mais d'une considération métaphysique, qui pénètre l'écorce de ces êtres pour en saisir le fond & l'essence, & pour dévoiler sur eux cette contingence,






ce, qu'on peut appeller à juste titre le miroir de l'Existence nécessaire de Dieu.

III. Quand on est jusques-là, le reste s'exécute en quelque sorte de soi-même. Ces Créatures, qui ne sont que parce qu'il y a un Dieu, commencent à annoncer la gloire de leur Auteur, elles entonnent un hymne à l'honneur de toutes ses perfections; il ne s'agit plus que de rendre leurs voix distinctes & concordantes. C'est alors qu'on peut parler d'ordre, de fins, de vues, de moyens & de but, de sagesse & de bonté; c'est alors que chaque Créature étalant ce qu'elle a de réalités & de beautés, devient un miroir des perfections divines avec lesquelles elle a quelque analogie. Ici le Livre de la Nature s'ouvre véritablement, & chaque page devient lisible & lumineuse. Quelques lacunes qui y restent encore, sont si peu de chose au prix de tout ce qui est écrit en caracteres distincts & ineffaçables, qu'il n'y a qu'un aveuglement volontaire qui puisse empêcher d'y trouver ce que nous cherchons, les preuves les plus frappantes de toutes les perfections souveraines, liées inséparablement entr'elles, & agissant avec une constante harmonie. C'est une considération sur laquelle il faut principalement insister, que celle qui est prise de cette liaison des perfections divines, en vertu de laquelle chaque détermination des choses existentes est un résultat de toutes ces perfections réunies, & ne devient pleinement intelligible, qu'entant qu'on connoit comment & combien chacune de ces perfections a influé sur la détermination actuelle. On trouve dans cette notion la vraie Théodicée, l'unique source des réponses aux objections prises des désordres & des imperfections dont le Monde paroît rempli. La supposition d'une Puissance qui seroit tout à la fois tout ce qu'elle peut faire, ou d'une Bonté qui combleroit toutes sortes d'être de toutes sortes de biens portés au plus haut degré, est incompatible avec la souveraine perfection, qui ne laisse agir aucune perfection particulière, seule & sans le concours de toutes les autres. Ou bien, s'il y en a une qui doit présider à leur exer-



exercice, & se trouver, pour ainsi dire, au timon, c'est la Sagesse, qui est l'ame de toutes les opérations divines.

Je ne fais que montrer les différens chefs qui doivent entrer dans une tractation complete du sujet proposé. Chacun après cela, suivant le tour d'esprit qui lui est propre, ou les études particulières dont il a fait son objet, peut varier & modifier en bien des manières ce plan général, sans porter atteinte à la certitude désirée. Il suffit de ne point perdre de vue les distinctions que j'ai posées, & les règles que j'ai prescrites, pour arriver à la conviction, & pour y conduire tous ceux qui n'ont pas adopté les égaremens du Pyrrhonisme universel, dernière ressource du Libertinage d'esprit & de cœur. Après avoir ainsi fortifié le terrain que nous défendons, rien n'est plus aisé que de faire des excursions sur celui des Adversaires, & de leur montrer avec l'évidence la plus victorieuse, que tous ces reproches de crédulité, toutes ces railleries dont ils accablent les partisans des dogmes de la Religion, retombent sur eux à plomb, n'y ayant rien de plus gratuit & de plus absurde que les suppositions qu'ils sont obligés de faire pour se soustraire à ces dogmes.





# DISCOURS

## SUR LA MÉTAPHYSIQUE \*).

PAR M. MERIAN.

---

**C**omme toutes nos connoissances tirent leur origine des sens; il falloit que les êtres sensibles, les corps qui nous environnent, le spectacle du monde matériel fussent les premiers objets de la curiosité de l'homme. Elle ne s'exerça d'abord que sur des choses individuelles: ensuite l'on compara ces choses; l'on remarqua leurs différences, leurs rapports, les changemens qu'elles subissent. Après avoir recueilli un grand nombre d'observations, on essaya de les lier; & l'on parvint à des analogies, à des hypothèses, à des points de vue généraux. C'est ainsi que la Physique, grossière dans ses commencemens, se perfectionna par degrés, s'affujettit tous les phénomènes dont l'espace & le tems sont remplis, & travaillant sur le fonds immense de la Nature, devint inépuisable comme elle.

La matiere & le mouvement sont les plus hauts points où l'on puisse remonter dans la recherche des causes naturelles; mais qu'est-ce que la matiere & le mouvement? Ici s'ouvre une nouvelle perspective. Ce ne sont plus ces corps que l'on voyoit, que l'on touchoit, dont on mesuroit la grandeur, déterminoit la figure, calculoit la vitesse; mais des atomes, des élémens, des êtres simples, des forces, des représentations; c'est un Monde transcendant, gouverné par de nouvelles loix, qui sont le précis sublime des loix de la Physique. Là se cachent à nos sens les machines & les premiers ressorts du théâtre mobile de l'univers.

Mais

\*). Lu dans l'Assemblée publique du 6. Juin 1767.



Mais tôt ou tard ces contemplations doivent ramener le contemplateur à lui-même. Il arrivera un moment où il se dira avec surprise : que suis-je donc moi qui me tourmente pour savoir ce que sont les autres êtres ? Quelle est cette toile animée où la Nature vient peindre ses merveilles, & qui réagit sur ces tableaux en tant de manières différentes ? Alors il descendra dans l'abîme de son être, il s'occupera de l'analyse de ses facultés, il méditera sur sa propre nature. Quelle foule de sujets dans un sujet si simple ? Perceptions, idées, souvenir, réflexion, goût, sentiment, raison & folie, plaisir & douleur, nous sommes tout à tout tout cela ; c'est toujours nous, mais sous des faces infiniment variées. Par quel mécanisme, ou par quelle magie la pensée s'unit-elle à l'étendue, & la volonté au mouvement ? Comment discerner ce fond de notre être qui se déguise sous tant de formes ? Qu'est-il ? D'où vient-il ? Que doit-il devenir ? Il faut avouer que nous sommes un problème bien curieux & bien difficile.

Enfin c'est en réfléchissant sur l'origine commune des esprits & des corps, que nous nous élevons à la souveraine cause, à cet être infini, éternel, indépendant, la source des intelligences, le premier moteur de la matière. Quels sont ses attributs ? En quelle relation est-il avec le monde ? Que devons nous en craindre ou en espérer ? Ce sont autant de questions que notre esprit, trop téméraire peut-être, a hasardé d'approfondir & de résoudre.

Mais en effet, comment cet esprit est-il parvenu jusque-là ? En retournant sur ses pas, il voit qu'il a eu continuellement à lutter contre sa faiblesse. Son étroite capacité ne lui permettant ni d'embrasser ni de retenir au delà d'un certain nombre d'idées, il ne lui resta d'autre ressource que de ranger ses idées en classes, d'attacher à chacune de ces classes un signe qui la fît reconnoître, en un mot, de créer les espèces & les genres, frêles mais utiles échaffaudages de nos connoissances. De ces abstractions, fondues en un seul corps, on a fait une science à part, qui contient les éléments, & rassemble les matériaux de toutes les sciences.



C'est par cette raison qu'elle fut nommée la science première, quoiqu'elle n'ait pû se former qu'après les autres. Du tems d'Aristote elle faisoit encore partie de la *Zétumènt*, ou de la science qui restoit à chercher. C'est à elle que les philosophes de l'école donnerent le nom de Métaphysique. Nous suivrons ici l'usage reçu. La Métaphysique commence là où la Physique finit: elle comprend l'Ontologie, la Cosmologie, la Psychologie, & la Théologie naturelle. Tout ce que nous allons proposer regarde ces quatre sciences. Je ne les envisagerai aujourd'hui que sous un aspect général: je tâcherai d'en fixer la valeur, tant absolue que relative: je parlerai de leurs avantages aussi-bien que de leurs inconvéniens; & je ne dissimulerai pas les défauts de ceux qui les cultivent.

Ce n'est point outrer l'éloge de la Métaphysique que de dire qu'elle est la plus sublime & la plus excellente de toutes les sciences. Quels sont les sujets qu'elle traite? c'est-ce qu'il y a de plus noble & de plus grand, ce qu'il y a de plus digne de nos recherches, ce qui nous touche de plus près, le monde des esprits, notre propre être, l'être suprême, les principes des choses, l'origine des notions. Si nous réfléchissons sur le but de nos connoissances, nous verrons que la vraie étude de l'homme est l'homme, & que les autres ne sont intéressantes qu'autant qu'elles se rapportent à cette grande fin. La Psychologie nous apprend à nous connoître, ou du moins à nous chercher; & la Morale tient, d'une façon particulière, à presque toute la Métaphysique. Peut-on mieux employer ses lumières & ses talens qu'à examiner sur quoi portent les devoirs qui nous attachent à Dieu, à nos semblables, à l'univers, à nous-mêmes? Etrangers chez nous, de quoi nous sert de mesurer les cieux, & de sonder les abîmes?

Mais ces connoissances elles-mêmes dépendent de la Métaphysique. Depuis Aristote jusques à Leibnitz tous les grands hommes ont reconnu qu'elle verse ses influences heureuses sur toutes les sciences, qu'elle leur fournit des principes justes, des notions directrices, des vues saines, & la vraie méthode.





Il est un sentiment du vrai, une sagacité, qui rapproche les rapports éloignés, saisit le chemin le plus court, voit la Nature en grand, & va tout d'un coup où l'assiduité & le travail ne se traînent qu'avec lenteur. Ce sens philosophique fait germer & fructifier toutes nos idées: c'est lui qui élève le physicien au dessus du simple observateur, qui organise, pour ainsi dire, la masse pesante de l'érudition, & qui dans tous les genres distingue l'homme de génie du savant laborieux. Ce sentiment, je l'avoue, est un don précieux de la nature, mais qui demande à être cultivé; & ce n'est qu'en le nourrissant des premiers principes, ou de ce qu'il y a de métaphysique dans les sciences, qu'on le développe, & qu'on lui donne de l'activité.

A quoi servent les sciences? Dans un siècle éclairé, & chez des nations civilisées, cette question ne devrait jamais être faite. Cependant c'est l'affaire éternel que l'ignorance livre au savoir; il n'est point d'homme de lettres qui ne l'ait essuyé. Le Physicien n'est guère embarrassé dans cette rencontre: il peut indiquer des usages qui se font sentir aux esprits les plus matériels & les plus stupides. La Géographie conduit le voyageur; l'Astronomie divise les tems & les saisons; la Mécanique, l'Hydrostatique, l'Optique fournissent soit aux besoins, soit aux commodités de la vie; la Médecine guérit nos maux, & retarde l'instant fatal de la mort. Mais la Métaphysique ne fait rien de tout cela: elle est donc, à cet égard, dans un cas extrêmement défavorable; & c'est-ce qui la dégrade aux yeux du vulgaire, qui ne juge que par les yeux.

Il est une autre espèce d'hommes, qui donnent à l'esprit humain les bornes du leur: ils ne prétendent point que la science soit inutile; mais ce qu'ils ne savent pas ne peut pas être su, ou n'est pas digne de l'être. Vous les verrez traiter de chimère & de vision toutes les recherches qui passent leur capacité, ou qui peseroient trop à leur indoence. Ils ressemblent à ces anciens Géographes qui, après avoir dessiné les régions qu'ils connoissoient, écrivoient sur les bords de



leurs cartes, „au delà il n'y a plus qu'un Océan sans fin, des déserts „impénétrables, & les monts inaccessibles de la Scythie.“

Ce qui surprend davantage, c'est de voir de vrais savans, absorbés dans leur genre, mépriser tous ceux qu'ils n'ont point cultivés, ou qu'ils n'ont cultivés que superficiellement. A considérer la chose sans prévention, il me semble qu'on ne sauroit déprimer une science qu'aux dépens de toutes les autres. Si elles sont inutiles, abandonnons-les toutes: si elles sont utiles, n'en abandonnons aucune; & que chacun suive son goût, ou se laisse entraîner à l'ascendant de son génie. On risque de perdre l'estime publique en se la disputant: partageons-la, & ne frustrons personne de la portion qui lui revient.

C'est un spectacle étrange que des philosophes qui se font la guerre sur un frivole point d'honneur. Tandis que le Métaphysicien ne voit rien au dessus de la Métaphysique; le Physicien & le Géomètre regardent les prétentions avec mépris, & soutiennent, avec aussi peu de fondement, qu'il n'y a de vraie science que la leur. Je ne m'arroge pas le droit de régler les rangs; mais je me permettrai quelques réflexions.

Le prix de chaque Science me paroît être en raison composée du but où elle tend, & de la faculté d'y atteindre. Or, si je ne me trompe, ces deux points étant compensés l'un par l'autre, la valeur comparative de toutes les sciences humaines se réduira à une espèce d'égalité. L'une travaille sur des sujets plus importants, l'autre avec plus de facilité: celle-ci est plus sublime dans ses vues, celle-là plus sûre dans ses opérations.

Il ne faut qu'être de bonne foi pour convenir que la Métaphysique s'attache à de plus hauts objets que les sciences naturelles. Elle pénètre dans l'intérieur des choses dont la Physique ne fait qu'entamer l'écorce. Qui ne préféreroit, si le choix étoit en son pouvoir, à la connoissance des phénomènes naturels, & des causes qui les produisent, la connoissance de soi-même, de son origine, de sa destination? La Physique





sique ne tire-t-elle pas son plus grand lustre du jour qu'elle répand sur la Théologie naturelle? N'est-ce pas là le lieu commun que ses panégyristes ont le plus souvent rebattu? Mais la Physique, à cet égard, ne donne que des faits; c'est à la Métaphysique à les convertir en preuves.

On peut dire en général que chaque partie de la Physique aboutit à un terme où s'ouvre un nouveau champ pour le spéculateur; il y a même telles parties de Physique qui ont besoin d'être rectifiées par la spéculation. Quand la doctrine des sens a passé par les mains du physicien, nous sommes encore fort éloignés de connoître les limites de nos différentes sensations: nous confondons la vue & le toucher; & l'erreur est inévitable, si nous n'avons recours à une science plus relevée. L'Optique nous fait voir, par des lignes, & par des angles invisibles, des distances, des figures, des grandeurs qui ne sauroient être l'objet de la vue. Ce ne sont ni les Physiciens, ni les Géomètres; ce sont les Métaphysiciens qui nous ont enseigné la vraie Théorie des sensations.

Je veux que nous soyons parvenus à analyser tous les phénomènes naturels dans leurs principes les plus simples, ou les plus généraux: notre curiosité sera-t-elle satisfaite? Ne restera-t-il rien à désirer? Vous croyez toucher au premier chaînon; mais ce chaînon dépend d'une infinité d'autres, qui échappent à votre vue. Vos loix les plus universelles ne sont peut-être que des loix très spéciales; peut-être même ne sont-elles que des exceptions. Qu'est-ce par rapport à l'immensité que ce coin du monde où nous observons? S'il y a donc une science qui reprenne la chaîne où vous l'avez laissée, & qui s'efforce de la suivre jusqu'au bout; quel qu'en puisse être le succès, on ne sauroit au moins contester la grandeur de l'entreprise.

Non-seulement le parfait Métaphysicien posséderoit des connoissances plus utiles, plus profondes, plus curieuses que ne le seroit la Physique dans son plus haut période; il seroit parfait Physicien à son



son tour. Les élémens des corps seroient à découvert devant lui; il verroit, comme sous ses yeux, les phénomènes éclore de leurs principes, & les causes secondes sortir des causes premières. Il suivroit, dans les moindres détails, le vaste plan que l'éternel Géometre a conçu & exécuté. L'univers n'auroit point de prodige pour lui, la Nature point de voile, la Physique point de mystère.

Mettons à présent dans la balance l'espérance qu'il y a de part & d'autre: pesons les progrès que l'on peut raisonnablement se promettre dans ces deux sciences: examinons pour cet effet, & sur quoi elles sont fondées, & par quels moyens on peut les perfectionner.

L'observation & l'expérience sont la base commune de la science des corps, & de celle des êtres immatériels: mais on ne sauroit se déguiser que le physicien n'ait ici un avantage considérable sur le spéculateur.

Les objets de la Métaphysique sont d'une subtilité, d'une finesse qui met en défaut les génies les plus pénétrants, & les plus exercés à la méditation. Tantôt ils s'échappent lors même qu'on croit les avoir fixés; tantôt ils sont obscurcis les uns par les autres; souvent il n'y a qu'un instant propre à les saisir, & cet instant manqué ne se retrouve point: rarement on est maître de répéter les observations; & quand on y revient, le sujet a changé. Avec une patience à toute épreuve, avec une extrême contention d'esprit, on ne surmonte pas toujours de si puissans obstacles.

„Rien ne nous est mieux connu que l'ame, dit Leibnitz, parce qu'elle nous est intime, c'est à dire intime à elle même.“ Mais ne faut-il point à l'esprit, comme à l'oeil, une certaine distance pour apercevoir distinctement? Quelle peine ne sent-il pas à se replier sur lui-même? Ces sortes de contemplations ne sont si difficiles & si incertaines que parce qu'elles se font sur le sujet même qui contemple, parce que nous sommes, tout à la fois, les observateurs & la chose à observer. La Psychologie n'opere pas par des projections artificielles; pour



pour voir au dedans de nous, il faut, pour ainsi dire, nous placer hors de nous: quelque acte de notre ame que nous contemplions, ce n'est jamais dans l'instant qu'il s'exécute; c'est toujours dans le passé; & après les plus grands efforts, est-on bien sûr que les objets ne se soient pas dénaturés par des nuances imperceptibles? Il n'est point de Métaphysicien qui ne me comprenne, parce qu'il n'en est point qui ne l'ait éprouvé.

La Physique n'a aucun de ces désavantages. Les corps, les phénomènes se présentent à nos sens presque autant de fois que nous le désirons. Ce sont ou des choses permanentes, ou des choses qui reviennent fréquemment. Nous sommes entourés d'une infinité de corps formés sur le même modèle; leurs propriétés ont quelque chose de frappant; on les manie à son aise; on marque exactement & leurs différences & leurs rapports; il ne faut qu'une attention médiocre pour éviter les méprises. Dans les phénomènes plus-rares ou plus compliqués, on peut au moins espérer de renflir par un travail opiniâtre; au lieu que le Métaphysicien passe sonvent sa vie à méditer en pure perte.

Loin de rencontrer des écueils dans les objets de ses recherches, le Physicien y trouve de nouveaux secours: non content d'interroger la Nature, il la force à répondre. Qu'on porte la vue sur le nombre prodigieux d'artifices qu'il emploie pour lui arracher ses secrets, sur ces instrumens qui pénètrent dans les corps, étendent la sphere des sens, les fortifient, & semblent même les multiplier. Le Chymiste, par la vertu de ses dissolvans, & par l'action puissante du feu, divise la matiere jusqu'en ses moindres molécules. L'Anatomiste examine la structure intérieure de l'animal, creuse dans les canaux où circulent les liqueurs dispensatrices de la vie, & suit le jeu de l'organisation. Ici un petit verre nous dévoile les merveilles du Microcosme; là un Astronome dresse sa lunette contre le firmament, observe la position & la marche de ces vastes corps qui roulent dans l'immensité, voit briller de nouveaux soleils dans de nouveaux cieus, un univers



inconnu semble naître à ses regards. Ce fluide qui entoure notre globe, est pesé dans le barometre, est condensé ou raréfié dans la machine pneumatique. Un fluide infiniment plus subtil, dont tous les corps sont plus ou moins imprégnés, obéit à l'électrification. Le prisme décompose ces faisceaux lumineux que l'astre du jour darde jusqu'à nous, & y découvre la naissance des différentes couleurs dont la Nature se pare. Je n'aurois jamais fait si je voulois détailler toutes les ressources de cette Science. Qu'est-ce que la Métaphysique peut y opposer? Ce n'est que par des spéculations qu'elle s'aide dans ses spéculations.

Les secours - même qu'elle partage avec la Physique, ne sont pour elle ni aussi sûrs ni aussi étendus. Je ne décide point si le monde immatériel est plus ou moins varié que celui des corps; mais ce que personne n'ignore, c'est que ce dernier offre des analogies plus saillantes & mieux caractérisées. De là vient que les classes y sont plus exactement distribuées, & les inductions moins sujettes à l'erreur.

Enfin, c'est surtout dans les sciences auxiliaires que la Physique triomphe: on sent que je veux parler de tout ce qui est compris sous le nom général de Mathématiques.

Les Mathématiques sont la science de la Quantité, tant continue que discrete, science idéale & qui ne roule que sur des abstractions. Les Mathématiques ne sont qu'une branche de l'Ontologie, elles ne sont, à proprement parler, que la Métaphysique de la Quantité.

Mais cette branche s'est si fort éloignée du tronc, qu'elle en paroît séparée. Le Métaphysicien se contente de voir comment les notions d'étendue, de figure, & de nombre se forment dans notre esprit; le Géometre en suit les propriétés & les rapports. C'est ainsi qu'il tire du sein de la Métaphysique une science qui devient la rivale de  
de



de la Métaphysique, & qui s'éclipse par la vive lumière dont elle rayonne de tout côté.

L'évidence mathématique résulte de la précision & de l'exacte détermination des idées: chacune de ces idées a ses propres traits, qui ne se mêlent jamais avec les traits des autres: tout est bien distingué, & une Logique rigoureuse lie toujours les prémisses avec la conclusion. Mais d'où vient cette éminente prérogative? N'est-ce pas principalement de ce que toutes les notions géométriques, représentables par des caractères, peuvent être peintes aux yeux & à l'imagination? Par là chaque pas du Mathématicien est assuré; ce sont autant de signaux qui le guident, par une route toujours sûre, à travers le vaste champ de ses combinaisons. La Géométrie & l'Analyse sont deux langues dans lesquelles on peut traduire toutes les conceptions abstraites qui concernent la Quantité, & qui de plus ont l'avantage de pouvoir être traduites l'une dans l'autre. Ces langues n'ont point de synonyme, point d'expression vague, aucun des défauts de celles que nous parlons. Si le Mathématicien étoit borné à des conceptions purement intellectuelles, la science seroit encore à naître. Pourquoi a-t-elle plus de clarté, plus d'évidence que le reste de l'Ontologie? C'est précisément parce qu'elle est moins abstraite, ou parce que ses abstractions prennent une forme que l'on peut toucher, voir, imaginer.

Mais on se vante d'avoir des démonstrations en Métaphysique: il y a des philosophes qui vont jusqu'à prétendre que toute la Métaphysique est démontrée, comme le sont les Elémens d'Euclide. Distinguons. La Métaphysique renferme trois sciences analogues à la Physique, & que l'on pourroit nommer la Physique des êtres immatériels: elle en renferme une quatrième analogue aux Mathématiques, & dont nous avons vu que les Mathématiques sont une portion détachée. Dans les Sciences naturelles on démontre quelquefois d'après des hypothèses; mais ces hypothèses, quand elles auroient le plus haut degré de vraisemblance, ne sont point susceptibles de démonstration.





tion. Il en est de même des trois sciences transcendantes qui répondent à la Physique: elles ne sauroient être démontrables à la rigueur, parce que la nature des sujets y répugne.

Mais au moins, dira-t-on, l'évidence de l'Ontologie peut faire face à l'évidence Géométrique. Cela n'est point impossible, & cela se pourra en effet lorsque cette Science sera poussée aussi loin que celle des Quantités, lorsqu'elle aura trouvé le moyen de démêler & de fixer, avec précision, nos idées; ou lorsqu'elle aura inventé cette Caractéristique universelle qui est en Métaphysique ce qu'en Chymie est le grand-oeuvre. Alors elle marchera de pair avec l'altière Géométrie; disons plus, la Géométrie baissera son compas devant elle, & la reconnoîtra pour la Reine des sciences. Mais en sommes nous là? & peut-on s'aveugler au point de le croire?

Je demande, non aux démonstrateurs ivres de leurs systèmes, mais à tous ceux qui les lisent de sang froid, si cette lecture produit en eux la même conviction que celle d'un livre de Géométrie ou d'Algebre. Si vous démontrez comme un Euclide, pourquoi ne me convainquez-vous pas comme un Euclide? En Mathématiques il n'y a qu'une secte, ou plutôt il n'y en a point; mais qui compteroit les sectes & les systèmes philosophiques que la nuit de l'oubli a déjà engloutis? & combien n'en voyons nous pas encore qui subsistent, ou qui sont prêts à subir la même destinée?

Cette affectation de la méthode géométrique a fait un tort infini aux sciences spéculatives: elle a souvent répandu du ridicule sur les vérités les plus respectables. Et en effet un grand nombre de ces preuves démonstratives, ne tirant leur force que du prestige des définitions, ne démontrent que l'orgueilleuse faiblesse de l'entendement humain. On rendroit un service essentiel à la Raison, si l'on pouvoit guérir les philosophes de cette maladie, en leur persuadant qu'il y a infiniment plus de science à savoir ignorer ce qu'on ignore, qu'à savoir le démontrer. Quel est le vrai sage? Cette question a été décidée



cidée sur le trépied de Delphes, & jamais oracle plus sûr n'est sorti de la bouche d'Apollon.

Je crois avoir donné, dans cette discussion, des preuves de mon impartialité. Mais, après tout, si la Métaphysique a ses côtés obscurs; les autres sciences n'ont-elles pas les leurs? La Physique, en rassemblant autour d'elle tout son appareil, peut-elle se vanter d'avoir deviné toutes les énigmes de la Nature? A-t-elle éclairci tous les doutes, expliqué tous les phénomènes? Connoissons-nous, avec une entière certitude, les causes du ressort, de la force magnétique, de la lumière, de l'électricité, de la génération des animaux, le subtil mécanisme des corps organisés, le grand mécanisme de l'univers? En parcourant l'histoire de cette science, on trouve partout des hypothèses détruites par des hypothèses, & souvent des erreurs modernes substituées aux erreurs anciennes. La Géométrie même, qui lui prête son secourable flambeau, la Géométrie dont les progrès ont été si prodigieusement accélérés depuis un siècle, est encore environnée de hauteurs où elle ne sauroit atteindre.

On peut faire ici une remarque très curieuse. Si nous recherchons pourquoi il y a si peu de clarté dans la Métaphysique, il se trouvera que c'est, en grande partie, parce qu'elle remonte aux principes des autres sciences, & que ces principes ne sont pas clairs. Le Géometre & le Physicien, en passant sur les premières notions, se mettent d'abord au large, & laissent le doute & l'obscurité derrière eux. Le premier suppose des points, des lignes, des surfaces, des unités: le second prend les corps pour des êtres étendus, impénétrables, divisibles à l'infini; il parle d'espace, de durée, d'action, de cause, de force, de mouvement. Si l'on met ces idées au creuset de la spéculation, on les trouve remplies de difficultés; mais c'est de quoi il ne s'embarrasse pas. Poussiez-les, de proposition en proposition, jusques aux confins de leurs Sciences: ils seront obligés d'en demeurer là, ou de se sauver dans les bras de la Métaphysique.





Tant que la Géométrie se soutient sur ses propres ailes, c'est un aigle audacieux, qui plane dans le haut des airs, le regard toujours fixé vers le Soleil de l'Evidence. Mais voyez-la dans ces problemes mixtes où, gênée par des matieres hétérogenes, elle n'est pas entièrement à elle-même. Les loix du mouvement sont-elles contingentes ou nécessaires? Est-ce la masse multipliée par la vitesse, ou par le quarré de la vitesse, qui mesure la force motrice? Est-ce la même somme de mouvement, ou la même somme de force vive qui se conserve inaltérable? ou n'est-ce ni l'une ni l'autre? Les plus célèbres Géometres disputent sur ces points: ils ne sont pas plus d'accord sur les principes métaphysiques de cet admirable calcul qui a l'Infini pour objet, quoiqu'ils le soient dans les conséquences. En un mot, tous ces grands esprits, dont les noms seuls sont des éloges, les Newton & les Leibnitz, les Bernoulli & les Euler, dès qu'ils font des excursions dans les Sciences spéculatives, ne voyent pas plus clair que nous: le compas leur tombe des mains, le flambeau d'Uranie cesse d'éclairer leur marche; ils sont réduits, comme nous, à chercher la vérité en tâtonnant, ou à la suivre à la lueur d'un foible crépuscule. „Les „extrémités des Sciences, dit Montaigne, tombent dans l'éblouissement.“

Mais n'y a-t-il donc qu'obscurités dans la Métaphysique? Elle a, sans doute, ses faces lumineuses; il ne s'agit que de les distinguer de celles qui ne le sont pas, & de celles qui renvoient un faux jour. Chaque science a son genre de clarté: la Métaphysique, qui contient éminemment toutes les sciences, en a de tous les genres. C'est un travers de la croire toute démontrable; c'en est un autre de la croire toute incompatible avec l'évidence géométrique; c'en est un plus grand de s'imaginer qu'il n'y a point de certitude sans démonstration. Le vrai philosophe discerne les différens degrés de cette lumière qui brille dans les ténèbres de la Métaphysique; il en recueille les rayons épars, il tâche de la répandre, & de dissiper une partie du brouillard qui en occupe les bords.



Veut-on juger du mérite des sciences d'après la réputation de ceux qui y ont excellé? Tournons les yeux vers ces illustres Méta-physiciens, nos avant-coureurs, & nos modèles. Leurs noms sont placés, dans le temple de la Renommée, parmi les noms les plus distingués. Tous les âges répètent celui d'Aristote: la gloire du maître jette un éclat aussi vif que celle du disciple; l'un s'occupe à dompter le monde, l'autre à l'instruire & à le corriger. Voyez le courageux Des-Cartes, terrassant les erreurs, refondant nos opinions, & donnant, pour ainsi dire, un nouvel être à nos connoissances. Si l'Angleterre s'enorgueillit du Mausolée où repose, parmi les rois & les héros, ce grand homme qui devina le plan du suprême architecte; elle ne se glorifie pas moins de cet excellent philosophe qui développa les premiers ressorts de l'intelligence humaine, & fut le sage précepteur des nations. Par qui notre Académie fut-elle formée? Par ce vaste, profond, & sublime esprit, qui étoit en effet ce qu'il prétend que sont tous les esprits, une concentration, un miroir vivant de l'univers. Son successeur dans cette même Académie, où il étoit si digne de le remplacer, n'a pas cueilli dans les champs de la Métaphysique des lauriers moins beaux que ceux qu'il rapporta des froides & stériles régions du Nord.

Il n'est aucun de ces hommes célèbres qui n'ait vaincu des préjugés, établi des vérités utiles, ouvert de nouvelles routes, ou applani les anciennes. Plusieurs d'entr'eux ont imaginé de brillantes hypothèses, qui ne cedent en rien à celles que la Physique nous étale. Le livre des Méditations, la Recherche de la vérité, l'Essai sur l'entendement humain, les divers ouvrages philosophiques de Leibnitz sont remplis des plus ingénieuses découvertes, non de découvertes amenées par le hasard, mais puisées dans la profondeur du génie.

Après les philosophes du premier rang paroissent, avec honneur, ceux qui nourris de leurs leçons, animés par leur exemple, ont commenté, affermi, appliqué, étendu leurs doctrines, & ceux qui avec une noble audace ont osé s'en écarter, & se frayer des sentiers jusque-



jusque-là inconnus. Par cette fermentation des esprits, les découvertes se sont accumulées, les vérités se sont enchainées les unes aux autres, la masse de lumière s'est accrue, le jour a pénétré dans les régions sombres de la Métaphysique, & si la raison humaine n'a pu tout éclaircir, elle a du moins appris à connoître sa portée & ses limites.

C'est ainsi que Platon sortit de l'école de Socrate, qu'Aristote peupla de sa Secte la Grece, l'Italie, & l'Europe entiere, que Malebranche marcha sur les traces de Des-Cartes, & Wolff sur celles de Leibnitz. C'est ainsi que Locke donna le ton à la philosophie Angloise, qui semble être devenue la philosophie de l'Europe. Il posa le premier ces fondemens solides sur lesquels on a bâti depuis tant de théories diverses, mais dont la diversité a le mérite de nous présenter les matieres abstraites sous tous les points de vûe dont elles sont susceptibles. C'est en partant des principes mêmes de Locke que l'Evêque de Cloyne, ce hardi destructeur des corps & de la matiere, déploya cette force de raisonnement qui étonne ceux-même qu'elle ne persuade pas. C'est encore à ces principes que notre siecle doit une connoissance plus exacte de l'homme, l'anatomie de ses facultés, tant de beaux ouvrages où tous les actes de l'ame sont réduits à un seul acte, ces Pygmalions nouveaux qui, en animant la statue humaine, ont dressé des statues à la Métaphysique.

Où est la science que la Métaphysique n'ait enrichie & fertilisée? car ce n'est pas seulement sur ses propres progrès qu'il faut la juger; il est juste de lui tenir compte de cet esprit philosophique qu'elle a répandu dans toutes les recherches de l'esprit humain, dans la Littérature, dans la Morale, dans la Politique, & jusques dans la vie commune. Si ce siecle est moins superstitieux, plus éclairé, plus philosophe que les siècles précédens; c'est à elle principalement qu'on en est redevable.

Et que fait-on ce qu'elle pourra devenir un jour? Si pendant des siècles entiers elle a fait peu de chemin, c'est que la tâche est grande,



grande, & les obstacles sans nombre. Elle nous est parvenue hérissée de ronces & d'épines: il a fallu la tirer de la fange de ces tems ténébreux où le jargon le plus absurde tenoit lieu de science, où l'on expliquoit le langage de l'Ecriture même par le langage des Sophistes, où soutenues par le pouvoir ecclésiastique, l'ignorance & la superstition, fille de l'ignorance, dominoient sur l'esprit crédule des peuples. Que ne souffrit point Des-Cartes, lorsqu'il osa lever la bannière contre le fantôme de l'Ecole? C'est dans ce triste état que les sciences spéculatives sont arrivées jusqu'à nous. Mais un nouveau jour s'est levé sur elles: la Théologie moderne est moins impérieuse, parce qu'elle est plus pure: la Métaphysique jouit d'une pleine liberté sous des Souverains qui la protègent, & dans des Sociétés savantes qui se sont ouvertes pour l'accueillir. Il seroit étonnant qu'elle ne profitât pas de la réunion de tant de conjectures qui la favorisent.

Le dirai-je? Si cette science n'a pas encore tous les succès qu'elle pourroit avoir; si elle n'est pas considérée, comme elle devrait l'être; s'il reste contre elle des impressions fâcheuses; c'est moins à elle qu'à ceux qui la cultivent qu'il faut s'en prendre.

N'est-il pas singulier que des études qui semblent toutes faites pour humilier l'esprit humain, lui inspirent de la suffisance, de l'orgueil, de la dureté? Si le sentiment de notre perfection peut nous enfler, le sentiment contraire, que l'étude réfléchie des premiers élémens de nos connoissances fait naître sans cesse, ne devoit-il pas abattre les fumées de l'amour propre, & nous rendre modestes? Quel est donc le vice caché qui étouffe ce fruit salutaire de la Philosophie? Quel est ce germe corrompu & corrupteur qui infecte l'esprit du Métaphysicien au point de lui faire prendre sa foiblesse pour de la force, son ignorance pour du savoir, ses ténèbres pour de la lumière?

En initiant les jeunes gens dans les spéculations métaphysiques, on commence par les jeter dans un système. Cette méthode, si l'on n'en use avec prudence, peut entraîner des suites pernicieuses. Dans



un certain âge, l'esprit se prend à tous les points d'appui qu'on lui présente, & qui dès-lors, en soulageant sa paresse, fixent sa vûe, captivent son jugement, rétrécissent sa conception. Lorsqu'une fois il a pris son pli, ses pensées, ne sauroient plus, pour ainsi dire, couler que dans le même sens: il a perdu sa liberté, il a quitté les sentiers de la Nature, il est devenu roide, opiniâtre, hautain. Bientôt, identifié avec ses dogmes, ce fier esclave appétantira ses chaînes sur tous les hommes libres, qui refuseront d'être esclaves comme lui.

Un jeune homme qui vient de faire son cours, & qui a transporté sur ses cahiers les opinions de son maître, croit posséder la sagesse universelle. Ce n'est que d'après ces feuilles de la Sybille qu'il juge du vrai & du faux: les sentimens des autres philosophes ne lui sont connus que par d'infidèles rapports: il a appris à mépriser les plus grands hommes, avant d'être digne de les lire. Devenu maître à son tour, il devient, à son tour, le fléau de la Raison. C'est ainsi que le mal se perpétue; & voilà pourquoi il y a tant de Docteurs, & si peu de philosophes.

C'est peut-être une témérité excessive à l'homme que de fabriquer des systèmes. Atomes dans l'immense cité de l'univers, notre sphere n'est qu'un point; & nous voulons tout soumettre à l'empire de nos idées. Je connois cependant le respect dû aux génies créateurs qui ont proposé ces grandes vûes, compassé ces vastes plans. Quand leurs systèmes ne seroient que de belles tentatives, ils mériteroient, à ce seul titre, toute notre admiration. Ces grands hommes en ont, sans doute, connu le foible comme le fort; ce sont des hommes médiocres qui leur ont attribué une infailibilité où ils ne prétendoient pas. Si dans le champ de la Philosophie on voit, de loin à loin, quelques cedres majestueusement élevés; combien n'y trouve-t-on point de plantes parasites, qui n'ayant pas de quoi végéter par elles-mêmes, se nourrissent d'une sève étrangère. Quelquefois des hommes illustres ont laissé tomber un rayon propice sur leurs disciples & leurs commentateurs: de là cet empressement à s'envelopper





per dans leur réputation: de là tant de corps opaques qui tournent autour de ces grands astres, pour en être illuminés.

La Métaphysique, cette science qui semble prêter si peu à l'imagination, est peut-être de toutes les sciences la plus fertile en enthousiastes. Quels hommages les anciens philosophes ne rendirent-ils point à leurs chefs? Des statues, des trônes, & des autels leur paroissent trop peu de chose pour les récompenser. Sous le règne de l'Ecole il suffisoit d'avoir inventé un sophisme pour s'entendre appeler Docteur invincible, sublime, angélique, source de vie, lumière du monde. Ce n'est que depuis peu que cet enthousiasme commence à passer: nous avons vu encore des chefs de secte, semblables à des rois puissans entourés d'un peuple d'adorateurs. Il est, à la vérité, de jour en jour plus difficile de monter à ce haut rang. Les premières places sont prises: il ne reste à occuper que les places subalternes; & ici l'on étouffe dans la foule des prétendans.

Ce zèle pour des opinions, & pour des autorités, que l'éducation systématique inspire, remplit, pour l'ordinaire, l'esprit de fiel, & d'aigreur, & allume le tison de la Discorde. Comment un homme qui toute sa vie n'a fait que démontrer, & qui n'a jamais su douter, souffrira-t-il qu'on le contredise, ou qu'on balance à adopter ses assertions? Quelque système que vous embrassiez, vous avez pour ennemis tous ceux qui suivent d'autres étendards; & si vous n'en embrassez aucun, les forces réunies de tous les systèmes vont fondre sur vous. Où sommes-nous? Dans une république de Sages, dont les lettres épurent & adoucissent les mœurs? ou dans une anarchie de sauvages, dans un état de guerre de tous contre tous? Je ne reconnois plus ces Divinités assemblées pour peser la Nature & les destins; je ne vois que ces Dieux soldats qui pêle-mêle avec les hommes se battent autour des murs de Troye. Le nom sacré de la Vérité est, dans leur bouche profane, le signal du combat; les invectives sont les armes des combattans.



N'est-ce pas une chose déplorable que ce qui devrait réunir les hommes, soit précisément ce qui en fait d'irréconciliables ennemis ? Les sciences en font une preuve, la Religion en est une autre, & je tranche le mot, elles sont comprises toutes deux dans la Métaphysique.

Toutes les disputes de Religion ont été, à proprement parler, des disputes de Métaphysique, & les Métaphysiciens scholastiques sont la cause principale de tous les maux que cette fille du Ciel a occasionnés sur la terre. Pourquoi ces Conciles, ces guerres, ces persécutions, ces fleuves de sang qui ont coulé dans le monde Chrétien ? Ce n'étoit assurément pas pour établir la morale de l'Evangile, cette morale qui nous ordonne d'aimer jusqu'à nos ennemis. Quels furent donc les sujets de ces fameuses querelles ? L'essence divine, les Décrets éternels, la nature du corps & celle de l'ame, la personnalité, l'état après la mort. Et qu'est-ce là autre chose que de la Métaphysique ? C'est pour de pareilles questions que les princes & les peuples, échauffés par des docteurs à systèmes, ont exposé leur sceptre, leur fortune, & leur vie ; questions où souvent ni les princes, ni les peuples, ni les docteurs ne comprenoient rien.

S'en fallut-il beaucoup, dans le douzième siècle, & dans les siècles suivans, que pour un sujet bien moins intéressant on ne vît les mêmes scènes ? On avoit déjà substitué les voyes de fait aux argumens : des gladiateurs métaphysiciens étoient descendus dans l'arène : Louis XI. avoit pris part à ces démêlés. Un grain de fanatisme de plus, & la mémorable dispute sur les *Universaux* mettoit l'Europe en combustion.

Si aujourd'hui le vernis des bienfaisances farde les passions, & déguise les inimitiés ; ce n'est pas que beaucoup de prétendus philosophes ne vivent encore avec plaisir la terre armée pour défendre les songes creux qu'ils ont enfantés dans la poussière de leur cabinet. Il est des occasions où l'on voit assez quel esprit les anime, & à quels excès ils se





se porteroient, si la sagesse du Législateur n'avoit pris soin de réprimer leurs faillies, ou de les confiner entre les murs des écoles.

N'en doutons point, l'étude de la Métaphysique, mal dirigée, peut se convertir en poison. Ce n'est pas assez qu'elle nous renplisse de préjugés savans, pires que les préjugés populaires; elle ajoute les vices du coeur aux erreurs de l'esprit. Mais le vrai philosophe évite ces écueils. Il vogue tranquillement sur cette mer orageuse. Il voit, d'un oeil indifférent, naître & mourir les opinions. Il prend le vrai & le bon par tout où il le trouve; les grands noms, les partis puissans ne lui imposent jamais au point de lui faire digérer le faux & le chimérique. Toujours libre, toujours maître de lui-même, humain, équitable, ami de la paix & de la vertu, les Sciences transcendantes embellissent son caractère, au lieu de le corrompre. Dans cette parfaite égalité d'ame qui fait la récompense & le triomphe du Sage, il goûte, tour à tour, les douceurs de la vie sociale, & les agrémens de la vie contemplative.

C'est de ces agrémens qu'il me reste à parler. On les croit incompatibles avec des études aussi seches; & c'est un des grands préjugés contre la Métaphysique. Une science aussi mélancolique, dit-on, n'est point faite pour ce siècle. Il faut abandonner ces spéculations austères & arides aux esprits noirs & atrabilaires, qui fuyent la Société, abhorrent les plaisirs de la vie, & ne trouvent de satisfaction qu'à se concentrer en eux-mêmes, & qu'à vivre de leur propre substance.

Je crains presque d'abaisser la dignité de la Métaphysique, en entreprenant de la disculper de ce reproche. Qu'importe qu'elle soit dénuée d'attraits; pourvu qu'elle soit solide, utile, digne d'occuper une ame raisonnable? Elle ne flatte ni les sens, ni l'imagination. Mais l'homme n'est-il donc fait que pour sentir & pour imaginer.



Et qu'est-ce après tout que ce Beau dont le siècle est idolâtre? Ce ne sont, pour la plupart, que des ornemens faux & recherchés, que la vraie science dédaigne, que souvent on n'achète qu'aux dépens de la justesse, de la précision, de la vérité même, & qui toujours font perdre en profondeur plus qu'on ne gagne en surface. Ce n'est pas assurément par cette voye que se font acquises les réputations illustres. Ces éclairs dont le vulgaire est ébloui, ne sont faits que pour briller & disparaître: la durée de ces frivolités est attachée au ton éphémère qui les met en vogue. Les grands noms passent par-dessus ces futiles écrivains, & vont triomphans à la postérité.

Quand la Métaphysique ne seroit pas susceptible d'agrémens apprêtés, s'ensuivroit-il qu'elle n'eût rien de satisfaisant elle-même? L'exercice de nos facultés, l'essai des forces de notre esprit, la découverte de la vérité, ne sont-ce donc pas là des plaisirs? C'en sont, & de très solides sans doute; mais incorporés, pour ainsi parler, dans la Science, on ne les en tire que par l'application & le travail. Placés, comme la Vertu, sur le sommet d'une montagne escarpée, ce n'est qu'à force de fatigue qu'on en obtient la jouissance.

Voyons cependant si les Sciences spéculatives n'offrent point de plaisirs qui se rapprochent d'avantage de la portée commune. Cette diversité même de sentimens, ce flux & reflux d'opinions, inconvéniens à certains égards, ne forment-ils pas, à d'autres égards, un spectacle des plus agréables? Ces dogmes, ces hypothèses, ces théories différentes, en passant successivement sous nos yeux, nous surprennent par leur nouveauté, nous amusent par leur contraste, nous piquent par leur singularité. C'est une vaste galerie, qui s'étend d'Orient en Occident, du Midi au Septentrion. Tantôt notre esprit se plaît à suivre l'ordonnance de ses tableaux, tantôt il aime à s'égarer dans leur variété. Et que pourroit-il y avoir pour lui de plus intéressant? C'est sa propre histoire; c'est le fidelle  
mi-



miroir où il peut contempler sa petitesse & sa grandeur, son élévation & ses chûtes.

Mais enfin, la Métaphysique a vû, plus d'une fois, ses déserts, cultivés par d'habiles mains, se transformer en de riantes contrées. Athènes & Rome nous ont laissé dans ce genre, comme dans tous les autres, des modèles applaudis, & ces modèles ont trouvé des imitateurs. Dans la grande abondance des exemples, je n'en choisirai que quelques-uns des plus frappans.

Le dialecte le plus gracieux de la plus belle des langues déploye toute son élégance dans les écrits de Platon. Son style est plutôt d'un poëte que d'un philosophe. C'est véritablement l'abeille Attique, & le miel qu'elle distille est extrait de l'élite des fleurs qui croissent sur l'Hélicon.

Toutes les Muses semblent inspirer le chantre d'Epicure. Son style pompeux, le charme de ses vers lui font presque pardonner le faux de ces raisonnemens. Quelle force, quelle noblesse dans sa diction, quel sel dans ses ironies, quelle vérité, quel coloris dans ses peintures! On revoit toujours avec un nouveau plaisir ces admirables morceaux qu'il entrelace, avec tant d'art, dans la philosophie du Vuide & des Atomes. Ici c'est la mere d'Enée qui répand la fécondité dans le sein des élémens. Là c'est l'apothéose de ce fameux mortel qui arracha le trident à Neptune, & la foudre à Jupiter. Plus loin c'est la vie bienheureuse des oisifs habitans de l'Olympe. Des descriptions magnifiques, des réflexions ingénieuses, des beautés de toute espèce sortent, à la voix de cet enchanteur, d'un fond qui paroît si ingrat.

Après avoir vu l'Orateur Romain protéger le citoyen, foudroyer les Catilina & les Antoine, on aime à le retrouver dans les campagnes fortunées de Cume & de Tusculum, qui se changent, tour à tour, en Lycée, en Portique, en Académie, &  
dans



dans les jardins du philosophe de Garguette. Dans le Sénat, à la Tribune, Cicéron est un torrent impétueux, qui entraîne tout dans sa course rapide; ici c'est un doux ruisseau, qui roule, dans ses ondes paisibles, l'or le plus pur de la docte Antiquité. Tantôt il se promène par toutes les sectes, en saisit l'esprit, & n'en épouse aucune; tantôt il parle au coeur, rend la vertu aimable, rajeunit la vieillesse, divinise l'amitié. Les soucis rongeurs viennent-ils troubler ses méditations? Lui échappe-t-il quelque soupir pour son ingrate partie? Un songe sublime le transporte dans cette république céleste où le grand Scipion, & tous les Demi-dieux de Rome entendent l'harmonie des Sphères, & contemplent, dans l'ordre immuable des choses, la sagesse de l'esprit universel.

Dans les ouvrages de Sénèque, le philosophe, l'orateur, le courtisan se disputent la palme. Il est vrai que son style, hérissé de pointes & d'antithèses, se ressent déjà de la corruption du goût, & de la décadence des Lettres. Mais ces fautes ne sont-elles pas ce que l'on nomme de l'esprit?

Je passe sur plusieurs anciens qui mériteroient d'être cités avec distinction; sur Pline, Plutarque, Lucien, Sextus, Maxime de Tyr, Marc Aurele, sur les philosophes de l'Ecole Eclectique, sur tous ces Métaphysiciens lettrés que l'Eglise a nourris dans son sein, & qui ne dédaignèrent pas de mêler l'érudition profane à tout ce que la Philosophie a de plus profond, la Religion de plus vénérable.

Si de là nous nous transportons à la renaissance de Lettres, qui précéda de beaucoup la naissance de la vraie Philosophie, nous verrons que cette dernière, avant même d'être sortie du berceau, enfanta déjà de très beaux écrivains, & dont la lecture est délicieuse pour les agrémens du style autant que pour le fond des choses. Je n'en veux pour preuve qu'Erasme & Bacon, qui ont  
tous



rous deux préparé la grande révolution de l'esprit humain, l'un en aiguillant les traits de la Satyre contre la barbare Ecole, l'autre en faisant briller l'aurore de toutes les sciences au milieu de la nuit qui les couvroit. Noms à jamais révéérés & chéris, Hercules Libérateurs, que ne leur doivent point la Raison, dont ils ont vangé les droits, les Sciences, qu'ils commencèrent à épurer & à ennobler, le genre humain qui jouit de leurs bienfaits!

A mesure que j'approche de nos tems, quel beau spectacle se présente à ma vue! Je vois partout les nourrissons de la Philosophie s'abreuver dans les eaux d'Hippocrène, & les nourrissons des Muses puiser leurs regles dans les Sciences abstraites, l'érudition assaisonnée de l'esprit philosophique, les spéculations parées par les mains des Graces. Parcourrai-je la liste de tous ces beaux-esprits philosophes dont les uns illustrent le siecle passé, & les autres font la gloire & les délices du nôtre? Peindrai-je l'éloquente subtilité de Huet, le brillant enthousiasme de Malebranche, le séduisant Pyrrhonisme de Bayle, l'énergie & le feu du Lord Shaftesbury, soit qu'il se perde avec Platon dans les nues, soit que monté sur le ton ironique il essaye la Vérité sur la pierre de touche du Ridicule? Parlerai-je du poëme métaphysique de Pope, ou de l'immortelle Théodicée, ou de tant de chef-d'oeuvres de nos philosophes modernes, trop connus & trop admirés pour avoir besoin de mes louanges? Que de grands noms la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne ne me fourniroient-elles pas? J'y aperçois de nouveaux Platons, des Cicérons, des Lucreces, des Plines. C'est à notre siecle que la postérité devra l'édifice immense de l'Encyclopédie; ouvrage vraiment métaphysique, parce que toutes les connoissances humaines y sont ramenées à leurs premiers principes; ouvrage élégant, parce qu'il a la sorte d'élégance, la noble & décente parure qui seule lui convient.



J'aurois pû, sans sortir du lieu où j'ai l'honneur de parler, trouver des preuves vivantes de tout ce que j'ai dit à l'avantage de la Métaphysique. C'est par vos soins, Messieurs, qu'elle poussera ses rameaux féconds dans l'avenir. Pour achever son éloge, je n'aurois qu'à la montrer dans ce sanctuaire des Muses, placée au foyer commun des Sciences & des Lettres, échauffée par cette lumière biansaisante qui environne le trône de FÉDÉRIC. Quels sont les succès où nous ne puissions aspirer sous de si glorieux auspices? Son regne n'est-il pas fait pour élever tous les esprits, & pour porter tout à la perfection?







D E  
**L' E N E R G I E**  
 DANS LES OUVRAGES DES BEAUX-ARTS.  
 PAR M. S U L Z E R.

---

**P**our bien déterminer le sujet de ce Mémoire, je dois commencer par quelques observations préliminaires sur le but & le premier principe des Beaux-arts. On dit ordinairement que le but de ces arts est de plaire; d'amuser avec esprit; de toucher agréablement: que le premier principe est l'imitation de la belle nature. Pour moi, je pense que c'est dégrader les Beaux-arts que de n'y reconnoître d'autre but, que celui de plaire; & le principe de l'imitation me paroît aussi gratuit dans son origine que stérile dans son application.

Si l'on veut ôter les Beaux-arts de la classe des choses frivoles & les lier au système général des inventions utiles, il faut leur fixer un autre but; & si l'on veut être vraiment utile aux artistes, il faut leur donner un autre principe pour guide. J'envisage les Beaux-arts d'une façon qui me les fait voir dans toute leur dignité.

Je ne vois en général que trois grands objets qui renferment tout ce qu'il y a d'utile dans les institutions humaines: ce sont la Politique, la Philosophie & les Beaux-arts, tous les trois également nécessaires au bonheur. Si l'homme doit parvenir au degré de bonheur dont il est capable, il lui faut trois choses. Des arrangemens qui lui assurent la possession & la jouissance paisible de tout ce qui appartient à

O o o 2

les

\*) Je suis obligé, faute d'autre terme, de me servir de ce mot pour exprimer en général certaine force supérieure, non seulement dans la parole, mais dans tout autre objet de goût, ou ce qu'*Horace* appelle *acer spiritus & vis in verbis & rebus*. (Serm. l. 4.)





ses besoins physiques; des connoissances & des lumieres qui l'éclairent sur les besoins moraux, sur le degré de bonheur dont il est susceptible & sur la route qui y conduit; enfin des dispositions pour profiter de ces lumieres, & les forces pour en agir en conséquence. La Politique pourvoit au premier de ces besoins, la Philosophie au second, & les Beaux-arts au troisieme. C'est à eux d'imprimer à l'esprit les lumieres de la Philosophie avec une force que la vérité nue n'a jamais; c'est à eux de s'emparer de l'imagination & du coeur de l'homme, pour les diriger vers le grand but fixé par la philosophie. Voilà le véritable emploi que l'artiste doit faire de ses talens.

De là résulte le premier principe des Beaux-arts, ou le précepte fondamental qui renferme tout ce que l'artiste doit faire pour réussir. Qu'il choisisse un objet utile, qu'il le rende avec toute la force & toute l'énergie dont il est susceptible afin qu'il produise un effet permanent sur l'esprit & le coeur de l'homme: ou en deux mots; que l'artiste donne toute l'énergie possible à un objet utile.

A'envifager les choses de cette façon, ce que je nomme énergie devient une notion fondamentale dans la Théorie des Beaux-arts, & elle mérite d'être bien développée. C'est-ce que je me propose de faire ici.

Dans le dernier Mémoire que j'ai eu l'honneur de lire à l'Académie, j'ai fait voir, que l'ame, toutes les fois qu'elle se livre aux impressions que font sur elle les objets, entre dans un des trois états que j'ai nommés *état de méditation*, *état de contemplation*, & *état d'émotion*. C'est la perfection que nous découvrons dans les objets qui nous engage dans la méditation; la beauté nous entraîne dans la contemplation, & l'énergie produit l'émotion. Si nous pouvons découvrir les causes de l'émotion, nous connoissons par là les divers genres de l'énergie.

Les recherches que j'ai faites sur ce sujet, m'ont fait connoître trois causes de l'émotion. La premiere est l'interruption subite du  
cours



cours de nos perceptions; la seconde une nouvelle force que reçoivent nos perceptions actuelles, & la troisième une irritation sensible qui vient d'un objet qui se rapporte immédiatement à nos sentimens & à nos passions. J'ignore s'il y en a encore d'autres.

Je dis que la première cause de l'émotion est l'interruption subite du cours de nos perceptions. Pour bien connoître cette cause, il faut se rappeler ces heureux momens où l'âme, livrée à une douce distraction, produit sans gêne & sans effort une suite d'idées amusantes. Semblable dans cet état à une rivière dont les eaux coulent insensiblement, elle ne sent pas sa propre activité; elle s'oublie elle-même en donnant toute son attention au tableau varié que forme la suite de ses perceptions. Ordinairement cet état n'est pas de longue durée, la plus petite cause dissipe la douce illusion. Alors l'âme rappelle ses yeux du tableau pour les diriger sur elle-même, sur son état, sur sa façon d'exister dans le moment présent. Ce changement est toujours accompagné de quelque saisissement qui produit de l'émotion. Un homme accablé de chagrins, a quelque fois le bonheur de les oublier pour quelques momens, & de se distraire par un objet amusant: cependant une idée relative à ses chagrins se présente; cette heureuse distraction cesse subitement, il est réveillé comme en sursaut, il rentre en lui-même, & tous ses chagrins reparoissent. C'est ainsi qu'il nous arrive assez souvent d'oublier en quelque façon notre existence & notre personnalité, lorsque tout d'un coup une perception particulière nous réveille, nous fait penser à nous mêmes & à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce changement subit ne peut arriver sans quelque émotion. Voilà comment l'émotion peut être produite par l'interruption subite du cours de nos perceptions. Les causes qui produisent cette interruption, constituent la première classe des objets énergiques.

Je range dans cette classe les objets qui frappent ou par leur nouveauté, ou par leur singularité, ou par le surprenant, ou par le merveilleux qu'on y découvre. On voit très souvent qu'un objet

O o o 3

fort



fort indifférent, privé de toute énergie devient remarquable par accident. La chose la plus indifférente qui arrive contre notre attente, surprend agréablement; ou désagréablement selon les circonstances. Il y a même des causes négatives, qui surprennent. On a observé que ceux qui sont accoutumés à dormir sous un grand bruit sont réveillés dès qu'il cesse.

Difons donc que tout ce qui est nouveau, inattendu, extraordinaire, merveilleux, ce qui interrompt l'uniformité, ce qui relève l'attention, appartient à ce genre d'énergie. Dans l'art de la parole le ton de voix hauffé ou baiffé à propos, une tranfition inattendue, une phrase d'une construction, qui quoique fort bonne n'est pas trop ordinaire, des expreffions neuves, des tours frappans & quantité d'autres petits artifices employés à propos, donnent au ftyle l'énergie dont il s'agit ici. Dans la Musique on obtient ce genre d'énergie par les *piano* & les *forté*, par les grands intervalles, par des pauses, par des changemens du mode, par une harmonie neuve ou finguliere, par des *uniffons*, par des progressions par octaves & par nombre d'autres moyens qui relevent de tems en tems le ton dominant de la piece.

Ce genre d'énergie est le moins important de tous; car il n'aboutit qu'à donner à un ouvrage ce gout piquant qui le rend agréable ou amusant, quel que soit d'ailleurs le mérite de la matiere; son effet est tranfitoire, il n'opere rien de permanent dans l'ame, rien qui tende à la perfectionner. Un ouvrage qui n'a d'autre mérite que celui que peut donner ce genre d'énergie, peut être très amusant, mais il n'atteint pas au grand but des Beaux-arts. C'est le cas de tous les ouvrages qui ne font qu'amusans; ils peuvent être excellens dans leur genre mais ce genre est le moindre de tous.

Cependant ce genre d'énergie peut être très utilement employé, & devenir même très nécessaire. Toutes les fois que la matiere que l'artiste traite est bien importante, il faut qu'il lui donne tous les attraits poffibles, afin qu'elle fasse une plus grande impression; & qu'il



qu'il employe tous les ressorts de l'art, pour renouvelier l'attention dans les endroits les plus essentiels. L'Odyssée d'Homere est un modele dans ce genre. Il y a de l'énergie d'un genre relevé renfermé dans le caractère & dans l'entreprise d'Ulysse; presque-tout le reste de ce singulier poëme roule sur des aventures surprenantes & merveilleuses, qui, en donnant des attraits au poëme en général, sont avantageuses à la matiere principale. C'est par un employ sage & utile de ce genre d'énergie que l'artiste devient imitateur de la nature, qui attache presque toujours un agrément accidentel aux choses utiles.

Je viens au genre d'énergie qui est la seconde cause de l'émotion. Ce genre tire son origine de la force supérieure d'une qualité agréable ou désagréable par sa nature, qui pourtant, sans ce secours extraordinaire, seroit sans énergie sensible. Ce que j'ai à dire pour expliquer l'effet de ce genre étant relatif à *l'état de contemplation*, il est à propos de donner ici une idée de cet état. Au premier moment qu'une scene d'objets agréables s'ouvre devant nous, l'ame se sent émue par sa beauté; bientôt elle se livre à la contemplation des divers objets qui se présentent sur la scene. A' la premiere émotion succede peu à peu une tranquillité parfaite mêlée de sérénité, ensuite une agréable langueur, un état qui plait, que l'on voudroit voir permanent, quoiqu'il n'ait plus rien de piquant; l'ame ne se rend plus compte de ce qu'elle sent; elle ne prend plus d'effort pour sentir vivement. Cependant, lorsque dans cer état l'oeil découvre un objet qui se distingue des autres par quelque beauté supérieure, l'ame reprend tout d'un coup sa premiere vivacité; ce qui plaisoit simplement commence à charmer & à émouvoir. Voilà le passage de l'état de contemplation à celui d'émotion, & voilà un genre d'énergie qui résulte d'une perfection supérieure.

Dans les objets donc qui, par leur nature, nous sont agréables, comme le régulier, le beau & le vrai, il faut distinguer cette premiere qualité, qui ne produit que le contentement de l'autre qui émeut. On comprendra mieux ce que je veux dire, après qu'on aura observé, que



que ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est clair plaît simplement, & que ce qui est supérieurement vrai, ou beau, ou clair charme & ravit. Nous approuvons un mot ou une phrase qui exprime assez bien ce qu'elle doit exprimer, mais ces mots tranchans qu'on n'oublie jamais, ces expressions brillantes qui donnent la vie aux objets qu'elles peignent, nous ravissent. Nous nous contentons de rejeter simplement ce qui nous paroît faux, pendant que nous nous fâchons ou que nous rions, de ce qui est absurde. Nous détournons l'oeil de ce qui, n'étant pas beau, nous déplaît, mais une grande difformité nous cause quelquefois de l'horreur. Tel tableau qui imite assez bien les couleurs & le ton de la nature nous plaît par son coloris, mais nous sommes frappés d'étonnement en voyant les meilleurs païfages de *Rembrandt*, qui semblent nous transporter dans les lieux-mêmes qu'ils représentent; nous sentons dans les organes du corps la fraîcheur des ombres.

Observons donc en général, qu'il y a une façon supérieure de frapper l'imagination par des objets sensibles. Elle est propre aux plus grands artistes, & cause une espece de sensation dans les organes, fort analogue à celle que produiroient les objets mêmes. Tels sont plusieurs tableaux d'*Homere*. Ici l'oeil est ébloui de l'éclat des armes, là nous entendons le bruit qu'elles font lorsque le heros tombe. Toute perfection d'un degré considérablement supérieur à celui auquel nous sommes accoutumés, doit produire un pareil effet, soit que nous la trouvions dans la Nature, soit qu'on nous la présente dans les ouvrages des Beaux-arts.

J'ai déjà remarqué que les objets auxquels l'artiste peut donner cette espece d'énergie, sont ceux qui par leur nature sont agréables à l'esprit & à l'imagination, & qui par conséquent ont déjà quelque perfection ou beauté naturelle. La matiere mérite que nous entrions là dessus dans quelque détail. Les objets relatifs à l'esprit, que l'on comprend ordinairement sous la dénomination générale de pensées, sont susceptibles de plusieurs especes de perfections. Une pensée peut





peut avoir de la perfection relativement à la vérité, à la clarté, à la naïveté, à la simplicité, à la force, à la brièveté, à la richesse &c. Dans les objets relatifs à l'imagination dont la perfection est désignée sous le nom de Beauté, il peut y avoir de la vérité dans l'imitation d'un objet sensible, de la justesse & de la richesse dans les images & dans les comparaisons & dans les tableaux, de la régularité, de l'ordre & de l'harmonie dans l'arrangement des parties, de la beauté & de la grace dans les formes.

L'artiste qui ne donneroit à son ouvrage qu'un degré ordinaire de ces perfections, auroit fait un ouvrage agréable, auquel manqueroit pourtant la vraie énergie; il pourroit amuser, mais il ne frapperoit pas fortement. Veut-il atteindre au grand but des Beaux arts? qu'il y ajoute la vraie énergie. L'orateur ou le poëte peu content d'avoir dit des choses vraies & agréables, doit faire son possible pour donner aux endroits importants de son ouvrage cette supériorité de perfection qui seule peut faire des impressions ineffaçables.

Ce genre d'énergie est d'une grande importance, & il produit des effets précieux sur l'esprit. Comme il consiste en général dans une perfection supérieure à la façon de concevoir & d'imaginer qui nous est familière, l'étude de pareils ouvrages doit nécessairement perfectionner l'esprit & l'imagination. D'abord nous sommes frappés des beautés que l'artiste a su nous présenter; ensuite nous considérons plus attentivement l'objet qui a produit cette surprise mêlée d'admiration; nous travaillons à concevoir ce degré de perfection, que nous venons d'admirer; nous nous efforçons à nous approprier une perception aussi parfaite, & nous y réussissons. Degourés ensuite de tout ce qui est médiocre, nous cherchons toujours le plus parfait. Voilà donc la faculté représentative *cultivée* par les Beaux-arts. Remarquons à cette occasion, que ces heureuses révolutions, commencées il y a trois siècles, qui devinrent si avantageuses aux mœurs, aux progrès de la raison, aux sciences & à la religion, sont une belle preuve de ce que je viens de dire. Ce n'est pas



aux Grecs, chassés de Constantinople, que nous devons le rétablissement des lettres; ni aux *Medicis* que nous devons les arts, ni aux *Calvins*, ou aux *Luthers*, qu'une partie de l'Europe doit sa liberté spirituelle. Ce sont les *Platons*, les *Xenophons*, les *Demosthenes*, les *Cicérons*, les *Phidias*, les *Polycletes*, qui ont opéré ces heureux changemens. C'est aux perfections supérieures qui brillent dans leurs ouvrages qu'on doit le génie d'un Erasme, d'un Calvin, d'un Raphaël, & de tous ces grands hommes qui acheveront cette heureuse révolution. Voilà quel effet peuvent produire les ouvrages des Beaux-arts s'ils brillent par ce second genre d'énergie.

Ce n'est pas le tout encore. Outre cet effort général que l'esprit prend par l'étude des meilleurs ouvrages de goût, on en tire encore des avantages particuliers. Commençons à la considérer dans les objets relatifs à l'esprit ou à l'entendement. Ces objets tendent à nous éclairer & à augmenter nos connoissances. C'est au philosophe de tirer les vérités de la carrière immense ouverte à l'esprit, & c'est encore à lui à les apprécier; mais c'est à l'homme de goût, à l'artiste, de les présenter dans tout leur jour, de leur donner de la matière. Le philosophe les rend intelligibles, l'orateur les rend sensibles, & sans les ôter à l'entendement, il les fait passer dans l'imagination & dans le cœur, en les liant aux différens ressorts de l'ame. C'est par là qu'elles deviennent vraiment utiles. Le Philosophe nous démontre qu'il faut être juste & révérer la divinité. Nous ne pouvons pas refuser notre approbation à cette vérité qu'il démontre clairement. Cependant, comme elle ne se lie qu'à l'entendement, elle ne nous frappe pas, nous ne sommes pas même sûrs qu'elle nous soit bien présente dans l'occasion où elle devrait influer sur nos actions, cette vérité si importante devient presque inutile. Le poëte s'y prend d'une autre façon, il représente à votre imagination les suites affreuses de l'injustice & de l'irrégion par des tableaux sensibles & ineffaçables à cause de leur grande vivacité. Après avoir frappé l'imagination, il s'adresse à l'esprit





l'esprit & lui présente la vérité moyennant cette expression frappante, qui est comme l'épigraphe du tableau.

*Dis-ite justitiam, moniti, nec temnere Divos!*

Voilà de l'énergie que l'artiste seul peut donner aux vérités de spéculation.

Il seroit hors de propos d'entrer ici dans un plus grand détail sur les divers moyens dont les orateurs & les poètes peuvent se servir pour donner la plus grande énergie aux pensées, soit du côté de la vérité, ou de la clarté, ou de la naïveté &c. soit par le moyen des images, ou des tours heureux. J'ajoute une seule remarque à cet article. Il y a un nombre de vérités qui devroient servir aux hommes de principes de conduite. Or il ne suffit pas de s'être une fois convaincu de ces vérités, il faut les voir dans toute la clarté possible, les avoir toujours présentes à l'esprit, ou les lui rendre si familières, qu'on soit sûr de se les rappeler d'une manière convaincante, dans les occasions où elles peuvent servir. C'est ce que nos ancêtres ont eu en vue, par rapport à ces vérités qu'ils ont proposées en proverbes. L'entendement ne fournit aucune force active à l'ame: il faut donc qu'en se rappelant ces vérités l'imagination & le cœur y soyent intéressés. C'est alors qu'elles deviennent triomphantes. C'est aux artistes de faire l'un & l'autre, de les dire d'une façon si supérieure qu'on ne les oublie jamais, ou d'y ajouter des beautés sensibles & des sentimens qui les lient à l'imagination & au cœur.

Les autres objets qui appartiennent à cette classe, se distinguent par un gout & une beauté supérieure.

Le Beau de toute espece dont on remplit l'imagination, augmente en nous la faculté d'être touché agréablement. C'est de cette faculté que dépendent en grande partie les agrémens de la vie. L'homme barbare ne jouit que des plaisirs les plus grossiers, qui accompagnent les actions par lesquelles on satisfait aux besoins les plus pressans de la nature; l'homme instruit jouit d'une infinité d'agrémens



que le goût seul peut donner. Mais, comme de l'autre côté un grand nombre de désagrémens & de degoûts, sont inséparablement attachés à cette sensibilité que le goût donne, on paye ces agrémens tout ce qu'ils valent. Quoiqu'il en soit, cette sensibilité produit des biens plus réels. Elle rend l'homme plus capable d'être perfectionné par une bonne institution. Comme il est impossible de corriger un homme stupide ou hébété, parce qu'il ne sent ni la force des représentations qu'on lui fait, ni le poids des corrections dont on se sert; l'homme instruit, rendu plus sensible par les beaux-arts, devient par là plus traitable. Souvent un seul mot bien énergique, dont il sent toute la force, suffit pour le faire rentrer en lui-même, après une suite d'égaremens. Plus sensible qu'un autre à la honte & à l'honneur, il facilite par là les moyens de le perfectionner. Le seul exemple des Groenlandois, peuple le plus misérable de la terre, qui lutte continuellement contre les maux les plus cruels, nous montre quel obstacle l'insensibilité met à la perfection de l'espèce humaine. Ces pauvres barbares sentent si peu la différence qu'il y a entre leur misère & l'aisance des Européens, qu'ils n'adoptent pas les usages même les plus innocens, qui remédieroient à leur état.

Ces remarques nous aideront à apprécier le mérite & l'importance des différens ouvrages de goût, & les especes d'énergie comprises sous ce second genre que nous venons d'examiner. Les ouvrages des Orateurs & des Poëtes, qui brillent par des sentences graves énoncées d'une manière bien frappante, par des vérités triomphantes, par des images riches, qui donnent de la lumière à l'esprit & rendent ineffaçables les idées importantes qu'elles renferment \*); ces ouvrages, dis je, méritent d'être mis à la tête de ceux qui appartiennent à cette classe; viennent ensuite ceux où regne un gout mâle & solide, qui, en se communiquant à ceux qui étudient ces ouvrages, les degoûte des frivolités & de tout ce qui est au dessous d'un certain degré d'importance. Les ouvrages exécutés dans le beau tems des arts  
en

\*) Si je ne fais pas mention ici des autres mérites de ce genre d'ouvrages, c'est qu'ils n'appartiennent pas à ce genre, mais au troisième dont nous parlerons d'abord.



en Grece & à Rome , outre les autres genres de mérite , ont aussi celui-ci ; parmi les modernes, les peintres de l'école romaine & ceux de l'école des Carraches, l'ont donné à leurs ouvrages. La dernière place sera assignée à ces beaux-esprits & artistes qui ont préféablement réussi dans le gracieux, dans le beau délicat & recherché, dans ce qui pique & qui chatouille finement l'imagination. C'est principalement à ceux-ci que l'homme doit cette sensibilité de l'imagination, qui cause autant de dégoûts que d'agréments, autant de peine que de plaisir. Mais en voilà assez sur le second genre d'énergie ; je viens au troisième.

Les objets qui ont ce genre d'énergie se rapportent immédiatement aux sentimens moraux & aux passions, ou, pour m'exprimer dans le langage des philosophes, aux facultés inférieures de l'ame, en y produisant le desir ou l'aversion. On a pû remarquer que les objets énergiques dont nous avons parlé jusqu'ici, sont tous relatifs à la façon de voir ou de concevoir les choses, c. à d. aux facultés supérieures de l'ame. Or, comme chaque individu a reçu de la nature ou contracté par l'habitude un certain goût, qui règle ses facultés supérieures de façon qu'il aime à voir & à concevoir les choses d'une certaine façon plutôt que d'une autre ; il y a de même un goût qui domine dans la partie inférieure de l'ame, & qui fait que certains objets y excitent le desir, d'autres l'aversion. Chaque objet qui, en se présentant à l'ame, y produit l'un ou l'autre de ces effets, a une énergie de ce troisième genre.

L'émotion paroît si immédiatement à la vue de ces objets, que quelques philosophes ne voyant rien d'intermédiaire qui fit concevoir son origine, ont hardiment assuré qu'on ne pouvoir chercher d'autre explication à cela que la volonté de l'auteur de la nature qui, à ce qu'ils disent, a donné à l'ame des sens, comme au corps. Le plaisir donc & la peine, le desir & l'aversion, sont selon eux des effets immédiats & inexplicables de ces sens intérieurs. Ayant réfuté dans un



autre endroit \*) cette opinion, si peu digne des lumières actuelles de la philosophie, je puis me dispenser d'entrer ici dans un plus grand détail. Il me suffit de remarquer, que l'énergie dont nous parlons ici, produit les vraies forces motrices de l'âme, & la fait passer du sentiment à l'action, si les circonstances le permettent. Car il est visible que le desir & l'aversion sont les deux premiers ressorts de l'âme.

Cela prouve l'importance supérieure de ce genre d'énergie, qui, par conséquent, mérite bien d'être approfondi, tant du côté de la nature que de celui de l'emploi que l'artiste en peut faire. C'est ce qui nous reste à faire ici

Le sentiment agréable ou désagréable qui accompagne certaines perceptions, est la source de nos goûts, de nos inclinations, des sentimens moraux & de toutes les passions. La vue ou la jouissance répétée des objets agréables ou désagréables les fait naître & les entretient. Après avoir pris racine dans l'âme, ces passions se font sentir ou opèrent, toutes les fois qu'une des perceptions qui les avoient fait naître, revient dans l'esprit. De ces objets de nos goûts les uns produisent leur effet sans aucune apparence de causes intermédiaires, comme il arrive dans les sensations; d'autres au contraire supposent des idées confuses, moyennant lesquelles ils acquièrent leur énergie, comme les objets de l'ambition ou de l'avarice. Ceux-ci n'ont d'énergie que par le secours d'un nombre d'idées préexistantes, par lesquelles on saisit le rapport qu'ils ont à nos passions. Leur effet dépend du caractère, des mœurs, de l'humeur, de la situation actuelle des personnes que l'on veut émouvoir. Je rassemble ici toutes ces observations, quoique fort connues, parce qu'il est nécessaire de les avoir sous les yeux pour bien saisir ce que j'ai à dire sur les différens objets doués de ce genre d'énergie.

Considérons d'abord ceux qui agissent sur les sens. Outre le plaisir & la douleur causés uniquement par l'ébranlement des nerfs, il y a dans ces objets une très forte énergie, que les artistes ne sauroient assez

\*) Dans la Théorie des sentimens agréables & désagréables.



assez étudier \*). Ceux qui frappent l'ouïe, ont dans leur simplicité une force que rien ne peut égaler. Un seul ton de voix, un cri inarticulé, peut percer le cœur & le remplir dans un instant de tristesse, de commiseration ou d'effroy. Il y a certains sons si désagréables, & si révoltans, que ce seroit un très grand tourment que d'être obligé de les entendre pendant quelque tems, & d'un autre côté des tons si doux, si flatteurs, qu'il n'y a rien au monde qui mette l'ame dans des sentimens aussi agréables que ceux que ces tons produisent. Ajoutons à cela, qu'il n'y a aucune espee d'émotion, aucun mouvement de l'ame, qu'on ne puisse exprimer & rendre sensible par la succession des tons. Le Musicien, qui sait combiner l'énergie des sons caractérisés & celle des harmonies avec celle qui résulte de la succession des tons, est capable de produire les plus grands effets sur le cœur.

Les objets visibles ont une énergie qui a un peu moins d'intensité que celle dont nous venons de parler ; mais comme ils peuvent être plus particulièrement caractérisés, ils gagnent en étendue ce qui leur manque en intensité. Encore celle-ci est elle très grande. Il y a des objets si souverainement hideux que personne n'en peut soutenir la vue. Je me borne à considérer ici l'énergie qu'on peut observer dans la forme, dans les traits, dans les attitudes & mouvemens du corps humain. C'est de cette énergie que les arts du dessin tirent leurs plus grands avantages.

D'abord il n'y a rien de touchant, de respectable, de grand ou de sublime, dans les sentimens ou dans les caracteres des êtres pensans, qu'on ne puisse rendre visible par les traits du visage ; il en est de même des qualités opposées, ce qu'il y a de méprisable, d'odieux, d'effrayant dans les sentimens & les caracteres peut être exprimé dans le visage & par les gestes du corps. Le petit nombre d'Antiques du meilleur tems de l'art, & quelques ouvrages de Raphael prouvent la  
vé.

\*) Il est très essentiel pour bien comprendre cela, d'avoir ici devant les yeux la comparaison des sentimens, qui se trouve à la fin de mon troisième Mémoire sur l'origine des sentimens &c.





vérité de ce que j'avance ici. Rien n'égale l'impression que fait la frayeur & le désespoir exprimés dans une des filles de Niobé. Ce que les Anciens nous disent de la sublimité de caractère du Jupiter Olympien de Phidias, nous fait concevoir qu'il n'y a aucun sentiment que l'habile dessinateur ne puisse inspirer, par le moyen de l'expression dont son ouvrage est susceptible.

Les traits du visage ont sans doute la plus grande énergie de tous les objets visibles. Cependant celle qu'on peut mettre dans les attitudes & les mouvemens est encore bien forte. Le *Luocoon* antique, le possédé dans la transfiguration de *Raphael*, ou l'*Ananias* mourant dans un des sept cartons de *Hamptoncourt*, font les plus grands effets par les attitudes & les mouvemens.

Les peintres & les sculpteurs ne sont pas les seuls artistes qui doivent employer ces especes d'énergie. L'Acteur du théâtre doit en faire sa principale étude; car c'est par là qu'il peut achever ce que le poëte a ébauché dans le drame. Quelque grande que soit l'énergie du poëme, celle que l'acteur seul peut y ajouter par son action, la surpassera toujours. Les Danseurs même, s'ils vouloient bien étudier cette matiere, pourroient parvenir à disputer le rang à tout autre artiste. Leur art est susceptible de la plus haute énergie, de sorte que ce n'est pas la faute de l'art, mais de ceux qui l'exercent, s'il tombe dans l'avilissement. Il est à souhaiter qu'un danseur, qui, outre le génie de son métier, ait la profondeur d'un philosophe, acheve ce que *Noverre* a commencé \*) pour la perfection de cet art, dont certainement on pourroit tirer un très grand parti.

Il y a encore une espece d'énergie dans les objets visibles, que l'on pourroit nommer le *Pathos* de la nature inanimée. Dans la variété infinie de *coups d'oeil*, de vues & d'endroits caractérisés qu'on voit dans la nature, il s'en trouve de tels qu'on ne peut les contempler sans être saisi de quelque passion, ou de quelque sentiment qui approche de la passion. Tel endroit sombre inspire je ne sai quelle sainte hor-

\*) Dans ses lettres sur la Danse.



horreur dont les prêtres de plusieurs Nations ont fort bien profité pour nourrir la superstition ; tel autre endroit paroît propre à inspirer des rêveries amoureuses. En général la nature a visiblement imprimé à de certains endroits les caractères de gaieté, de tristesse, de respect, de dévotion, de peur ou d'horreur. C'est à l'habile artiste d'en profiter. Le peintre des paysages en choisissant de pareils endroits & en y plaçant quelque action convenable au caractère du lieu, est sûr de toucher le cœur. Tel est le tableau du *Poussin* dont parle l'Abbé du *Bos*, où dans un paysage délicieux on voit le tombeau d'une jeune fille avec l'inscription : *Et ego in Arcadia*. Les poètes & les auteurs des Romans ont tiré bon parti de tels endroits. L'architecture même, qui de tous les Beaux-arts paroît la moins susceptible d'énergie, peut s'approprier cette espèce. L'habile architecte, s'il veut étudier la nature, trouvera le secret de l'imiter en cela, & de donner l'énergie convenable aux temples, aux Basiliques, aux tombeaux & à d'autres fabriques caractérisées.

Voilà les espèces d'énergie propres aux arts qui travaillent pour les sens. Il semble d'abord que ces arts aient en cela un grand avantage sur l'éloquence & la poésie. Car les idées des choses sensibles que l'âme reçoit par le ministère de la parole ne sont que les ombres des objets mêmes, de sorte que leur force doit être très inférieure à celle des sensations. Cependant les arts de la parole ont de quoi se dédommager de ce qu'ils perdent de ce côté-là. Car d'abord ces arts semblables à la chymie, qui tire des matières terrestres ce qu'elles ont d'efficace & de spiritueux, concentrent l'esprit qui est dans les choses sensibles & rendent par là leur énergie plus forte ; en second lieu, l'orateur ou le poète ayant le sentiment plus délicat, que le gros des hommes, voit dans les objets visibles beaucoup plus qu'eux : il nous rend ces objets non seulement tels qu'ils paroissent aux sens, mais tels que la délicatesse de son imagination & de son cœur l'ont aperçu & senti ; il est l'abeille qui rend les sucs recueillis des plantes convertis en miel. C'est par ces moyens que les objets sensibles gagnent une nouvelle énergie. D'ailleurs il y a sou-





vent dans les choses purement intellectuelles, qui sont propres aux arts de la parole, une énergie qui surpasse la force des sensations. Quelquefois un seul mot lâché bien à propos, semblable à une étincelle jettée dans la poudre, excite un tumulte affreux dans l'ame, en la forçant de renoncer à une longue suite d'idées agréables & de leur substituer des idées infiniment pénibles \*). Des mots triomphans tels que *Cicéron* en lançoit quelquefois contre les ennemis, ont une énergie à laquelle rien ne peut résister. Ceux donc qui possèdent ces arts dans leur perfection, tiennent le coeur de l'homme dans leurs mains. Ils font trembler les plus courageux, & donnent de la fermeté aux plus foibles; ils sont capables d'humilier les plus fiers & de donner de la fierté à l'humilité même.

C'est donc dans les ouvrages des orateurs & des poètes que ce genre d'énergie comme tous les autres, a lieu dans toute son étendue. Les richesses du monde matériel & toute l'immensité du monde intellectuel sont les fonds où ils puisent. On ne peut pas douter que le but que la nature (c. à d. son auteur) s'est proposée en mettant cette énergie soit dans la matiere soit dans les objets immatériels, n'ait été de se rendre maitresse des résolutions & des forces du monde intellectuel. Cela est visible aux moins clairvoyans. Le poète & l'orateur, Ministres de la Nature, cherchent à l'imiter en cela. Ils choisissent les objets tantôt du monde matériel, tantôt du monde moral; & ils les peignent avec les couleurs les plus vives, toujours dans l'intention de produire du bien dans le monde intellectuel, soit en excitant, soit en détruisant des sentimens & des passions.

\*) Je n'alléguerai qu'un seul exemple par lequel on comprendra jusqu'où peut aller l'énergie d'un mot. *Annibal* étant à la cour du Roi *Antiochus*, ce Prince, pour faire parade de la puissance avec laquelle il se proposoit d'attaquer les Romains, fit la revue de son armée. Après avoir fait remarquer au Général Carthaginois la richesse des enseignes d'or & d'argent, le nombre des chars armés de faux, des Elephans portans des tours, sa cavalerie enfin extrêmement brillante par la richesse des harnois & de tout l'équipage; il demanda avec beaucoup de faste à *Annibal*, s'il croyoit tout cela suffisant pour les Romains. A quoi celui-ci répondit. *Quoique de tous les peuples de la terre les Romains soyent les plus avares, je crois qu'ils s'en contenteront.* Rex contemplatione tanti tamque ornati exercitus gloriabundus *Annibalem* aspexit & : putasne inquit, satis esse Romanis hæc omnia. Tunc *Pœnus* - - plane inquit satis esse credo Romanis hæc, et si avarissimi sunt. V. *Macrobe* dans les *Saturnales* Liv. II. Ch. 2.



passions. Ils répandent dans les âmes tantôt la sérénité & le repos, tantôt la tristesse & le trouble, l'un & l'autre pour soutenir les vues de la Nature.

Je n'ai pas besoin de prouver que cette énergie qui agit immédiatement sur le cœur est le genre le plus important, & que les ouvrages des arts ne sont respectables qu'à proportion du bon employ que l'artiste y fait de ce genre d'énergie. Cela est très clair par soi-même. L'artiste qui ne travaille que pour égayer l'imagination n'est pas l'imitateur de la Nature, mais le singe qui, faisant semblant d'imiter l'homme ne fait que jouer en bête, incapable de vues & d'intentions réfléchies. Je conçois combien un pareil jugement heurte de front les opinions reçues : mais je n'y ferois rien changer pour cela. Il y a bien des ouvrages des Beaux-arts, surtout des arts du dessin, très estimés, dans lesquels on chercheroit en vain la moindre trace de ce genre d'énergie. Je ne les méprise pas pour cela. Mais au lieu de les regarder avec les *connoisseurs* ou les *amateurs* comme des ouvrages parfaits, je les mets dans la classe de ce qu'on nomme *études* ; ce sont des essais par lesquels l'artiste exerce une partie de ses talens. Ce n'est pas dans l'*exercice manuel* que consiste l'art de la guerre, quoique cet exercice y appartienne essentiellement. Il en est de même des différentes parties des Beaux-arts. Le poète qui a fait un ouvrage brillant par la beauté des vers & des images, par la vivacité & le pétillant de l'esprit, le tout n'étant qu'un badinage, ne doit pas prétendre d'avoir fait un ouvrage qui remplisse le but de son art. Tout ce qu'il peut prétendre pour cela est de s'être exercé avec succès dans une de ses parties.

Voilà ce que j'avois à dire sur l'énergie dans les objets relatifs aux Beaux-arts. J'ose me flatter que mes remarques sur cette matière pourront être utiles aux artistes qui voudront y réfléchir sérieusement. Mais ce n'est pas ici l'endroit pour en faire l'application. Après avoir rempli mon but principal, autant que la faiblesse de mes lumières & de mon savoir faire le permettoient, je n'ajouterai que quelques observations générales sur la dignité des Beaux-arts.

Il résulte bien clairement de tout ce que j'ai remarqué jusqu'ici, que de tous les Beaux-arts l'art *dramatique* est le plus important. Il n'y a aucu-



ne espece d'énergie qui n'ait lieu dans l'exécution d'une piece dramatique : sa composition renferme tout ce que la poésie a de plus énergique, & la bonne exécution y ajoute ce qu'il y a de plus fort dans les gestes, dans le mouvement, dans les caracteres, & dans le ton de voix. Aucune autre production des arts ne réunit tant d'avantages. Parmi les différentes especes des ouvrages dramatiques, celui qu'on nomme l'*Opéra* est très supérieur aux autres, vû que tous les beaux-arts sans exception s'y trouvent réunis. Si tous ceux qui concourent à rendre ce spectacle brillant, Poëtes, Musiciens, Acteurs, Danseurs, Décorateurs, joignoient au caractère de grands artistes, les lumieres de la philosophie, & qu'ils fussent bien unis dans leurs vues, ce spectacle entre les mains d'un Législateur philosophe deviendroit infiniment important. Mais ce même spectacle prouve de la maniere la plus frappante, combien les modernes sont éloignés d'en avoir la vraie idée \*). Telle est la frivolité de notre siècle qu'on a sù avilir tous les arts à la fois, dans un genre qui seul pourroit les annoblir tous.

Après les ouvrages dramatiques, les autres genres de poésie & d'éloquence maintiennent le premier rang de dignité, parce que leur empire s'étend plus loin que celui des autres arts, comme nous l'avons remarqué plus haut. Mon intention n'étant pas d'apprécier ici les différentes branches des Beaux-arts, je ne pousserai pas plus loin la comparaison. Il suffit à l'artiste, quel que soit le genre auquel il s'est voué, de savoir que son art est susceptible d'un genre d'énergie qui le rend important à la Raison la plus sévere; il dépendra de lui, d'ennoblir son métier par des productions qui renferment des beautés sublimes. C'est par ce moyen que *Phidias*, en maniant le marbre & l'ivoire, a sù s'élever au rang d'*Homere* en donnant à son Jupiter Olympien une majesté & une sublimité, que la plus haute poésie ne pouvoit surpasser.

\*) Je parle ici des modernes pour insinuer que les anciens, qui presque en tout ont mérité d'être nos maitres, en ont tiré un tout autre parti. Je prouverai dans un autre endroit que la tragédie greque, dans son bon tems, a été ce que nous nommons un Opéra, chanté d'un bout à l'autre. Or tous ceux qui connoissent les tragedies de *Sophocle* & d'*Euripide* sa- vent dans quelle liaison intime ces drames ont été avec la religion, la politique & la morale du peuple pour lequel elles ont été faites.




M É M O I R E S  
D E  
L'ACADÉMIE ROYALE  
D E S  
S C I E N C E S  
E T  
B E L L E S - L E T T R E S.

---

*C L A S S E D E B E L L E S -  
L E T T R E S.*

\* \*  
\*





DES  
INDUCTIONS  
QU'ON PEUT TIRER DU LANGAGE D'UNE  
NATION PAR RAPPORT À SA CULTURE ET  
À SES MOEURS.

PAR M. TOUSSAINT.

---

**O**n va chercher communément dans les Historiens, on à leur défaut dans les monumens, le tableau des peuples; & l'on a raison: ce sont les deux sentiers battus qui menent naturellement à la connoissance de ces deux objets. Mais (pour me renfermer dans la même métaphore) comme on n'iroit pas remuer les chemins publics, pour juger de la nature du sol d'un pays, mais plutôt les terres adjacentes, que les piés n'ont point foulées, que les charrois n'ont point comprimées, que des couches de matieres étrangères n'ont point déguisées ni masquées: ainsi l'on ne doit pas apprécier servilement d'après les Histoires & les monumens, les caractères des diverses nations, sans faire entrer dans la balance plusieurs considérations qui peuvent altérer la confiance que méritent ces deux especes de témoignages.

Les Historiens, comme les autres hommes, ont eu une patrie & des dieux: ils ont donc été partiaux. Ils ont exalté leur pays aux dépens des autres pays; ils ont voulu établir leur culte sur la ruine des autres cultes. Tant ceux des Grecs que ceux des Romains ne trouvoient des hommes civilisés que parmi eux: les autres habitans  
du



du Globe étoient réputés des barbares. Dans des temps postérieurs, les Théologiens d'une nation anathématisoient ceux d'une autre; & les Historiens épousoient ces partialités dangereuses. Quel fond peut-on légitimement faire sur des hommes à qui on connaît ces préventions, quand on les supposeroit bien informés des faits qu'ils racontent? Le préjugé s'imprime & se calque sur tout ce qu'il touche.

Il m'est venu à l'esprit une autre manière de juger de la culture d'une nation & de ses mœurs: c'est d'examiner son langage. Je commencerai par la culture, & finirai par les mœurs.

## P R E M I E R E   P A R T I E.

Toute langue a commencé par les termes qui répondent aux premiers besoins: il falloit pour les premiers hommes, des vivres, des compagnes & un abri. Leur langue, sans doute, ne s'étendoit qu'aux noms de ces seuls objets, & aux termes qui en désignent l'usage & la communication. Qui l'eût étudiée auroit aisément deviné, que les hommes qui la parloient, vivoient de ce que la Terre produit sans culture; qu'ils épousoient sans cérémonies, & se logeoient sans falte.

Dès que les langues eurent des termes d'agriculture, de chasse ou d'économie rurale, c'est que les hommes avoient appris déjà à cultiver les campagnes, à donner la chasse aux bêtes des forêts, & à nourrir des bestiaux. C'est là le second degré de l'industrie humaine: voici le troisieme.

Le partage des possessions donna naissance à l'arpentage; le loisir des pères à l'astronomie; l'intempérie des saisons à l'usage des vêtemens, usage qui rendit nécessaires la préparation des peaux d'animaux, & la fabrication des étoffes; la crainte des bêtes féroces, & peut-être aussi la rigueur des saisons, à l'architecture, dont la base étoit la taille de la pierre & du bois. Il fallut apprendre à polir le fer pour en faire des instrumens de labourage, & des outils pour les métiers.





tiers. Si donc on trouve dans la langue d'une nation, les termes de ces différens arts, c'est qu'elle les cultive; & l'on apprend par son lexique à quel point elle les a portés.

Jusqu'à cette époque inclusivement, toutes les idées étoient physiques, & pour ainsi dire matérielles. Le terme de *grand* répondoit aux dimensions des corps, celui de haut à leur élévation, celui de bas à leur dépression; tout étoit réputé corps, ou attribut relatif aux corps. L'homme ne se connoissoit qu'en tant que corporel. Toutes les opérations humaines étoient supposées produites par les organes: c'étoit toujours voir, entendre, toucher; comprendre même étoit un terme qui désignoit un acte corporel. Les affections & les passions, dont on a fait depuis, des attributs de l'ame, n'étoient non plus pour les premiers hommes que des appétits corporels: l'amour n'étoit que l'impulsion d'un sexe vers l'autre. L'empressement ou le desir n'étoient que la faim ou la soif, ou autres semblables mouvemens de pur instinct. La paresse étoit l'inaction, la vertu même n'étoit que la force; & la force étoit la seule vertu des Héros.

Mais on est arrivé à une époque beaucoup plus parfaite lorsqu'on reconnoît par le langage, que les arts ont été réduits en principes, & assujettis à des regles: ce moment touche au grand développement de l'esprit humain. Des arts raisonnés aux sciences les plus abstraites il n'y a qu'un pas; & ce pas est bientôt franchi. Alors les sciences de toute espece, qui chacune, comme les arts, ont leur langue particuliere, jettent dans la langue universelle, une richesse, une fécondité infinie: on a des mots pour toutes les choses, pour toutes les idées; on en a même pour toutes les nuances. Et ce n'est pas seulement pour les sçavans & les artistes que la langue devient abondante; elle l'est même pour les gens du monde, qui à mesure qu'ils étendent leurs connoissances, empruntent des sciences & des arts, des termes expressifs, qu'ils portent dans les conversations & dans les cercles. Elle l'est singulierement pour les poëtes, pour les orateurs, & pour tous les hommes de génie, qui en détournant les



mots de leur signification littérale, pour les élever à un sens figuré, en forment des images agréables & des tableaux intéressans.

Quand une langue en est à ce point, on est sûr que la nation qui la parle est cultivée à tous égards. Or plusieurs nations en sont venues là: mais leurs génies divers ont imprimé des caractères différens aux arts & aux sciences qu'elles cultivent; & c'est encore par leurs langues qu'on peut juger de leurs génies.

La Grecque, par exemple, par sa richesse & ses licences, se prêtoit à tous les genres de diction: la flexibilité de ses expressions, leurs dérivations, leurs combinaisons, la rendoient propre à peindre toutes sortes d'images: mais la subtilité de ses termes favorisoit les sophismes, les équivoques & les disputes. On fut longtems en Grece avant d'inventer le mot *vous*; & plus longtems encore avant d'en déterminer la signification. On s'accorda longtems sur le terme d'*ἐμμέλειος* avant de se concilier sur le dogme qu'on entendoit lui faire signifier. Cependant il faut avouer, que quand on fait un terme pour rendre une idée, c'est qu'on l'a au moins entrevue. L'*Entelechie* avoit sans doute un sens quelconque dans la bouche d'Aristote.

Telle devoit être la langue d'une nation libre exercée dans l'art Oratoire, dans la Poësie, dans la Philosophie, & dans tous les genres d'érudition, mais en même tems vive, pétulante, frivole, & toujours emportée hors d'elle-même par une imagination effrénée.

La Latine, moins étendue & plus châtiée, fut longtems privée des termes consacrés aux sciences, parce que dans les premiers siècles de Rome, les Romains n'étoient pas sçavans; & lorsqu'ils le devinrent ce fut des Grecs qu'ils reçurent les termes avec les idées qu'ils exprimoient. La pureté de cette langue, sa noblesse, la régularité de ses tours, l'harmonie de ses phrases, annoncent une nation grave, austère & belliqueuse, qui toute occupée de ses grands projets de conquêtes & d'aggrandissement, ne donnoit qu'une attention fort inférieure aux sciences, aux arts & aux lettres. Il n'y a peut-être jamais eu qu'un

Sou-



Souverain dans le monde (& il étoit réservé pour ce siècle & pour ce pays) qui ait su réunir dans sa personne à l'héroïsme militaire, les études philosophiques, l'amour & la culture des sciences, des lettres & des arts.

Veut-on connoître combien est grande la différence de génie & de caractère entre les anciens Romains & les modernes: on n'a qu'à comparer la langue Latine à l'Italienne. En opposition à un idiome simple & majestueux, on verra un jargon tendre & maniéré, fait pour les pointes & les *concetti*, combiné pour rendre des idées galantes & quintessenciées; riche à la vérité par l'immense variété de ses termes, la multiplicité de ses synonymes, la gradation artistement ménagée de ses augmentatifs & de ses diminutifs, mais singulièrement calculée pour la métaphysique voluptueuse de l'amour. On a dit de cette langue, que c'étoit celle des femmes: à quelques égards on pourroit même dire que c'est celle des enfans, tant elle a de ~~mignar-~~disse & de puerilités. Doit-on s'attendre naturellement à trouver chez un peuple qui parle une telle langue, des braves, des philosophes ou des savans profonds? On y trouvera tout au plus, des gens de lettres & des poètes; on y trouvera tous les arts agréables, tous ceux qui servent d'affaïsonnement aux plaisirs.

L'idiome Espagnol, enfant métis du Latin & de l'Arabe, n'a pas corrompu ses sources comme l'Italien; ses expressions sont nobles & réservées; il conserve sa dignité en toute occasion. C'est avec une politesse majestueuse, que partout ailleurs on prendroit pour une ironie insultante, qu'un officier propose la correction militaire à son soldat. Il ne faut que savoir cette langue pour juger qu'un Espagnol doit être un homme sérieux, cérémonieux, toujours guidé sur l'étiquette, & véillard sur le point d'honneur.

La langue Françoisé, distinguée entre toutes les autres par sa clarté, par la régularité de sa construction, par la simplicité de ses tours, ennemie des figures hardies, & spécialement des inversions, fait supposer dans les hommes qui la parlent, une intelligence facile,



des idées nettes, des raisonnemens conséquens; & des connoissances méthodiques; & l'expérience justifie la supposition. Je ne prétends pas que les têtes françoises soient mieux meublées que celles des autres nations: mais ce qu'elles contiennent est en ordre. Toutes leurs productions en sont foi: c'est le beau côté des auteurs françois.

La langue Angloise au contraire, informe, indigeste & mal combinée, s'enrichissant journellement par ses pirateries & ses dépredations, prend à toutes mains, de nouveaux termes, qu'elle accumule pêle-mêle dans son vocabulaire, sans daigner même déguiser ses larcins. Dans le désordre, dans la hardiesse, dans la vigueur & la fierté rogue de ses expressions, on voit un peuple préoccupé par la manie de la liberté, qu'il étend jusques à sa diction, qui se croiroit asservi s'il reconnoissoit un frein dans ses discours; & tyrannisé s'il assujettissoit ses périodes aux regles de la logique ou de la grammaire.

La langue Allemande, la plus méthodique de toutes, la moins mêlée de mots exotiques, est aussi de toutes celles dont j'ai quelque idée, la mieux conservée, celle qui a subi moins de changemens & d'altérations. Elle annonce des hommes solides & sensés, sur qui les inconstances des modes, & l'influence du commerce avec l'étranger n'ont point eu de prise. On devine encore l'Allemand qui se parloit il y a sept ou huit siècles; il s'est plutôt enrichi que dénaturé. Mais sa richesse ne vient pas du dehors: c'est de ses racines fécondes, diversement combinées ou conjointes, que sont nés les accroissemens immenses qu'il a pris. Il n'a pas même puisé comme tous les autres idiomes de l'Europe, dans le Grec & dans le Latin, pour se procurer des termes techniques: il les a tirés de son propre fonds.

Et afin qu'on ne doute pas qu'il n'y ait une analogie constante entre la langue de chaque pays & le caractère de ses habitans, chaque province, chaque domination en Allemagne a son dia-

dialecte particulier; & ce dialecte caractérise le génie du lieu où il est usité. Il est rude & négligé en Suisse & en Alsace; épais en Suabe, un peu recherché en Saxe, doux, naturel & agréable dans le Brandebourg.

## S E C O N D E   P A R T I E.

Comme les moeurs émanent immédiatement des caractères: avoir montré la connexité du langage avec le caractère ou le génie de chaque nation, c'est presque avoir prouvé d'avance, le rapport qu'il a constamment avec les moeurs. Quelques exemples mettront ce rapport dans tout son jour.

Si par exemple la langue d'un pays est molle & sans énergie, c'est que les hommes y sont lâches & effeminés. Si les applications n'étoient pas des satyres, je saurois bien comment en fournir la preuve.

Si les termes de galanterie y dominent, c'est que les hommes y traitent l'amour moins comme un plaisir que comme une affaire capitale.

Si l'on y exalte par des chansons, la suavité du vin, c'est que le climat en produit, ou qu'au moins on est sensible au plaisir d'en boire. Au nord on chante la biere & le houblon.

Si l'on y entend célébrer avec emphase la débauche & les excès: on a droit de supposer que les hommes apparemment s'y font un jeu de leurs déreglemens.

Si l'on y voit sur le théâtre ou dans les Romans des entreprises contre l'honneur des maris, racontées sur le pié d'aventures plaisantes; c'est que le lien conjugal n'y est pas respecté; d'où l'on peut conclurre encore que la tendresse paternelle y languit; & par conséquent, que l'amour filial n'y est pas fort vif: car l'union entre les époux, & la tendresse respectueuse des peres & des enfans sont trois sortes d'affections qui se fortifient mutuellement.





Si les imprécations & les juremens y sont communs, c'est que la nation est grossière & colérique.

Si les termes de civilité ordinaire y sont abjects & bas, c'est que le peuple y est serf, & que la noblesse y est insolente.

S'il s'y trouve des expressions généralement adoptées qui contiennent des allusions profanes aux mystères ou aux dogmes, c'est que le peuple de ce pays n'est pas religieux.

De ce qu'il ne se trouve point de terme dans la langue Juive, qui désigne une ame spirituelle, qui en exprime l'immortalité, ou qui énonce des récompenses pour une autre vie; bien des interpretes ont conclu que les hébreux n'avoient aucune idée de ces dogmes, qu'ils n'avoient même aucune religion; car il ne leur sembloit pas que ce fût en avoir une que de supposer que l'homme soit anéanti par la mort. Mais quand on voit les Pharisiens adoptant le style de Platon, joindre aux pratiques judaïques, les expressions du Philosophe Grec, on a droit d'en inferer qu'ils avoient fait quelques pas de plus que les autres sectes, & pouvoient au moins aller de pair avec les Païens, qui supposoient des champs Elysées & un Tartare.

On fut même encore longtems, après avoir imaginé une seconde vie, avant de donner à l'ame une nature purement spirituelle; c'étoit un souffle, un vent, un feu léger. Le Christianisme même, qui, comme un soleil levant répandit sur les objets théologiques un si prodigieux volume de lumière, n'établit pourtant pas déterminément dès sa naissance, la spiritualité de l'ame. Les premiers Peres de l'Eglise ne l'avoient pas soupçonnée; il ne leur sembloit pas même que Dieu pût être quelque chose s'il n'étoit pas un peu matériel. Les questions sur la nature de l'ame furent abandonnées aux métaphysiciens comme des objets de pure curiosité. Et en effet, si l'on peut seulement établir que l'ame survit au corps, qu'importe de quelle étoffe elle soit? Avec ce point



point-là seul on a une morale & une religion : mais sans ce point on n'a ni l'une ni l'autre.

Je présumerai que les mœurs d'une nation sont pures par les mêmes inductions tirées de sa langue qui m'ont fait juger de son ignorance relativement aux sciences & aux arts ; car son ignorance à cet égard est justement le plus sûr préservatif contre la corruption, qui est la fille du Luxe ; puisqu'où il n'y a ni sciences ni arts il ne sauroit y avoir de Luxe.

Je jugerois encore favorablement des mœurs d'une nation dont la langue ne me fourniroit pas même les noms des vices qui infestent la plupart de nos sociétés. Je supposerois que le Parricide est sans exemple, ou au moins fort rare, chez un peuple qui n'auroit pas ce terme ou son équivalent. Et comme il est naturel d'imaginer que les Grecs qui avoient dans leur langue, le terme de Pederastie, avoient aussi sans doute le vice qu'il désigne, j'imaginerois au contraire, qu'une nation qui n'auroit pas de mot correspondant à celui-là, ne seroit pas apparemment dans le cas d'en avoir besoin. J'ai séjourné dans un pays dont la langue n'avoit pas de terme qui répondît à celui d'*auteur* : mais aussi étoit-ce un terroir qui ne produit pas de ces êtres-là.

J'aurois encore bonne idée d'un pays où je ne trouverois pas d'expressions usitées pour des sermens : j'y supposerois plus de franchise & de vérité que partout ailleurs. Les sermens n'ont, je crois, jamais servi qu'à donner au mensonge la couleur de la vérité : aussi sont-ce précisément les hommes vrais qui en font le moins d'usage.

Une autre preuve de la pureté des mœurs ou de leur simplicité, c'est quand une langue est bien garnie de ces termes ingénus que les peuples policés appellent libres ou obscènes. Il semble que cette franchise d'expression annonce qu'on ne fait rien dont on doive rougir. Nous n'avons enveloppé les nôtres que pour ca-  
cher





cher nos vices. Les courtisannes de l'ancienne Rome étoient à peu près nues : leur unique vêtement étoit une gaze transparente. A présent il y a tel pays où ce sont les seules femmes qui soient voilées : nos courtisannes n'en sont pas pour cela moins vicieuses. Les annales ou le code d'aucune nation ne contiennent des détails aussi crus sur l'impureté, que l'Histoire du Peuple de Dieu, dictée pourtant par l'Esprit Saint. Les Ecrivains des livres sacrés n'avoient pas ces petits scrupules qui inspirent aujourd'hui la réserve dans l'expression, aux auteurs des brochures les plus profanes. Les contes de la Fontaine & ceux de Bocace, n'ont rien de deshonnête en comparaison du Deutero nome. C'est qu'apparemment les écrivains des livres sacrés avoient dans le cœur toute la candeur & la franchise de leur siècle. Aussi, tandis que l'Eglise Romaine, honteuse des tableaux qu'on trouve dans la Bible, tiroit un rideau par dessus, & ne les laissoit voir qu'aux gens d'Eglise & aux lettrés ; les Réformateurs, qui se piquoient d'austérité dans les mœurs, loin de reconnoître de l'indécence dans ce que les Ecrivains sacrés n'avoient pas cru indigne de leur plume, mirent la Bible indistinctement entre les mains de tout le monde. On lit dans des assemblées religieuses, pour s'édifier, ce que par délicatesse, on n'oseroit pas proferer dans un cercle de mondains.

En un mot le langage habituel des hommes les décele & les fait connoître quoi qu'ils fassent. Il en est des nations comme des coteries : on ne risque guere de se tromper en jugeant par le ton qui y regne, de leurs sentimens & de leurs mœurs. L'homme pris collectivement & l'homme individuel ne diffèrent pas tant qu'on pourroit croire. On se masque, on se déguise dans l'occasion : mais comme le masque gêne & incommode, le moment du besoin passé on l'écarte, & on se laisse voir à visage découvert.

Ce n'est pas seulement du caractère & des mœurs d'un peuple qu'on peut juger par son langage : on en peut aussi tirer des in-



inductions par rapport à son origine, à ses défaites, à ses conquêtes, à ses émigrations, à sa position actuelle. Ce que le François, par exemple, a de commun avec le Latin atteste l'invasion des Gaules par les Romains; ce qu'il y a d'Arabe dans l'Espagnol, celle de l'Espagne par les Mores. Ce qu'une nation appelle *Est* ou *Ouest*, *Sud* ou *Nord*, sert à indiquer sa situation. Les termes d'ultramontain, de transalpin, de cisalpin, ou autres semblables, font comprendre quelle est la position d'un Pays relativement à un autre. Les lumières qu'on peut tirer du fond d'une langue par rapport aux différens aspects sous lesquels on étudie l'Histoire d'une nation, sont innombrables.

Ce ne sont là au reste que des vues générales, qu'on peut étendre à l'infini en approfondissant les diverses langues, & entrant dans les détails de leurs nomenclatures: mais ce travail meneroit à faire un gros livre; & je n'ai voulu faire qu'un Mémoire.





## D I S C O U R S

D E

M. L A M B E R T \*).

**J**e ne m'arrêterai pas à Vous entretenir, Messieurs, sur la liaison des connoissances, qui font l'objet de chacune des quatre Classes de cette Académie. Ces liaisons sont celles de toutes les Sciences, & les mêmes que celles qui enchainent les vérités, de façon qu'elles en font un tout étroitement uni en toutes ses parties.

La Classe de Physique expérimentale, à laquelle j'ai cru devoir me vouer, me donnera lieu de Vous offrir un point de vue plus particulier, en ce que je vais ramener les autres connoissances à celle-ci, & faire voir par quelles liaisons elles y tiennent. Comme c'est là la façon dont je combinerai mes occupations académiques, Vous verrez du moins, Messieurs, que diverses parties de ma tâche ne me sont point inconnues; si tant est que la brièveté à laquelle je me restreindrai, m'empêche de n'y faire entrer rien de nouveau.

Il est une Physique expérimentale, que je nommerai *naturelle*, & qui est fort étendue. En effet, dans notre enfance l'Univers entier nous est tout aussi nouveau, que le fut à *M. Richer* la retardation du pendule sous l'équateur, à *Marius*, *Galilée*, *Huyghens*, les satellites de Jupiter & de Saturne, à *Newton* l'attraction ou la gravitation des corps célestes, à *Kepler* les loix de leurs mouvemens, à *Pythagore* les différens sons d'une même enclume, à *Guericke* l'élasticité de l'air, & sa pesanteur à *Torricelli*; enfin à tant d'autres Physiciens tant d'autres

\*) Prononcé le jour de sa réception, dans l'Assemblée publique du 24. Janvier, 1765. Il a déjà été imprimé séparément. On en retranche ici tout ce qui est de pur compliment, l'usage étant de n'insérer dans les Mémoires que ce qui se rapporte aux Sciences & aux Belles-Lettres.



phénomènes & effets de la Nature. Toutes nos connoissances commencent par les sens; & les représentations de l'âme sont toujours étroitement liées à quelques sensations. Nous n'appellons les premières abstraites, que lorsque les dernières commencent à être imperceptibles.

J'en conclus, que cette Physique expérimentale naturelle nous fournit & nous occasionne les premières notions, la première base de nos connoissances, en un mot les premières *données*, dont nous devons partir, pour parvenir à des conséquences plus reculées & plus éloignées de ces commencemens. Heureux quiconque a reçu de la nature une sensibilité telle, qu'en contemplant les objets du Monde physique, il s'aperçoive chaquefois de tout ce qui s'y présente de nouveau, & une mémoire qui lui en reproduise le souvenir toutes les fois qu'il en besoin! Il sera riche en connoissances; il abondera en tout ce qui en fait la première base. Et s'agit-il de poursuivre un raisonnement long & suivi, il ne manquera jamais de retrouver les liaisons nécessaires pour le conduire au but qu'il se propose.

Mais avouons, Messieurs, que, quelque grande que puisse être cette perfection d'un homme, il ne sera jamais dans tous les points de vue où il faut être, pour se procurer toutes les données que demande une connoissance complète de la Nature. Qu'on y supplée même, autant qu'on veut, par le raisonnement: ce sera sans contredire le moyen d'aller bien loin. On peut se dispenser de voir, à mesure qu'on apprend à penser juste, & à étendre le fil d'un raisonnement exact & bien lié. Mais, outre que dans le raisonnement, de même que dans le calcul, une seule circonstance omise gâte tout le reste, & qu'une seule donnée qui manque, le suspend nécessairement; il s'en faut de beaucoup que nous ayons toutes ces données, & que nous nous avisions de nous-mêmes de toutes les combinaisons dont elles sont susceptibles. Et jusques-là nous resterions bien en arrière, si nous voulions en revenir au premier des moyens, dont nous nous servons pour apprendre à connoître ce que le Monde nous offre.



Je n'ai pas besoin d'en appeller à ces rems barbares, où, au lieu de la Nature, on ne consultoit qu'*Aristote*. A peine ce préjugé fut levé par *Bacon*, que la Physique ne tarda pas de parvenir à cet état brillant où nous la voyons. Ce grand homme ouvrit la véritable carrière, où l'on peut toujours aller plus loin, & en toute sûreté. Car enfin, c'est le même chemin qui nous conduit dès notre enfance, & que le Créateur nous a ouvert pour un âge où il faut apprendre sans le secours de la réflexion & du raisonnement.

Dans un âge plus mûr, aidés de ces facultés de l'ame, & munis de quelques principes universels; nous pouvons y marcher à plus grands pas, & les accélérer même. Sans nous borner à contempler la Nature agissante par elle-même, ou à ne nous arrêter qu'aux dehors qu'elle nous offre, nous pouvons nous munir d'instrumens, pour lever le voile qui cache ses secrets, pour ouvrir les portes de son sanctuaire, où elle garde ses mystères, & les loix éternelles qui régissent ses pas. Sans nous arrêter à n'écouter que ce qu'elle dit, nous pouvons l'interroger: ses oracles ne sont ni ambigus ni obscurs, dès que nos questions sont bien conçues, & dûment proposées. Mais voilà la grande étude d'un véritable Physicien. Il convient, Messieurs, de m'y arrêter un moment.

Ces expériences faites à dessein, & dans des circonstances choisies, sont autant de problemes que nous proposons à la Nature. Ses loix sont individuelles & immuables. Les réponses qu'elle donne, y sont exactement conformes. Elle répond précisément, non à ce que nous croyons demander, mais à ce que nous demandons en effet. A moins donc que d'être érudés & trompés dans notre attente, il faut s'assurer rigoureusement des conditions que le probleme présuppose, afin de choisir les circonstances, & d'y adapter l'expérience qu'on veut faire. Autrement on se trouve dans le cas de ceux qui, disposant leurs alembics, ou leurs creusets, en sorte qu'ils se flattent que la Nature y opérera selon les mêmes loix qu'elle suit pour produire de l'or, n'en voyent sortir que ce qu'admettoient la préparation & les ma-



matieres, je veux dire, de la porcelaine, du phosphore, ou quelque mixtion médicinale. Ils sont même heureux, s'il n'en retirent rien de pis. Tant il importe de savoir précisément ce qu'on demande à la Nature; jusques-là même qu'on peut dire, qu'une expérience bien imaginée, & dont l'exécution remplit toutes les conditions qu'elle exige, peut toujours aller de pair avec le probleme le plus ingénieux & le plus difficile qu'un habile Géometre puisse résoudre. Cette égalité va encore à ce point, que l'Algebre, comme la Nature, répond aux vraies conditions du probleme, & élude l'attente du Géometre, dès qu'il s'est figuré ces conditions différentes de ce qu'elles sont.

La Physique expérimentale se rend absolument nécessaire par tout où il n'y a pas moyen de voir le mécanisme par lequel la Nature opere, & surtout par conséquent dans la Chymie, & dans plusieurs branches de l'Anatomie. Au contraire on y joint le calcul, on y applique les principes de la Mécanique, là où ce mécanisme se développe assez pour être vu, ou qu'il est assez simple pour être conçu. C'est donc là, où la Physique expérimentale se rapproche & se lie à la théorie & aux Mathématiques. Mais c'est aussi là, où les difficultés que rencontrent le Physicien & le Géometre, s'accroissent en se combinant, & où il est principalement besoin de ne négliger, ni le calcul, ni l'expérience. En voici le parallele.

Le calcul y fournit la précision & l'universalité. L'expérience vérifie l'une & l'autre, & découvre chaque circonstance omise, ou fausement admise. En négligeant le calcul, & la théorie qui lui sert de base, on fait les expériences sans choix & sans dessein. En négligeant les expériences, on court risque de donner dans la chimere, & de produire des calculs applicables à tout autre Monde, qu'à celui où nous sommes. On peut dire, que si jamais la Physique n'a pas fait autant de progrès qu'elle auroit pu en faire, c'est qu'on a négligé d'observer cette maxime. Des expériences mal faites ne laissent pas de garder encore quelque reste de cette autorité absolue, qu'elles





pourroient s'arroger, si elles étoient bienfaites; & par là elles empêchent les progrès d'une bonne théorie, & la gâtent, dès qu'on les y employe sans en connoître les défauts. Au contraire, les calculs, & les hypothèses hazardées avant que d'avoir assez consulté la Nature, & soutenues par cet amour qu'on a pour ses propres productions, & plus encore par la crainte secrète de les voir renversées en peu de tems, excitent dans l'esprit de leurs auteurs cette aversion naturelle pour les expériences, dès qu'on n'ose risquer cette épreuve décisive. Il ne doit pas être indifférent au Géometre de s'être trompé; mais, s'il ne s'intéresse à son erreur, que pour la soutenir par un principe de fausse gloire, il se fait à soi-même une illusion vicieuse, & qui le détourne de la vérité, qu'il vouloit chercher en imaginant son système. Qu'il est beau de se posséder soi-même, & d'avoir cette retenue si louable & si avantageuse, qui arrête & rallentit des pas trop précipités, & qui fait qu'on préfère un moindre nombre de vérités, qu'on ne trouve qu'à pas sûrs & mesurés, à un grand nombre d'erreurs qui se trouvent aisément, & qui éblouissent l'inventeur trop avide de la nouveauté, par quelque apparence du vrai!

Ce parallele fait voir en même tems la nécessité de combiner les calculs, les théories, & les expériences; de même que l'étroite union qui se trouve entre les Mathématiques & la Physique expérimentale, & les secours mutuels qu'elles se prêtent. Mais la Physique n'est pas moins liée à la Philosophie. Les connoissances du Philosophe commencent par les sens, tout de même que celles que renferment les autres Sciences. Elles parrent toutes des mêmes commencemens. La différence ne consiste que dans la marche, & si j'ose employer ce terme, dans la direction des différentes routes. Le Physicien reste, pour ainsi dire, plus près des premières sources. Il recherche avec une attention plus particulière ce que la Nature n'offre pas d'abord au premier coup d'oeil. Le Philosophe arrange les idées que lui procurent les sensations; il en examine la dépendance & la subordination; il remonte & pénètre à celles qu'on peut appeller  
simples





simples & premières, desquelles il faut partir, & qui sont comme les ingrédients, dont toutes les autres se composent. Ces idées sont exemptes de contradiction, par là même qu'elles sont simples. Elles peuvent être pensées, sans qu'on ait recours à d'autres, qui en sont composées, & dont il faut prouver la possibilité de la composition, avant que d'en rien conclure. Le Philosophe s'en sert, pour en faire la base de ses connoissances, & pour en tirer ces axiomes & demandes, dont il faut partir dans le raisonnement qui suit l'ordre & la rigueur géométrique. De là ces principes universels, généralement applicables, que nous doit fournir la Métaphysique, & dont on tire un grand secours, lorsqu'il s'agit de lier les expériences, & de donner à la Physique un ordre & une connexion véritablement scientifique. Aussi faut il dire, qu'elle reste en arrière, à mesure que le Philosophe ne fournit point assez de ces principes universels, & qu'il n'y substitue que des raisonnemens vagues, qui tiennent à de simples hypothèses, & à une terminologie vaine de sens.

En Métaphysique on n'est encore gueres parvenu plus loin. Mr. Locke commença par débrouiller les idées simples, mais sans y appliquer la méthode que je viens d'indiquer, & qui lui auroit fourni les axiomes & les demandes, je veux dire la base des Sciences qui se résolvent en ces idées, quand on en fait l'anatomie à la manière de Mr. Locke.

Voilà donc la Philosophie étroitement liée à la Physique expérimentale. La Physique donne à la Philosophie les matériaux, toutes les premières idées & connoissances. Mais elle en attend en échange les principes nécessaires, pour être rendue systématique, & pour prendre la forme de Science démonstrative. J'ajouterais encore, que le Philosophe s'égarant quelquefois, & même assez facilement, dans ses méditations abstraites, ne sauroit mieux faire que d'en revenir à ces premiers commencemens que lui offre la Physique, afin de voir de quelle manière il s'est écarté. S'il veut éviter le reproche qu'on fait assez ordinairement aux Philosophes, de ce qu'ils ne s'attachent qu'à



qu'à des spéculations abstraites & inutiles, il lui convient de les rapprocher de la pratique; & par conséquent, de l'expérience & des circonstances individuelles de la Nature, qui lui serviront comme de pierre de touche, dès qu'il s'agit d'en faire voir & sentir même la justesse, & l'usage qu'on en peut faire.

Mais que dirai-je de l'Histoire & des Belles-Lettres? Ont-elles quelque rapport à la Physique? On ne peut en disconvenir. L'Histoire nous offre des faits & des phénomènes des tems précédens; & en la prenant dans sa véritable étendue, l'Histoire naturelle en fait une grande partie. Qui nous fournira les données, pour apprendre à connoître les loix qui s'observent dans la succession des causes & des effets, & pour les prévoir? C'est à l'Histoire à nous tenir registre de ce qui s'est passé, afin de pouvoir le comparer avec le présent, & en déduire les loix pour l'avenir. Remarquons encore, que réciproquement l'Histoire elle-même ne sauroit mettre ses régîtres en ordre, & fixer ses époques, que d'après les grandes révolutions que la Physique céleste lui offre dans le mouvement des Astres, & dont elle caractérise & calcule les momens.

Je ne dirai qu'en passant, que les Belles-Lettres, entant qu'elles embrassent la théorie & l'étude des langues, contribuent à fixer & à conserver la signification des noms que nous donnons à tout ce qui se rencontre dans la Nature. Mais j'observerai, que la base de toutes les langues, je veux dire, les paroles primitives & radicales, sont précisément celles dont on se sert dans ce que j'ai appelé ci-dessus la Physique expérimentale naturelle. Les Langues ne commencent pas par des idées abstraites, on ne pourroit les indiquer; mais par ces choses que nous voyons dès notre première enfance, & dont nous acquérons à la fois & les noms & les idées, en voyant les choses devant nous. Cette liaison entre la Physique & la théorie des Langues est la plus étroite qu'il puisse y avoir; jusques-là même, que les Philologues, les Grammairiens, & les Lexicographes, tombent dans des fautes de choses & de mots, unique-



quement parce qu'ils négligent l'étude de la Physique & de l'Histoire naturelle, qui leur fourniroient des idées nettes de la plus grande partie des radicaux des langues.

Ce n'est pas cependant à l'Histoire & aux Langues que se bornent les Belles-Lettres. L'art de l'Orateur & la Poésie en sont les plus belles parties. Mais que de matériaux ne leur fournir pas la Physique, si les Poètes veulent chanter les merveilles de la Nature, & s'appliquer à une connoissance plus étendue des objets de l'Univers, que ne le sont le vin & le beau sexe! Quel goût, quel feu, quel enthousiasme, que celui dont ils sont saisis, dès que la Nature leur fait connoître & sentir ses beautés, ses merveilles, ses abymes, ses vastes régions parsemées d'étoiles rayonnantes! Etudes trop longues pour la plupart des hommes, & qui demandent une attention trop continue. C'est aux Poètes à les mettre à la portée de tout le monde. Que peuvent-ils faire de mieux, de plus digne de leurs talens, de plus essentiel à leur art, que d'imiter la belle Nature, de nous en offrir des tableaux, qui élèvent nos pensées aux perfections infinies du Créateur? La Nature est un bien; elle offre des beautés, dont tout le monde a le droit de jouir: & dès-là c'est une des plus belles tâches des Poètes, de procurer cette jouissance à tous ceux qui n'ont, ni le tems, ni les talens, pour les étudier à fond. On jouit mieux des agrémens du Printemps, quand on a appris à les apprécier dans *Tempsta* & dans *Kleist*.

Voilà en raccourci, Messieurs, le tableau des rapports, qui ramènent & lient les autres branches de vos occupations à la Physique expérimentale, & à la connoissance de la Nature. Elle nous fournit les premières idées & les premiers noms des choses; elle nous offre la base de toutes nos connoissances. Nous y revenons, toutes les fois que le moyen de les avancer par le calcul, & par le raisonnement, requiert de nouvelles données. La Nature féconde & inépuisable en productions, aura toujours des replis plus cachés, qui ne se dévelopent qu'après ceux qui servoient à les voiler & les soustraire à nos yeux.



C'est un champ pour de nouvelles découvertes, qui s'étend à perte de vue, & dont l'étendue croit à mesure qu'on s'élève pour y promener ses regards.

Je m'y voue, en embrassant la Classe de Physique expérimentale, & je devrois le faire, quand même, d'entre ces sujets innombrables qu'elle offre, je n'en prendrois d'autre que la théorie de la chaleur & du feu, en poursuivant ce que depuis plusieurs années j'ai commencé, pour rendre plus complète & systématique la *Pyrométrie*, où il s'agit de faire, à l'égard des forces du feu & de la chaleur, ce que, depuis *Archimède*, les Mathématiciens & les Physiciens sont parvenus à faire à l'égard des forces mouvantes, & de la nature de l'eau. Occupation vaste & compliquée, si jamais il y en eût! Champ peu cultivé, & inconnu jusqu'aux premiers principes qui y servent de base! Etude, qui demande une combinaison également délicate & difficile des expériences, des calculs, & les notions les plus cachées à nos sens; si l'on veut pénétrer à ce qui s'y trouve de simple & de premier, & le conduire jusqu'à ces applications que demandent la vie commune, les Manufactures, la Pyrobolique, la Météorologie, la Science de l'économie de la chaleur animale, la Chymie, & tant d'autres branches de la connoissance de la Nature. Car y a-t-il un seul corps, où les effets & les changemens du chaud & du froid ne se remarquent?





DISCOURS  
DE RECEPTION,  
OU L'ON TRAITE DES PRINCIPAUX AVANTAGES,  
QUE LES ACADEMIES OFFRENT A CEUX,  
QUI EN SONT MEMBRES;  
PAR M. THIEBAULT \*).

---

**L**es Sciences sont bien plus étroitement unies qu'on ne le pense communément: elles sont comme les branches d'un seul & même arbre, comme les membres d'un même corps. De plus, elles tendent à un but qui leur est commun: toutes cherchent la vérité; & la vérité est une.

Mais cette vérité est retenue captive par tant d'ennemis ligüés contre ses amateurs! Des monstres redoutables défendent le terrain: des ténèbres affreuses l'environnent. Les avenues sont étroites, difficiles, croisées à chaque pas par des fausses routes bien plus battues que la bonne: pour une seule route qui mène au terme, combien qui conduisent dans des abîmes, dans des régions peuplées de spectres & de phantômes qui ressemblent assez à la réalité, pour tromper quelquefois les plus clair-voyants & les plus attentifs! Et quel courage, quelle attention, quelle adresse, que de secours ne faut-il pas pour affronter tant de périls, éviter tant de pièges, & forcer tant d'obstacles! Qu'il est difficile d'y réussir! Il est déjà tant de le bien vouloir! Peut-on prendre de trop grandes précautions, de trop justes mesures, contre les préjugés qui sans cesse bourdonnent autour de nous; contre la crainte, la lassitude, le découragement, la folle présomption? (L'énumération seroit infinie!) Voyons ce qui arrive le

T t t 2

plus

\*) Prononcé le 25 d'Avril. On a fait à ce Discours les mêmes retranchemens qu'au précédent.





plus souvent; & rapportons-nous en à l'expérience. On attaque les préjugés; & l'on tombe dans un autre excès qui éloigne peut-être encore plus du but où l'on doit rendre: on se roidit contre l'amour propre, & l'on devient pusillanime; contre la crainte, & l'on devient téméraire. Tel qui ne vouloit qu'éviter le ridicule d'être esclave des opinions & des usages des autres hommes, devient cynique. Eloignez vous de Sylla, & toujours vous retrouvez Caribde.

Ajoutez à toutes les autres difficultés, la crainte de cette critique honteuse & maligne, qui ne reprend pas pour corriger, mais qui mord pour déchirer; de ce talent si commun qui n'est jamais celui d'un bon cœur, & qui est rarement celui d'un esprit capable de quelque chose de mieux; de cette critique qui a tant de charmes pour les jeunes gens, & qui séduit encore quelquefois les vieillards; de ce vice qui fut toujours à la mode, parce qu'il flatte & console l'amour propre; de cet ennemi du vrai mérite, qui souvent ne donne pour juges, que de lâches rivaux qui n'osent entrer dans la carrière.

Ajoutez l'abondance des livres: si tous ne sont pas bons, leur multitude ne porte pas moins à croire que *tout est dit*: Au moins prouve-t-elle que le plus aisé est fait. Et pour ce qui est un peu plus difficile, on ne se flatte pas de faire mieux que tous les autres; & l'on ne veut pas être plagiaire. On sent qu'il n'y a gueres que le génie à qui une certaine confiance, une certaine hardiesse aille bien. Mais tous ceux qui, sans être des génies, ont cependant assez de justesse & de solidité d'esprit pour sentir toutes les difficultés; c'est à dire, le plus grand nombre de ceux qui travailleroient avec succès, ne doivent-ils pas être retenus par toutes ces considérations? Et pour les animer, malgré tous ces obstacles, quelle émulation ne faut-il pas exciter dans leur ame?

Mais ne séparons pas, Messieurs, l'émulation d'avec les secours: sans eux, elle ne produiroit que des efforts infructueux, que des travaux pénibles & ingrats: les sciences ne seroient alors qu'un dédale où l'on s'engageroit imprudemment, & dans lequel on ne  
pour-



pourroit que s'égarer, faute de ce fil secourable qui tient à l'issue, & qui dirige tous les pas. Un homme, avec l'étude la plus opiniâtre, ne parviendroit qu'à ressembler à un enfant encore foible qui s'agit & s'épuise pour marcher, & qui ne fait que des chûtes aussi fréquentes que dangereuses, parce qu'il n'a personne qui lui donne la main. En vain cet homme réussiroit-il à s'élever jusque dans les cieux! Nouvel Icare, on le verroit bientôt tomber, faute d'un guide qui lui montrât la route. En vain monteroit-il sur le char du soleil! En vain tiendrait-il les rênes! Nouveau Phaéton, il ne feroit que hâter sa perte; parce qu'il feroit seul à conduire des coursiers fougueux qui ne connoitroient encore ni sa main, ni sa voix, & que lui-même ne connoitroit pas davantage: Il ignorerait la route dans laquelle il se feroit engagé; & même la vive clarté dont il feroit environné, plus forte que ses yeux qui n'y auroient point été préparés, lui deviendrait aussi funeste que les ténèbres.

D'un autre côté, les secours sans émulation, sans une émulation forte, puissante, & souvent ranimée, ne seroient que des secours perdus, qu'un trésor enfoui, & dont le possesseur n'oseroit faire aucun usage. Ce seroient, si vous le voulez, des armes d'une bonne trempe; mais entre les mains d'un lâche.

Au reste, je ne parle pas seulement des secours que nous peuvent donner ceux qui courent la même carrière que nous: mais je parle principalement de ceux qui résultent de la réunion de toutes les sciences. Les sciences, comme nous l'avons déjà observé, quelque éloignées, quelque distinctes qu'elles paroissent être l'une de l'autre, se rapprochent & se touchent par mille côtés divers, jusqu'à se confondre. Il n'en est aucune par conséquent, qui n'ait presque à chaque pas un besoin réel, un besoin pressant de toutes les autres: d'où l'on peut voir qu'en un certain sens, le mot *tout ou rien*, n'est pas tant la devise d'un ambitieux outré, que celle d'un homme d'étude qui veut avoir quelques succès; que quiconque n'est pas *tout*, n'est effectivement *rien*; c'est à dire, que quiconque n'a pas fait au





moins quelques courses, ou plutôt, quelques voyages, quelques séjours dans le pays de chaque science en particulier, n'en possède réellement aucune dans une certaine perfection.

En effet, est-il quelque science où l'homme de lettres ne puisse trouver, & n'aille quelquefois chercher de ces sujets utiles, agréables, & dignes de toutes les fleurs dont il fait les parer & les embellir; de ces sujets qui ne sortent de ses mains que pour être l'amusement le plus noble & le plus parfait des âmes délicates, en même tems qu'ils renferment l'instruction la plus utile & la plus solide? Mais aussi ne s'acquittent-ils pas envers les autres sciences, & ne devient-il pas leur bienfaiteur à son tour, par les principes de l'élocution qu'il développe, & dans lesquels il fait sentir toute l'importance des maximes fondamentales du langage; maximes qui d'abord paroissent n'avoir jamais besoin d'être citées, tant le bon sens les met à portée de tout le monde; & que cependant l'on feroit bien de répéter souvent à bon nombre de sçavants, à n'en juger du moins que sur l'expérience? Ne s'acquittent-ils pas en établissant & en répandant les loix du style & du goût; deux qualités essentielles à tout auteur, & qui réunies, guident dans le choix & l'ordonnance d'un sujet, dans la liaison & l'expression des détails: le style & le goût, qui non seulement maintiennent de concert l'unité, la variété, la symmétrie, la proportion, & tous les principes constitutifs de la beauté; mais qui communiquent encore à tout le tableau cet air de vie & de chaleur, qui en fait la perfection: le style qui forme les traits, & qui distribue les couleurs; & le goût qui juge du mérite de ceux-là par leur ressemblance, & qui mesure le degré de force de celles-ci, en ordonne & limite la variété, en prescrit les nuances douces & délicates qui les lient en les fondant, & les passages rapides qui les font trancher: le style qui va puiser dans les trésors de l'imagination, ces tours & ces expressions figurées qui font la richesse & l'agrément du langage; & le goût qui examine tous ces ornements au flambeau de la raison, n'en conserve que ceux qui conviennent, préserve de cette enflure que l'on confond quelquefois



fois avec l'embonpoint, & qui souvent est un plus grand mal que la maigreur & la sécheresse: le style qui peint le sentiment, & rend le ton animé de la passion; & le goût qui va sonder le coeur, pour voir si le portrait est fidele, & qui porte la sévérité jusqu'à supprimer ce que le coeur sent réellement, quand il ne devoit pas le sentir: le style & le goût qui donnent à un ouvrage cette marche légère, dégagée & soutenue, ce mouvement aisé, naturel & régulier, qui font un des principaux mérites des productions de l'esprit humain: enfin, le goût qui regle le style, & le style qui caractérise le goût? Ne peut-on pas dire aussi que l'homme de lettres s'acquitte d'une manière bien généreuse, en mettant les découvertes des sàvans à la portée d'un plus grand nombre de lecteurs, & en les enrichissant de tous les charmes que l'élocution peut fournir; avantage que les sàvans n'ont pas toujours le loisir ou le talent de se procurer, & qui contribue souvent plus à la réputation d'un livre, que l'importance même de la matiere?

N'est-ce pas l'Historien qui apprend aux artistes & aux sàvans ce qu'étoient autrefois les objets de leurs travaux & de leurs recherches; quel usage on a fait des matieres qu'ils emploient; en un mot, quels ont été les progrès, & les variations des sciences & des arts? Et qui pourroit dire combien cette connoissance est utile; combien d'idées nouvelles elle fait naître? Mais aussi l'Historien pourroit-il juger & faire l'histoire des progrès & des opinions des anciens, s'il ne s'étoit attaché qu'à étudier simplement les faits? D'ailleurs, n'est-ce pas à la physique, qu'il est redevable de quelques unes des regles par lesquelles il peut constater l'antiquité des monuments? N'est-ce pas d'après les calculs que l'Astronome nous donne des phases de quelques corps célestes, de leurs conjonctions, de leurs éclipses; qu'il peut fixer d'une manière infallible les époques les plus reculées & les plus incertaines? N'est-ce pas dans les écrits des mêmes auteurs, qu'il apprend ce qu'il doit dire & penser de ces phénomènes que les anciens appelloient des *prodiges*, & qui ne sont plus que des *phénomènes*?



nes? N'est-ce pas dans les méditations des Philosophes, qu'il trouve les principes sur lesquels il doit juger des loix & des abus, des vertus & des vices, des peuples & des rois? N'est-ce pas dans les développemens que l'Anatomiste nous fait de l'organisation de nos corps, que le Philosophe ira méditer sur la nature de l'ame? Quelles lumieres ce dernier ne pourra-t-il pas encore acquérir en comparant les caractères des nations, les mœurs & les gouvernemens des peuples, avec les diverses températures & les qualités des climats différens; en combinant les causes physiques avec les causes morales?

Et n'est-ce pas dans l'examen de l'événement le plus commun sur notre Atmosphere, de la chute d'un corps, que Newton apprit à calculer les loix & les degrés des forces combinées qui portent la lune autour de notre globe; qu'il trouva le principe de l'accord permanent qui se voit entre les mouvemens de la terre & des cieux? N'est-ce pas à des jeux d'enfans, que l'Astronome doit ces machines admirables qui étendent sa vue presque à l'infini; ou plutôt, qui lui donnent d'autres yeux, lui font voir les corps qu'il ne voyoit point, & lui découvrent dans ceux qu'il croyoit voir le mieux, mille choses qui lui échappoient? Ne fut-ce pas peut-être l'Algebre qui donna au grand Leibniz, la premiere idée d'une langue universelle & commune à tous les savans?

Combien de sciences, d'ailleurs, qui en séparent d'autres, tiennent le milieu entr'elles, & sont également du ressort des unes & des autres? La Géographie, par exemple, entre la Géométrie & l'Histoire; la Chronologie entre l'Histoire & l'Astronomie; la Mécanique entre la Physique & les Mathématiques? Les recherches sur la nature des passions de l'homme, & sur l'instinct des animaux, ne sont-elles pas également du ressort du Philosophe & du Physicien? La santé elle-même n'est-elle pas un résultat du bon état de l'ame, aussi bien que de l'équilibre des humeurs? En un mot, tout est lié dans l'univers: le moral tient au physique: l'un & l'autre tiennent à la métaphysique la plus abstraite, & à l'astronomie la plus sublime.

Pour

Pour donner encore plus de force aux preuves de cette grande vérité, je ne chercherai point à montrer dans de grands détails, à quoi se réduiroit la Science même la plus étendue & la plus féconde, si on vouloit élever entr'elle & ses voisines, un mur de séparation qui bornât la vue, & qui coupât toute communication. Je ne parlerai point des difficultés que l'on y rencontreroit à chaque pas, ni des ronces qui étoufferoient le germe des vérités que cette science doit fournir. En voulant peindre un Historien superstitieux ou sans morale, en un mot sans discernement; un Mathématicien sec ou diffus, & qui jamais ne sauroit ramener sa Théorie à cette pratique qui en fait l'agrément & l'utilité; un Physicien superficiel ou sans vues, sans cet esprit de combinaison qui rapproche les expériences, & les concilie; un Philosophe obscur ou verbeux, sophistique ou sans style; un Littérateur qui n'auroit que de l'élégance & des mots; je n'offrirois que des traits inconnus ici, que des copies dont les originaux sont étrangers. Il convient beaucoup mieux à mon dessein de revenir aux services que les sciences se rendent réciproquement, quand elles sont réunies. En parcourant les chefs-d'oeuvre que cette réunion produit, j'aurai l'avantage de ne parler que de ce qui est connu du public: la facilité de faire l'application de tout ce que je dirai, fera un plaisir que tous pourront partager, & qui doublera l'intérêt. On aime la peinture même foible de ce qui dans la réalité emporte le suffrage du coeur & de l'esprit. D'ailleurs, Messieurs, quelle preuve plus lumineuse des brillans effets que l'émulation & les secours produisent!

Car c'est à ces avantages précieux, qu'il faut attribuer l'habileté de ces hommes qui rassemblent des systèmes opposés, recueillent toutes les raisons qui peuvent servir d'appui soit aux uns, soit aux autres; leur font subir l'épreuve de la confrontation; les mettent, pour ainsi dire, en présence, tels que des armées ennemies, entre lesquelles ils engagent un combat général, pour mieux découvrir le degré des forces de l'un & de l'autre parti, & s'instruire autant par la

défaire de celui-ci que par la victoire de celui-là; à peu près comme on voit, dans un tems orageux, les vents assembler les nuages, les condenser de maniere que d'abord les ténèbres s'épaississent; mais que bientôt après, la nuée s'ouvre, verse l'abondance, se dissipe, & nous découvre un soleil plus brillant, un ciel plus serein; qu'elle nous donne, en un mot, un plus grand jour que nous ne l'avions auparavant.

En remontant à la nature des mêmes secours, on ne sera point surpris de trouver dans une Académie où ils sont si heureusement réunis, des hommes qui, ne paroissant occupés qu'à lire sur les monumens ce qu'ils ne trouvent pas dans les livres; qu'à juger de la vérité des faits plus récents par les preuves qui nous en restent, comparées avec une tradition soumise à la critique la plus judicieuse & la plus sévère; qu'à juger des faits plus éloignés, en rapprochant & en confrontant les passions, les lumieres, la réputation & les récits des auteurs qui en parlent; des hommes, dis-je, qui sachent aussi mettre ces faits en parallele avec les regles éternelles de la vertu, pour en faire sortir de nouvelles vues sur nos devoirs, & sur notre nature; qui sachent aussi, en donnant à ces recueils indigestes de faits contraires & bizarres; une forme naturelle, un ordre suivi, un style aisé, pur & décent, en faire le trésor des sciences & des arts, l'école des grands & des petits, & la preuve trop peu équivoque des vices des hommes, & des faiblesses de l'humanité.

Par cette heureuse réunion de routes les sciences en un corps, on voit les savans qui recueillent les faits que nous offre le spectacle du monde; on les voit forcer adroitement la nature à agir lorsqu'elle paroît morte; découvrir avec sagacité les opérations qu'elle semble vouloir dérober à nos regards; pénétrer jusque dans ses secrets les plus cachés; mais surtout saisir le corps entier, pour en mieux connoître chaque partie, & pour en mettre tous les ressorts au jour. On les voit joindre, mais avec sobriété, le génie de système à celui d'observation; répandre partout les vues philosophiques; lier des phénomènes





menes opposés; faire l'histoire de la matière organisée; comme de celle qui ne paroît avoir que de l'inertie; de la matière qui se dérobe à nos sens par sa finesse & par sa subtilité, comme de celle qui par sa masse, son volume & ses couleurs se rend sensible, visible & palpable: on les voit suivre cette marche soutenue de la nature, qui de la collection de tous les êtres, ne fait qu'une espèce unique & générale, dont tous les individus ne diffèrent entr'eux que par une nuance à peine perceptible: c'est par là que ces savans parviennent à nous montrer cette affinité qui enchaîne tous les êtres; à développer cette gradation qui conduit depuis les élémens les plus décomposés & les plus simples, jusqu'aux corps organisés les plus parfaits; depuis l'atôme jusqu'aux cieux; sans que l'on remarque un point où la similitude souffre une altération plus grande, où il se fasse un bond, un saut plus considérable: en un mot, c'est par là qu'ils trouvent entre les qualités variées de tous les êtres physiques, cette horreur du vuide, qui n'entraîne pas les mêmes absurdités que celle des anciens, & qui ne peut au contraire que rendre le système actuel plus admirable, & nous en faire mieux concevoir toute la richesse.

Sans cette espèce de communauté des biens, verroit-on ceux qui mesurent l'étendue par les nombres, abrègent les calculs par l'Algebre, représentent par des figures sensibles l'action réciproque des corps, fixent sur des lignes immobiles les divers degrés de la vitesse & la quantité du mouvement, aussi bien que la durée de ce tems que nous croyons toujours tenir, & qui nous échappe toujours: ceux qui par une route aussi sûre, qu'étonnante, parcourent l'espace compris entre l'infiniment petit & l'infiniment grand, les unissent par une série qui abrège la distance de l'un à l'autre, qui du moins les met à notre portée, malgré toute la rénuiré par laquelle l'un se dérobe à nos sens, & malgré l'immensité qui défend l'autre contre nos efforts: les verroit-on, dis-je, donner, en s'élevant jusque dans les cieux, des loix générales à tous ces corps lumineux que nous appercevons à peine; les soumettre à un ordre suivi; les faire servir à l'utilité des navigateurs; marquer la liaison qui se trouve entre la cause de leurs mouvemens & celle du mou-



vément de notre globe, l'influence réciproque de leurs atmosphères & de la nôtre ; trouver, je ne dis pas, dans les accords de la musique, l'image de l'ordre qui regne entr'eux ; mais dans l'ordre de leur cours, dans les loix de leurs mouvemens, des preuves de la puissance & de la sagesse du Dieu qui les meut & qui les soutient ?

A quelle autre cause devons-nous attribuer les succès de ceux qui prenant un autre ciel pour objet, mesurant une autre sorte d'étendue, approfondissant d'autres systèmes ; se servent aussi d'autres yeux, d'autres moyens & d'autres instrumens ; je veux dire, de ceux qui étudient, non point la nature des corps, mais la nature, l'origine, la génération des idées, le système des êtres abstraits ; des êtres dans lesquels la figure, le mouvement, les couleurs & les dimensions sont remplacées par les qualités, les facultés, les principes d'activité ; des êtres qu'on appelle *esprits* ; l'ame humaine, & Dieu l'ame de l'univers ? De ceux qui, s'engageant dans des routes si éloignées de nos sens, vont à la découverte d'un monde différent en tout de ce monde visible ; en remarquent les loix ; en recueillent les singularités ; le mettent, pour ainsi dire, à contribution ; & reviennent riches de dépouilles ; rompent les barrières qui nous en séparent ; & ne font, si l'on peut parler ainsi, qu'un même continent de ce nouveau monde & du nôtre ? De ceux qui sondant les profondeurs du coeur humain, en parcourent les détours ; en éclairent les abîmes ; pénètrent dans le labyrinthe des passions ; distinguent les foibles vestiges de la loi éternelle parmi les traces profondes que les préjugés, l'éducation, l'intérêt, la vanité y laissent tous les jours ; traces sans cesse multipliées & rafraichies, qui croisent les vestiges antiques & respectables de la nature, jusqu'à se confondre avec eux, & presque jusqu'à les effacer ? De ceux qui déchiffrent dans le coeur de l'homme, l'inscription que le doigt de Dieu y a mise ; qui la déchiffrent malgré la rouille & l'altération que l'ignorance & le tems y ont apportées ? De ceux qui nous expliquent la nature des penchans, & la force de l'instinct ; nous démontrent les notions du devoir, & les principes de la vertu ; établissent les règles de l'honneur ; la légitimité des loix, l'accord de la liberté avec la dépendance & la soumission ; font connoître l'essence du beau & du bon, les fon-





fondemens de la morale de l'homme, de la morale du citoyen, des mœurs & de la politique?

Dans des succès si brillants, qui pourroit ne pas voir les avantages de l'Académie, les effets de l'émulation jointe aux secours?

Je fais, Messieurs, qu'on pourroit m'objecter que les livres procurent les mêmes avantages, ou du moins y suppléent. Mais ils ne les procurent pas tous; & combien de fois n'ont-ils pas besoin de commentaires pour être entendus? Personne ne peut avoir tous les livres; & le seul qui manque, est souvent celui dont on peut le moins se passer. Les eût-on tous, combien de choses qu'on n'y trouve point, ou qu'on n'y trouve qu'après avoir essuyé l'ennui d'une recherche aussi longue que rebutante? Quelquefois les livres ne font qu'opposer les uns aux autres, des raisons & des preuves contraires; & finissent au moment d'une décision que vous cherchez. Quand ils traiteroient en entier de tout ce qu'il vous est utile de savoir; combien de petites difficultés que l'auteur lui même leveroit souvent d'un mot, & que son ouvrage ne résoudra point? Enfin, quelques lumières que nous puissions trouver dans les livres, nous n'y pouvons au moins puiser qu'une émulation foible & languissante: leur langage muet fera toujours sur nous bien moins d'impression, que des modèles vivans, que nous avons sans cesse sous les yeux, qui nous parlent, & à qui nous pouvons nous adresser avec assurance d'être toujours écoutés, & souvent pleinement satisfaits.

Mais il seroit superflu de répondre à de frivoles objections, que personne sans doute ne pense à me faire.





## E L O G E

D E

M. DE PRÉMONTVAL ).

**A**NDRÉ PIERRE LE GUAI DE PRÉMONTVAL naquit à Charenton, le 16 Fevrier, 1716. Il fut fils unique d'un pere qui jouissoit d'une fortune assez médiocre, mais suffisante pour le faire vivre honnêtement des revenus de sa Charge. Je commence dès à présent à suivre le fil des Mémoires de sa propre Vie, que *M. de Prémontval* a publiés; & j'en adopterai même pour l'ordinaire les expressions, ne pouvant avoir de meilleur garant de ce que j'ai à dire sur notre Confrere défunt que lui-même.

Il fut destiné à la profession d'Advocat, & s'y prêta d'abord avec ardeur, jusqu'à la Rhétorique qu'il fit avec tout l'éclat & le succès imaginables, ayant fait en François, à l'âge de 15 à 16 ans, sans le secours de ses Maîtres, des Discours publics qui furent extraordinairement applaudis. *M. de Prémontval* le pere, rempli des plus flatteuses espérances de voir son fils devenir un *Terrosson*, ou un *Cochin*, lui fit faire deux Cours de Rhétorique; mais, pour regagner le tems qu'ils exigeoient, il vouloit que l'Étudiant sautât la Philosophie & passât immédiatement au Droit. Ce saut pouvoit passer pour périlleux, puisque l'art de parler, s'il n'a pas pour soutien celui de raisonner, expose aux plus lourdes chûtes. Aussi prit-on un tempérament: ce fut de faire commencer à l'Éleve son Droit & sa Philosophie tout à la fois.

C'étoit le moment que la Nature attendoit pour se déclarer. Le jeune *Prémontval*, né Philosophe, se trouva dans son élément, dès qu'on lui eût ouvert les portes de l'Auditoire philosophique, & ne voulut plus en sortir. Il ne lui fut pas même possible de se parra-

ger:



ger : les nouveaux objets qu'il avoit jusqu'alors négligés, parce qu'ils lui étoient inconnus, eurent toutes ses veilles & son application. Son pere ne s'apperçut pas d'abord de cette espece d'apostasie ; mais il fallut enfin qu'il en fût instruit : & comme il étoit d'une humeur violente, le fils prit le parti de lui écrire, du College où il demouroit, des lettres si fortes qu'à la fin elles l'ébranlerent. Il consentit que son fils renonçât à l'Eloquence du Barreau, pourvu qu'il se consacrat à celle de la Chaire, lui ordonnant d'opter entre ces deux partis, sous peine d'encourir son indignation.

De pareils moyens ne pouvoient que produire un effet tout contraire à leur fin. Le pere & le fils se ressembloient trop par la fermeté, & même par la véhémence de leurs dispositions naturelles, pour que l'un pût vaincre l'autre. Soutenu par son caractère inflexible, (on se souviendra, & je n'en avertirai plus, que je parle d'après *M. de Prémontval*,) le jeune homme ne s'allarma point : il tint ferme contre les menaces de son pere, & contre toutes sortes de mauvais traitements. Rebuté pourtant à la fin par leur longueur, il opta pour le parti d'Ingénieur, résolu d'aller chercher dans ce métier si périlleux, ou l'occasion de servir sa Patrie, ou la fin d'un vie triste & désagréable. Madame de *Prémontval* la mere ne contribuoit pas moins que le pere, à jeter leur fils dans cette espece de désespoir. Elle exigeoit d'un Ecolier, & d'un Ecolier studieux, qui n'avoit encore aucun usage du monde, la politesse & les manieres d'un homme du bel air ; elle avoit l'injustice de le mépriser, de le haïr même, à cause que cet extérieur lui manquoit, sans faire aucune compensation en faveur de sa supériorité dans un genre plus solide.

La demande d'être Ingénieur fut exaucée, mais à cette dure condition, que si, dans un an, à compter du jour de l'accord, il n'étoit pas reçu Ingénieur, ou que ses nouvelles études ne lui eussent pas procuré un emploi, il seroit abandonné à sa mauvaise fortune, & n'auroit qu'à sortir de la maison paternelle pour n'y rentrer jamais. *M. de Prémontval* accepta le défi, bien résolu de tenir parole à la rigueur. Il s'enferma dans sa chambre, & se mit sur le pied d'y travailler.



vailler quinze à seize heures par jour, & souvent davantage, pendant le courant de cette année. Les progrès répondirent au travail ; mais il en résulta un mal dont aucun progrès ne sauroit dédommager, ce fut la ruine du tempérament, & la perte d'une santé jusqu'alors florissante. La pâleur & la maigreur succéderent à l'embonpoint & aux plus belles couleurs. L'empreinte d'une vieillesse prématurée devint ineffaçable ; & tous ceux qui, depuis ce tems-là, ont connu *M. de Prémontval*, l'ont cru beaucoup plus avancé dans sa carrière qu'il ne l'étoit.

Ce qu'il y eut d'accablant, c'est que tant de peines furent entièrement perdues. Les places d'Ingénieur sont fort briguées en France ; & , malgré le crédit de plusieurs amis, l'aspirant ne put pas obtenir une simple Lettre d'examen : de sorte qu'il fallut renoncer à toute vue de ce côté-là. On se souvient de l'arrêt comminatoire dont l'exécution étoit fixée au bout de ce terme. Sans signification expresse, un redoublement de duretés en tint lieu, & détermina *M. de Prémontval* à quitter la maison de ses parens, n'étant pas encore âgé de 21 ans.

Ici s'ouvre une nouvelle scène. *M. de Prémontval* sachant bien tout ce qu'il avoit appris, se crut capable de l'enseigner, & s'érigea en professeur public. Après s'être essayé quelque tems en rassemblant chez lui de jeunes gens, auxquels il démonstroït gratuitement des Cours d'Arithmétique, d'Algebre, & de Géometrie, il loua une Salle publique, & fit répandre dans la ville des Billets imprimés, par lesquels il annonçoit des Leçons gratuites de Mathématiques, trois fois la semaine, où la jeunesse, & en général des personnes de tout état & de toute profession, étoient invitées. Dès cette première année le succès fut très grand ; & l'on compra chez le jeune Professeur quatre-vingt ou cent personnes, c'est à dire, plus que tous les Professeurs de Mathématiques de Paris ensemble n'auroient pu fournir.

Les applaudissemens qui accompagnoient ces leçons, reveillerent le desir qu'avoit *M. de Prémontval* le pere, de voir son fils briller en Chaire ou au Barreau. Il crut réussir à lui faire prendre l'un de ces partis en le privant de quelques secours pécuniaires qu'il lui avoit jusqu'alors accordés. On comprend bien que cela ne fit qu'achever d'ai-  
grir



grir les choses, & consommer la rupture. M. de *Prémontval* demeura privé de tout secours; toute union cessa aussi, tout commerce fut rompu entre sa famille & lui: & il fut plus de deux ans sans en entendre non plus parler, que s'il eût été relégué loin d'elle au bout de l'Univers.

Après avoir été réduit à subsister quelque tems par de légers secours que lui procuroient ses amis, M. de *Prémontval* eut des Écoliers, & même de la première distinction, dont les honoraires firent tout à coup changer sa fortune de face. Il se trouva bientôt trop employé. Comme il étoit redevable à ses Conférences de cette célébrité naissante, il crut devoir les reprendre, & y joindre plus d'apparat. Ayant plusieurs fois changé de demeure, il loua enfin, pour la somme de 800 livres par an, un grand appartement & une Salle fort belle, où l'on compra, pendant une bonne partie des deux dernières années de ces Conférences, plus de quatre cens personnes. Dans l'espace de près de huit ans, M. de *Prémontval* parcourut les parties les plus considérables des Mathématiques, toujours dans un détail où les Professeurs publics n'ont pas coutume d'entrer, faisant toutes les séances au moins de deux heures, & les poussant quelquefois jusqu'à trois. Il traita aussi la Physique tant systématique qu'expérimentale; & il n'a point fait de cours qui ait été plus constamment suivi. C'est à l'occasion de ces Conférences que parurent quatre Discours par lesquels M. de *Prémontval* fit son entrée comme Auteur dans la République des Lettres, & qui ne le firent pas connoître moins avantageusement que ses leçons. Ils furent imprimés dans les années 1742 & 1743, & ont pour titre: *Discours sur l'utilité des Mathématiques: De la nature des quantités que les Mathématiques ont pour objet: Notions préliminaires à l'Etude des Mathématiques: & De la nature du nombre.*

Je n'entrerai pas dans de plus grands détails sur cette brillante époque de la vie de notre Académicien. Les Journaux en parlèrent plus d'une fois avec éloge; & les Muses même la chanterent. Il n'est pas surprenant que M. de *Prémontval* se soit toujours rappelé d'aussi agréables tems avec plaisir, & qu'il nous en ait quelquefois entretenu avec





cette effusion de coeur qui animoit toutes ses expressions, lors-même qu'il ne s'agissoit pas de choses qui le touchassent d'aussi près.

Cependant il n'avoit pas encore éprouvé la plus ravissante de toutes les impressions dont l'homme soit susceptible, surtout lorsqu'elle est excitée par un objet qui réunit tout ce qui peut charmer à la fois les yeux, l'esprit, & le coeur. Pour assister à la naissance de cette intéressante passion, & en voir les accroissemens, il faut reprendre le fil des Conférences. C'est au milieu même des leçons, & tandis que *M. de Prémontval* ne pensoit qu'à démontrer, qu'il reçut une leçon ineffaçable du Dieu qui fait aimer, & qu'il apprit qu'il y a une passion plus vive que celle de la science, une force plus victorieuse que celle des démonstrations.

MARIE ANNE VICTOIRE PIGEON D'OSANGIS, aujourd'hui Madame DE PRÉMONTVAL, prend ici une place distinguée sur le devant du Tableau que j'ai entrepris de tracer; son histoire devient intimement liée à celle de *M. de Prémontval*, par la conformité de leurs talens & de leurs sentimens; qui ne tarda pas à produire l'union de leurs coeurs, suivie enfin de celle de leurs personnes par ce noeud que la mort a seule le pouvoir de rompre.

Cette aimable personne étoit fille de *M. Pigeon*, très habile Mécanicien & Astronome, Membre de la Société des Arts, célèbre par la construction d'une magnifique Sphere mouvante selon l'hypothese de Copernic. Se trouvant l'aînée des onze enfans que son pere avoit eus dans un âge avancé, sa jeunesse fut employée à servir ce respectable Vieillard, & à élever cette famille en bas âge. *M. de Prémontval* fut conduit chez *M. Pigeon*, par le même motif qui y attiroit alors tout ce qu'il y avoit à Paris d'Etrangers & de Citoyens lettrés, l'envie de voir la Sphere. Mademoiselle d'*Osangis* étoit alors dans la première fleur d'une brillante jeunesse, entre 16 & 17 ans. L'impression qu'elle fit sur *M. de Prémontval* ne fut pourtant pas celle de ce premier coup d'oeil qui enflamme. Pendant environ deux ans, la liaison commencée dans cette première visite continua sur le pied de l'amitié. Les deux ou trois années suivantes virent l'un devenu Tuteur, ou Maître, & même un Maître que le Public accusoit d'être bien austere. Je suis obligé, faute  
de



de tems, de renvoyer ici aux Mémoires. On y verra la jeune Elève se former d'abord, par une application incroyable, en peu de mois, de maniere à saisir tout ce que l'Arithmétique, l'Algebre, & la Géométrie, ont de plus épineux; & cela par la méthode la plus rebutante, à cause des difficultés affectées pour éprouver sa constance. On la verra ensuite assister aux leçons publiques avec d'autres Dames; & enfin, y parler de la maniere la plus propre à se faire écouter. Est-il besoin de dire combien ce nouveau Docteur attirera de spectateurs & d'auditeurs? Mais hâtons-nous de venir au dénouement.

Le Maître & le Tuteur disparurent pour faire place à l'Amant. La gravité, la sévère exactitude, les discours austères, pouvoient rendre moins aimable; mais ils ne purent garantir d'aimer. Heureusement le coeur du Maître & celui de l'Elève se trouverent également pris. Il falut pourtant une occasion décisive pour amener la déclaration. Le poste d'Instituteur du fils du Prince de *Moldavie* fut proposé à *M. de Prémontval*. Ce fut pendant que cette affaire se traitoit, & qu'il attendoit de moment à autre l'heure de son départ, que ne pouvant plus soutenir le feu qui le dévorait, il prit enfin la résolution de le laisser éclater. L'affaire échoua; mais le feu ne s'éteignit point: tout au contraire il ne fit que s'accroître.

Depuis cette époque, *M. de Prémontval* passa encore dixhuit mois à Paris, mais dans une situation violente. Il avoit eu de bonne heure des ennemis, dont le nombre & l'animosité s'accrurent dans les derniers tems d'une maniere excessive. Il assure qu'il se vit vingt fois sur le point de succomber sous des embûches de toute espee, & que tout sembloit avoir conjuré sa perte. Il y a sans doute de la réalité dans ces assertions; mais nous savons que *M. de Prémontval* se représentoit quelquefois trop fortement les objets, que son imagination ardente les grossissoit, & que l'énergie de ses expressions alloit au moins de pair avec la vivacité de ses sentimens.

Ceux qui lui en vouloient, étoient, selon lui, quelques Professeurs, & la plupart des Maîtres de Mathématiques, qui portoient envie à l'éclat de ses Conférences; c'étoit la Cabale-Jésuitique, déchaînée par des raisons auxquelles nous reviendrons tout à l'heure; c'étoient





enfin les partisans de *M. Rollin*, traité avec peu de ménagement dans *l'Esprit de M. de Fontenelle*, qui venoit de paroître, & l'Abbé des *Fontaines*, qui, s'étant reconnu dans le même Livre, valoit bien seul une Légion d'adversaires. Au reste cet *Esprit de Fontenelle* est une des meilleures collections de ce genre qui aient été faites: il faisoit bien de l'esprit, & du meilleur, pour saisir & rédiger ainsi celui du plus spirituel, peut-être, de tous les Ecrivains.

Les Jésuites, si puissans & si redoutables alors, s'étoient aperçus que *M. de Prémontval* qu'ils avoient eu pour disciple, n'étoit pas des plus attachés à l'Eglise Romaine; car, dans plus d'une occasion, il avoit non seulement laissé transpirer de simples doutes, mais il avoit donné l'essor aux objections les plus hardies. Cependant il auroit pu devenir suspect, sans être formellement haï & persécuté, s'il n'avoit eu une Controverse avec le plus accrédité des Membres de la Société, & n'eût composé à cette occasion un Ecrit, dont le titre seul ne permet pas de douter combien il dut déplaire. Ce sont les *Lettres contre le Dogme de l'Eucharistie, tel qu'il est enseigné par l'Eglise Romaine, adressées en 1735 au fameux Père Tournemine*. *Suite, par André Pierre le Guai de Prémontval, pour lors âgé de 19 ans, Etudiant en Philosophie au Collège du Pléssis Sorbonne à Paris.* Quelque raison que pût avoir le jeune Antagoniste dans le fond même de la dispute, il paroïsoit avoir trop de tort dans la manière de l'exposer, pour que cette démarche ne lui fût pas imputée à titre de péché irrémissible.

Dans une pareille crise le plus sûr étoit de s'éloigner; & c'est aussi le parti que prit *M. de Prémontval*. Mais déjà uni par des liens, sinon sacrés, du moins indissolubles, avec l'objet auquel étoit attaché le bonheur du reste de sa vie, les deux Amans quittèrent Paris ensemble, & partirent à pied, n'emportant pour toute ressource qu'une somme très modique, provenue de la vente de leurs meilleurs effets. *M. de Prémontval* avoit pris un passeport pour un domestique & pour lui. Le domestique fut sa tendre compagne jusqu'à Genève, où elle prit la qualification de Neveu, jusqu'à ce qu'elle eût acquis celle d'Épouse. Les risques & les fatigues de ce voyage figure



reroient dans un Roman, & y exciteroient l'intérêt le plus attendrissant. On en trouve le détail dans les Mémoires de Mr. de *Prémontval*, qui a jugé à propos de les enveloper sous le voile d'un récit allégorique.

Arrivés à Geneve dans l'Été de 1744. le couple fidele quitta cette Ville pour aller à Bâle vers la fin de Décembre. Ils furent deux ans errans de Ville en Ville, & gagnèrent leur vie en donnant des leçons à la jeunesse. L'idée de leurs besoins n'étoit pas celle qui les affectoit le plus; ils aspiraient avec ardeur à ferrer solennellement les noeuds de leur union au pied des Autels: & après avoir surmonté divers obstacles, ils eurent enfin cette ravissante satisfaction. Ce fut le digne Mr. *Buxtorff*, Pasteur de Bâle, qui leur donna la bénédiction nuptiale, à *Locrach*, petite Ville d'Allemagne, distante de Bâle de deux lieues, sur les terres & sous l'autorité de S. A. S. Monseigneur le Prince de Bade Durlach, le 30 Juin, 1746. Ils avoient abjuré précédemment les erreurs de l'Eglise Romaine pour se ranger au Protestantisme. On s'empressa de tendre une main secourable à des Profélytes de l'acquisition desquels on avoit tout lieu de se féliciter. Ils trouverent dans Mr. d'*Eshischens* un Patron généreux dont leur coeur reconnoissant n'a pas négligé d'exalter les bienfaits. Mrs. *Bernoulli*, dont le nom seul a toujours fait l'éloge, paroissent aussi avec distinction dans la liste de ces illustres Bienfaiteurs que Mr. de *Prémontval* a lui-même placés au Temple de Mémoire.

Le plus long séjour de Mr. de *Prémontval* en Suisse a été dans la Ville de Morges, où il fut chargé de fonctions publiques. Il adressa un Discours aux Citoyens de cette ville en Septembre 1741. Il étoit à *Eshischens* le 16 Février 1749. Il a daté la troisième Partie de ses Mémoires de ce lieu, & de ce jour auquel finissoit sa trente-troisième année. Et c'est ici où je perds le secours de ces Mémoires qui ne s'étendent pas plus loin.

Des raisons dont le détail ne m'est pas suffisamment connu, engagèrent Mr. & Me. de *Prémontval* à quitter la Suisse; & à passer en Hollande. Ils arriverent à la Haye le 17 Septembre 1749, & y ont toujours séjourné, à l'exception d'une quinzaine de jours passés à Amsterdam. Les talens distingués & les qualités estimables de Mr. & de



M<sup>lle</sup>. de *Prémontval* les firent bientôt connoître & rechercher. Ils eurent des amis & des protecteurs; & les disciples ne leur manquèrent pas. Tous les états ressembloient pour eux à l'abondance, parce que disposés naturellement, & exercés par un long usage, à une frugalité qui n'en cédoit rien à celle qu'on admira le plus dans quelques Philosophes de l'Antiquité, ils avoient très-peu de besoins, & encore moins de desirs.

Ce fut peu après son arrivée en Hollande que Mr. de *Prémontval* fit imprimer les Mémoires dont nous avons déjà fait plus d'une fois mention, & qu'il répandit le Projet d'un Ouvrage, déjà fort avancé quant à la composition, mais dont la publication n'a été terminée que depuis son arrivée à Berlin. C'est la *Monogamie*, dont je donnerai le plan dans les propres termes de l'Auteur. „Je fais voir, dit-il d'abord, sur quelles autorités de l'Ecriture toutes les Sectes Chrétiennes, peut-être sans le savoir, s'accordent à rejeter la Polygamie. „Ensuite, je prouve combien les ennemis du Christianisme ont tort de nous reprocher l'abolition de cet usage. Pour cela, j'étale aux yeux toute l'injustice & toutes les conséquences funestes de la pluralité des femmes, dont l'une des moindres est d'être aussi contraire à la propagation qu'on croit communément qu'elle y est favorable: ce que je démontre, tant par le raisonnement que par l'expérience, & par l'exemple même de la Chine, que les Incrédules objectent sans cesse avec une hauteur que j'espère rabattre un peu. Je répons aussi à toutes les difficultés qu'ils opposent, & surtout à celle des transmigrations des Peuples du Nord, qui, n'ayant cessé que depuis l'introduction du Christianisme chez ces Peuples, semblent prouver qu'ils sont devenus moins nombreux, & cela par l'abolition de la Polygamie. Enfin, je mets les choses dans un tel jour que, bien loin d'avoir servi la Religion, je lui aurois porté le coup le plus terrible, si je ne faisois voir le parfait accord de l'Ancien Testament sur cet article avec le Nouveau, en démontrant sans réplique que, bien loin que la Loi de Nature, & celle de Moïse, aient jamais toléré ce pernicieux & détestable usage, elles l'ont condamné d'une manière encore plus expresse que n'a fait le Christianisme.” Il y a dans cet Ouvrage, comme dans



dans tous ceux du même Auteur, des choses bien vues & bien présentées ; mais il y manque une espece de dénouement, ou de dernière solution, qu'il avoit promise, & qu'il n'a pas donnée.

Une méprise assez singuliere fit enfanter à *Mr. de Prémontval*, pendant son séjour en Hollande, une brochure dont je ne crois pas même devoir rapporter le titre. La plupart des démêlés réels entre les gens de lettres méritent de rester ensevelis dans l'oubli : à plus forte raison les démêlés imaginaires.

Quels que soyent les agrémens qu'offrent les Provinces-Unies à ceux qui les habitent, & en particulier à ceux qui cultivent les Lettres, *Mr. de Prémontval* tournoit ses vnes de divers autres côtés ; & elles commençoient à se fixer sur l'Angleterre, qui a toujours eu beaucoup d'attraits pour ceux qui aiment la liberté de penser. Il y avoit cependant une contrée où il lui convenoit encore mieux d'achever sa carrière. C'est celle qui a le bonheur de vivre sous la domination d'un Monarque, plus grand encore par ses lumieres & ses vertus que par son rang & ses exploits. Notre Académie en particulier, depuis son renouvellement, offroit à *Mr. de Prémontval* une Compagnie où il seroit à portée de mettre ses talens en pleine valeur. Mais il falloit quelques facilités à venir former ici un établissement ; & voici celles qui applanirent la route.

*Madame de Prémontval* avoit eu l'honneur, & ce qui vaut encore mieux, le bonheur de faire la connoissance de *Madame la Comtesse de Kamcke* à la Haye, chez *Madame l'Ambassadrice Comtesse de Golowkin* sa mere, & de l'y voir presque journellement. L'état des Epoux étoit alors assez triste, n'ayant rien de fixe, & ne vivant que de quelques leçons. *Madame de Kamcke*, qui avoit conçu pour *Madame de Prémontval* des sentimens conformes au mérite de l'une & de l'autre, prit un tendre intérêt à cette situation, & proposa à *Mr.* & à *Mme. de Prémontval* de s'adresser à quelque ami puissant à Berlin, au cas qu'ils y en eussent. *Madame de Prémontval* se rappella aussitôt que *Mr. de Maupertuis* étoit souvent venu chez son pere, & l'y avoit vue fort jeune. Guidée donc par les conseils de la Comtesse, elle écrivit à notre Président, demandant une place pour son Epoux. *Mr. de Maupertuis* répondit de la façon



çon la plus obligeante, assurant qu'il en parleroit à S. M. Peu de tems après, une seconde Lettre fit connoître que la tentative n'avoit pas réussi, & qu'il falloit prendre patience. Un an s'écoula sans entendre parler de rien ; mais, au bout de ce terme, il vint tout à la fois des Lettres de Madame la Comtesse & de Mr. de *Maupertuis*, qui offroient à Madame de *Prémontval*, de la part de S. A. R. Monseigneur le Prince HENRI, une pension de deux cens écus, & quatre cens écus pour le voyage. Sous de si glorieux auspices, Mr. & Mme. de *Prémontval* partirent de la Haye le 14 Fev. 1752, & furent accueillis à Berlin, comme ils l'auroient mérité indépendamment de toute considération externe. Mr. de *Maupertuis* en particulier, qui étoit aussi propre à juger du mérite que disposé à le favoriser, ne tarda pas à ouvrir les portes de l'Académie à Mr. de *Prémontval*, qui fit son Discours de réception le 6 de Juillet de la même année.

Ce nouvel état fournit de nouvelles vues au nouvel Académicien. Quoiqu'il eût fait jusqu'alors de la Philosophie son principal objet, il n'avoit pas eu occasion de se mettre au fait d'une des doctrines, qui sont aujourd'hui du nombre de celles qu'on peut appeller régnautes, & qui a l'Allemagne pour siege de son empire, c'est celle de *Leibnitz*. Attaché à la Classe de notre Académie qui a pour objet la Philosophie spéculative, il se jeta, pour ainsi dire, à corps perdu dans les abîmes de la Métaphysique, & porta partout une sonde qu'il manioit avec beaucoup de dextérité. Cherchant le foible des hypothèses les plus accréditées, il savoit l'exposer avec beaucoup de force ; & il rencontroit peu d'édifices qu'il n'ébranlât à force de les sapper. Frappé de la multitude d'assertions gratuites, d'inconséquences, d'équivoques, de fausses vues, qui regnent dans les Ouvrages qu'on regarde comme les plus philosophiques, il auroit voulu les détruire, les pulvériser en quelque sorte, afin d'élever sur leurs ruines un Temple simple & majestueux à la Vérité. C'est au moins ainsi qu'il nous a toujours annoncé ses entreprises ; & il faut avouer qu'il tenoit une bonne partie de ce qu'il promettoit. Personne ne savoit mieux que lui suivre le fil d'une analyse, manier les distinctions, & tirer quelquefois l'or de la boue, mais beaucoup plus souvent la boue de ce qui avoit jusqu'alors passé pour de l'or.





Deux choses seulement empêchoient que ses recherches ne produisissent tout l'effet dont elles étoient susceptibles. La première, c'est que s'y livrant d'abord avec une extrême ardeur, qui étoit chez lui ce que la verve est chez les Poètes, il ne pouvoit s'en occuper qu'autant que cette verve deroit ; de sorte que, lorsqu'elle ne le soutenoit pas jusqu'au bout, l'ouvrage demeurait imparfait. Nous l'avons remarqué à l'égard de sa Monogamie ; & c'est le cas de plusieurs autres de ses Ecrits. Le second inconvénient qui traversoit ses succès, c'est que ne pouvant presque travailler de sang froid, (& en disant cela, je ne fais que répéter ce qu'il a souvent déclaré,) il s'exagéroit trop fortement à lui-même l'importance des matières qu'il traitoit, ou les défauts des Ouvrages dont il faisoit l'objet de sa critique. Au lieu de s'en tenir à ce conseil que dicte l'humanité, & peut-être encore plus l'amour propre suffisamment éclairé ; *Non ego paucis offendar maculis* : il vouloit du parfait à la rigueur, & ne rabattoit absolument rien de ses prétentions. Mais, si après avoir tant détruit, il avoit assez vécu pour édifier, il auroit vu sans doute que ceux qui ont réussi dans ce genre méritent de l'indulgence, & que le meilleur Ouvrage n'est jamais un Ouvrage accompli, mais seulement celui qui a le moins de défauts ; *optimus*, dit le même Oracle, *qui minimis argetur vitiis*. Quoiqu'il en soit, les productions de Mr. de Prémontval étoient recommandables à plusieurs titres ; le fond en offroit toujours du neuf, de l'intéressant ; on y voyoit la pénétration alliée à la profondeur : & la forme même attachoit par un ton d'enthousiasme philosophique, d'où naissoient plusieurs tours originaux. Les *Pensées sur la Liberté*, le *Traité du Hazard sous l'Empire de la Providence*, & le *Diogene de d'Alembert*, ou *Pensées libres sur l'homme*, parurent en 1754. Le dernier de ces Ouvrages fut réimprimé en 1755. augmenté de près d'un tiers.

Dans cette dernière année, Mr. de Prémontval fut distrait de ses études par une espèce de procès au sujet de l'éducation d'un enfant qu'il avoit comme adopté, dans le dessein de l'initier aux connoissances dont il le trouveroit capable. Le Factum qu'il publia sur ce sujet est propre à justifier l'extrême desir que Mr. de Prémontval le pere auroit eu de pousser son fils au Barreau.



La Métaphysique reprit le dessus ; & notre Académicien rassembla plusieurs Pièces relatives aux objets de cette Science, dont il forma deux Volumes, sous le titre de *Vues philosophiques, ou Protestations & Déclarations sur les principaux objets des connoissances humaines*. Ils furent imprimés à Amsterdam, en 1757. Il y est principalement question du Leibnitianisme & du Wolfianisme, dont les principales doctrines excitoient dans Mr. de Prémontval un sentiment qui tenoit de l'indignation. Il vouloit frapper de grands coups ; mais il ne faisoit pas toujours attention qu'en y mettant trop de force, il en diminuoit l'effet, parce qu'il faisoit soupçonner quelque passion. Il pensoit aussi, (& ce desir est très légitime en soi,) à se faire une réputation, ou à augmenter celle qu'il possédoit déjà. Mais c'est un de ces cas où il faut paroître demander le moins pour obtenir le plus. Au fond personne ne savoit mieux que Mr. de Prémontval, ce qu'il y a de fortuit & de capricieux dans les réputations ; il a fait là dessus quelques morceaux pleins de génie & de finesse.

Mr. de Prémontval étoit un Académicien zélé & laborieux ; toujours livré à la méditation, toujours enfoncé dans son Cabinet, il n'en sortoit presque que pour nous entretenir ; & il auroit été difficile de ne pas l'écouter, tant il mettoit d'action dans ses lectures, & savoit faire passer le feu dont il étoit rempli dans l'ame de ses Auditeurs. Nos Mémoires contiennent plusieurs de ses Dissertations ; & l'on inférera celles qui n'ont pas encore paru dans les Volumes dont l'impression vient de recommencer, & sera continuée sans interruption.

Je me rappelle aussi qu'il a eu part à un Ouvrage périodique qui paroissoit à Berlin, & qui avoit des Auteurs d'un mérite distingué.

M. de Prémontval sembla changer d'objet vers la fin de l'année 1758. Il répandit l'annonce d'un nouvel Ouvrage, où il se proposoit de maintenir les prérogatives & la pureté d'une Langue qui a en effet de très grands avantages sur la plupart des autres, & qui a fourni des chefs-d'oeuvre presque dans tous les genres. Il est naturel qu'une semblable Langue s'altère dans des lieux éloignés de son séjour natal, & que des Ecrivains qui ne l'ont pas apprise en naissant, & puisée à sa source, s'écartent, tantôt de ses règles, tantôt de son génie. Je ne sai  
pour





pourtant si ce n'est pas en France même qu'il faudroit aller chercher les premières causes de la corruption de la Langue Françoisé ; au moins seroit-on tenté de le croire, quand on lit les vifs reproches que les meilleurs Ecrivains & les Critiques les plus estimés ne cessent de se faire les uns aux autres sur ce sujet, au sein de la Nation, & au milieu de la Capitale. Quoiqu'il en soit, le projet du *Préservatif* étoit judicieux, l'exécution pouvoit en être utile, & elle étoit très bien entre les mains de Mr. de Prémontval, qui avoit soigneusement étudié les plus habiles Grammairiens, & qui, joignant les connoissances philosophiques aux connoissances grammaticales, avoit par là une supériorité bien marquée. Il y auroit de l'affectation à passer ici sous silence la part que j'eus, contre mon attente, à cet Ouvrage, & la place que j'y occupai. J'ai toujours été dans l'idée que je n'avois, ni assez de célébrité pour qu'on dût se borner à instruire le public à mes dépens, ni assez de défauts pour être immolé comme victime à la Critique. Mais j'en dis plus dans ce moment que je n'en ai dit pendant toute la publication du *Préservatif*, où je me suis imposé la loi du plus parfait silence, & où mon coeur lui-même, quoiqu'il dût sembler ulcéré, s'est tu, puisque je n'ai jamais cessé d'estimer non seulement dans Mr. de Prémontval l'Ecrivain, mais même d'aimer l'homme. A la fin j'ai eu la satisfaction de l'en voir convaincu, & de le serrer dans mes bras aussi cordialement qu'il s'y est jetté. Pourquoi faut-il que j'aie si peu joui de ce retour ?

Le *Préservatif* avoit changé d'objet assez longtems avant le fait que je viens d'indiquer. Mr. de Prémontval y fit entrer ses idées sur l'éducation, parce qu'ayant des talens décidés pour former la jeunesse, il avoit consenti à se charger de quelques Eleves, & que, suivant sa coutume, il s'étoit livré & consacré tout entier à ce travail. On a vu avec étonnement les progrès que de jeunes gens d'un naturel très différent ont fait sous sa direction, & sous celle de Madame son Eponse, dont les talens & le caractère combinés avec les siens formoient le juste tempérament propre à produire une éducation d'un ordre aussi distingué. Les examens de ces Eleves, faits en présence des personnes les plus capables d'en juger, ont excité des applaudissemens aussi vifs que sin-



ceres. C'est ce qui donna lieu à Mr. de *Prémontval* de remonter aux premiers principes de cet art, le plus intéressant de tous, & de mettre au creuset ce qu'en avoient dit les Auteurs les plus célèbres dans ce genre. C'est le sujet des derniers Discours qu'il a lus dans nos Assemblées, & des dernières Parties du *Préservatif*. Toujours vigoureux dans ses attaques, il ne portoit gueres de coups à faux; mais il se mettoit souvent hors de mesure par la maniere dont il les portoit.

Tant de force annonçoit une longue vie; mais elle pouvoit aussi en présager la fin. Mr. de *Prémontval* avoit perdu, comme nous l'avons vu, dès l'entrée de sa carrière les secours qu'un tempérament très heureux auroit pu lui fournir jusqu'à la vieillesse, s'il avoit su le ménager. Depuis ce tems là, (comme il l'a souvent répété de vive voix & par écrit,) il n'a rien fait qu'avec effort, aux dépens de sa tête, de ses yeux, de son sommeil. Cet effort multiplié par celui que produisoient sa façon d'envisager les objets & sa facilité à se passionner, ne pouvoit que devenir ruineux. Il avoit le foible de croire qu'on le haïssoit, qu'on vouloit lui nuire, qu'on cabaloit même contre lui, (ce sont les derniers mots de sa dernière lecture à l'Académie,) tandis qu'on étoit très disposé à l'estimer & à l'aimer, à l'obliger & à lui rendre service. Je ne sais si la fermentation de toutes ces idées a eu quelque influence sur la maladie imprévue à laquelle il a succombé; mais, le Samedi 18 Aoust, après avoir diné chez Mr. le Prince *Dolgorucki*, il rentra chez lui légèrement indisposé, & le mal ayant fait des progrès les jours suivans, avant qu'on eût pu y porter obstacle, ou plutôt parce qu'il se refusa lui-même aux premiers secours de l'art, une fièvre inflammatoire prit son siege dans le cerveau, & ne lui laissa presque plus aucun intervalle de liberté d'esprit. Après quelques jours passés dans une léthargie à peu près continuelle, il mourut le 2 Septembre 1764, dans sa 49 année. Il ne laisse point d'autre postérité que celle de son esprit; mais, s'il a du regretter quelque chose ici bas, c'est la société délicieuse d'une Epouse, qu'on peut incontestablement appeller son plus bel Ouvrage.





## E L O G E

D E

M. LE BARON DE DANCKELMANN \*).

Ce n'est pas simplement pour suivre un usage reçu que nous commençons par l'extraction du digne Ministre que l'Académie se félicite d'avoir compté au nombre de ses membres; & en parlant de la famille *Danckelmann*, je n'ai pas dessein de vous présenter un simple Arbre Généalogique. Ce sera plutôt cet Arbre dont une Lyre inspirée a dit qu'il étoit planté au bord des eaux courantes, qu'il rendoit du fruit en sa saison, & que son feuillage ne se flétrissoit jamais. S'il y eût jamais une tige & des rameaux qu'on puisse reconnoître à ces caractères, c'est ici que nous les rencontrerons. Je ne remonterai point pourtant à la tige proprement dite. On la trouve en Westphalie, où les *Danckelmanns* étoient déjà fort considérés parmi l'ancienne Noblesse, avant que la Cour Electorale de Brandebourg fût témoin d'une espèce de prodige dont le souvenir mérite d'être transmis à la postérité la plus reculée. C'est de voir sept frères occuper en même tems les charges les plus importantes de l'Etat, n'en être redevables qu'à leur mérite, les exercer avec autant de fidélité que de capacité, & se montrer plus grands encore dans les revers que l'envie leur suscita que dans leur élévation. Ce fut pendant le brillant période de celle-ci qu'un des plus habiles Médailleurs d'alors, *Raymond Fultz*, grava une Médaille, où l'on voit d'un côté les Pleïades dans le firmament, avec ce mot d'*Horace*, *Intaminatis fulget honoribus*, & au revers cette Inscription: *Pleïadi fratrum qui Principi Opt. Max. FRIEDERICO III. Elect. Brand. se funque omnia prisca soldaviorum lege devoverunt.* Le célèbre Professeur à Goettingue, M. *Jean David Koehler*,

Yyy 3

en

\*) Lu dans l'Assemblée publique du 6 Juin.



en donnant l'explication de cette Médaille, a rapporté toutes les particularités historiques qui servent à faire connoître Messieurs les sept freres de *Danckelmann*; & je renvoye ceux qui veulent s'en instruire à l'Original Allemand, ou à la traduction que j'en ai donnée en 1740. Je n'ai pas plus de tems qu'il ne m'en faut, si je veux demeurer dans les bornes ordinaires des Eloges académiques, en m'attachant à bien faire connoître l'objet de celui-ci.

CHARLES LUDOLPHE, Baron de *DANCKELMANN*, Ministre d'Etat & de Guerre, Chef du Departement Ecclésiastique, Président du Consistoire suprême Luthérien, du Directoire des Eglises Reformées, du Consistoire de la Marche Electorale, du Directoire des Eglises des pauvres, de celui de l'Eglise du Dôme & du College de Joachim, Curateur en chef & Directeur de toutes les Universités & de tous les Colleges, aussi bien que de la Bibliothèque, Président du Consistoire supérieur françois, du grand Directoire François, & du Mont de piété, Seigneur héréditaire de *Lodersleben*, *Ophausen*, & autres lieux, Honoraire de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres, nâquit à minuit entre les mois de Septembre & d'Octobre 1699. v. st. de *Nicolas Barthélemi*, Baron de *Danckelmann*, Ministre d'Etat du Roi, & Président de la chambre des Finances du Duché de Magdebourg, Baron de *Prangin*, dans le païs de *Vaux*, Seigneur de *Silpitz*; & de *Sophie Magdelaine de Brömse*, Dame de *Burggrube*, Terre immédiate en Franconie, acquise depuis par le Prince de *Schwartzemberg*. M. de *Danckelmann* le pere étoit le sixieme Astre de la Pleiade dont nous avons parlé; le plus rayonnant avoit été le quatrieme, *Eberhard*, premier Ministre & grand Président, mort en 1721, à l'âge de 79 ans.

La fécondité de Madame de *Danckelmann* lui couta la vie. Elle avoit eu trois fils & trois filles avant *Charles Ludolphe*, & elle mourut le 4 Juin en couche d'une fille, qui a été mariée en 1728 à *Jean George Comte de Solms*. Les trois Freres aînés de M. de *Danckelmann* ayant payé le tribut encore avant leur Mere, il se trouva fils uni-



unique avec trois sœurs aînées, qui sont mortes toutes trois à l'âge de 26 ans, la première & la troisième ayant été mariées successivement à *Jean Adam*, Baron d'*Ende*, Conseiller à la Régence de Magdebourg & Capitulaire de la Cathédrale d'Halberstadt; & la seconde à *Philippe Antoine de Grumkow*, Ministre d'Etat, premier Président de la Poméranie, & Chevalier de l'Ordre de l'Aigle noire.

L'éducation de M. de *Danckelmann* fut confiée en 1708 à M. *Heinius*, depuis Conseiller Provincial de Poméranie & Syndic de Colberg, frère aîné de M. le Docteur *Heinius*, l'un des Directeurs de l'Académie, & Recteur du Collège de Joachim, qui ne recevra peut-être jamais d'éloge plus touchant pour lui, & mieux mérité, que celui que je vais copier d'un Manuscrit original de M. de *Danckelmann*, que j'ai sous les yeux, & qui me guide dans la composition de cet éloge, mais ne me conduira pas jusqu'à la fin. „Le Docteur *Heinius*, dit l'illustre défunt, ayant été appelé quelques années après „en qualité de Professeur à Halle, je profitai des instructions de ce „Savant solide, qui depuis ce tems-là m'a toujours conservé son amitié.“ Heureux & remarquable effet de la solidité de l'esprit & des connoissances, qui décide de celle des sentimens & des liaisons!

En 1711 M. de *Danckelmann* le père envoya son fils avec son gendre le Baron d'*Ende* à *Torgau* pour y assister à la célébration du mariage du Czarowitz avec la Princesse de Brunswick-Blanckenburg. Le coup d'oeil de cette solennité ne pouvoit être plus brillant. Outre le Czar & la Reine de Pologne, on y vit le Duc *Antoine Ulric* de Brunswick avec son fils le Duc *Rudolphe Auguste*, & la Duchesse son Epouse. Quelque jeune que fut alors M. de *Danckelmann*, il fut accueilli de la manière la plus gracieuse par toute la Sérénissime Maison de Brunswick, à la Cour de laquelle son père avoit été plusieurs fois envoyé par le Roi. Il fut présenté au Czar par son Conseiller privé le Baron d'*Hyffen*, qui avoit été auparavant Gouverneur du Conseiller Impérial Aulique de *Danckelmann*, cousin du nôtre. Le Czar ne tenant pas une place moins distinguée parmi les grands hommes que  
parmi





parmi les puissans Monarques, ses dits & gestes méritent d'être recueillis, quand l'occasion s'en présente. Dans la pensée qu'on lui présentait un fils du grand Président, il dit en Hollandois; *C'est un bien brave homme; mais comment a-t-il un fils si jeune?* Là dessus M. d'Huyssen ayant répondu que c'étoit un fils du Président de Halle, qui avoit eu l'honneur d'être connu de S. M. Imp. à Ryfwiek, le Czar repliqua: *C'est aussi un brave homme: ils sont tous de braves gens; & fit quelques caresses affectueuses au jeune Danckelmann, dont il venoit de louer si énergiquement la famille.*

Une fête plus auguste encore, le Couronnement de l'Empereur CHARLES VI. conduisit Mrs. de Danckelmann & d'Ende vers la fin de 1711 à Francfort sur le Main, d'où ils furent de retour au commencement de 1712.

Au Printems suivant, M. de Danckelmann le pere mena son fils avec lui dans un voyage qu'il fit en Westphalie. Ils passerent quelques jours au Château de Saltzdahl, comblés des bontés du Duc Antoine Ulric.

Les humanités de Mr. de Danckelmann étant finies, il fut question de ses études académiques. On vouloit l'envoyer à Utrecht; mais le Roi FRÉDÉRIC GUILLAUME, qui regnoit depuis un an, en refusa la permission. Il fallut donc s'en tenir à l'Université de Halle, & aux instructions de Mrs. Thomasius, Gundling, Boehmer, & Ludwig. Comme M. de Danckelmann avoit du goût & de la facilité pour l'étude des langues, il employa ses momens de loisir à apprendre l'Italien, l'Espagnol, & Anglois, qui lui ont été utiles dans la suite.

En 1715, le jour de l'anniversaire de la naissance de GEORGE I. Roi de la grande Bretagne, M. de Danckelmann prononça le Panégyrique de ce Prince; & quelque tems après, ayant subi les examens accoutumés, il soutint sans Président une These de *pacis & mandatis Principis captivi*. La lecture de l'histoire de FRANÇOIS I. avoit fait naître l'idée de cette matiere à l'Auteur de la dissertation; mais on s'avisa



s'avisâ d'en faire des applications à un événement qui fixoit alors l'attention de toute l'Europe, à la détention de CHARLES XII. à *Bender*, & il ne tint pas à quelques mal-intentionnés que M. de *Danckelmann* n'eût des défagrémens à ce sujet.

Les voyages, dans le plan ordinaire de l'éducation, suivent les études, quoiqu'on n'ait pas encore décidé de la validité des raisons sur lesquelles ce plan est fondé. C'étoit encore une grace difficile à obtenir du Monarque, M. le Chancelier de *Grumkew*, pendant un séjour que FREDERIC GUILLAUME fit à *Lupow*, petite ville de Poméranie qui lui appartenoit, sollicita une permission pour son beau-frere, & réussit, à condition que le voyage commenceroit par une Campagne contre les Turcs, où M. de *Danckelmann*, non moins observateur qu'acteur, feroit des observations dont il enverroit régulièrement les rapports. La paix de *Passarowitz* qui fut conclue sur ces entrefaites fit évanouir ce projet. Mais le Comte de *Virmont* ayant été nommé en 1719 pour l'ambassade de Vienne à Constantinople, M. de *Danckelmann* le pere obtint que son fils seroit de la suite, & tous les arrangemens furent pris en conséquence.

Avant que d'entreprendre ce voyage, M. de *Danckelmann* fit un tour à *Stargard*, pour y voir sa Soeur de *Grumkew*; & à son retour à Berlin, il eut la satisfaction d'y trouver son Oncle le grand Préfident, & anciennement premier Ministre de FREDERIC I. que le Roi avoit fait revenir de *Peitz*, où il avoit été confiné lors de sa disgrâce.

Opposons ici un trait de la modestie & de la sagesse qui ont caractérisé M. de *Danckelmann* jusqu'à la fin à la présomption & à la légèreté si ordinaires dans la situation & à l'âge où il se trouvoit alors. Au lieu de s'empresse à jouir du privilege qu'exprime le *cusula remota* d'*Horace*, il avoit prié Monsieur son Pere de permettre que son Gouverneur *Heinius* l'accompagnât dans ses voyages; mais le pere, jugeant par cette demande même qu'il étoit superflu de l'accorder, mitigea cependant son refus, en liant son fils à un Compagnon de voyage,





lui fut aussi agréable, sans lui être moins utile; c'étoit M. de *Wülckenitz*, de *Reinsdorff*, depuis Ministre d'Etat & Président de la Régence à *Cassel*, & actuellement Ministre plénipotentiaire du Landgrave à la Diète de *Ratisbonne*. Mrs. de *Danckelmann* & de *Wülckenitz*, peres, étoient d'anciens amis; leurs fils avoient étudié ensemble, celui de M. de *Wülckenitz* avoit quelques années de plus, & toutes les convenances ne pouvoient être plus heureusement assorties.

On trouve peut-être que j'insiste un peu trop sur les préliminaires du voyage de M. de *Danckelmann*; mais c'est pour préparer en quelque sorte & amener le récit d'un coup imprévu qui le rompit, & dont la premiere surprise fut bien douloureuse. Le rendez-vous pour le départ étoit *Wetzlar*, & M. de *Danckelmann* s'y rendit après avoir pris congé de son pere à *Magdebourg*, où la Regence de ce Duché dont il étoit Président avoit été transférée de *Halle*. Un procès de famille qui étoit pendant devant la Chambre Impériale, arrêtoit pour quelques jours M. de *Danckelmann* à *Wetzlar*, lorsque M. de *Cannengiesser* qui y résidoit de la part du Roi, & qui étoit de ses amis, lui fit part d'une lettre qu'il venoit de recevoir de *Magdebourg*, par laquelle un de leurs amis communs le chargeoit d'apprendre à M. de *Danckelmann* que son pere avoit été arrêté à sa terre de *Freyensfelde*, près de *Halle*, & conduit prisonnier à *Magdebourg*, d'où il avoit été transporté à *Spandau*. On ajoutoit, que sa santé ni sa tranquillité ne paroissent point avoir été altérées par cette catastrophe. M. de *Danckelmann*, en apprenant cette sinistre nouvelle, comprit pourquoi il n'avoit pas encore reçu les derniers ordres du Roi au sujet du voyage de *Constantinople*, qu'il attendoit depuis quelque tems. N'ayant d'ailleurs aucune Lettre de sa famille qui lui donnât plus de lumieres sur la cause de cette détention, ce silence l'étonna; & il prit le parti d'aller voir lui-même sur les lieux dequoi il s'agissoit. Il ne dit adieu qu'au Grand-Juge de *Fürstemberg*; & comme il étoit à table chez lui, ce Prince reçut des avis qu'il y avoit des défenses très séveres en Prusse de mander rien de ce qui s'y passoit.



M. de Danckelmann quitta *Wetzlar*, l'esprit aussi fortement agité qu'on peut se le représenter dans de pareilles conjonctures; il arriva la seconde fête de Noël à *Mersebourg*, & ayant dépêché de là un homme de confiance à son beau-frere, M. le Baron d'*Ende* à *Halle*; à son retour il fut pénétré de la plus vive satisfaction, en apprenant que son Pere avoit été remis en liberté le troisieme jour de son arrivée à *Spandau*, qu'il s'arrêtoit à Berlin par ordre du Roi, & que dans peu il retournoit à *Magdebourg*, pour reprendre l'exercice de toutes ses Charges. Comme en y allant il devoit passer par une terre de M. d'*Ende* en Saxe; le fils avec le gendre s'y rendirent pour goûter la douceur d'un embrassement qu'une revolution si prompte & si favorable rendoit délicieux. La nature parle toujours dans de pareilles occasions, & exerce les droits sur les coeurs les plus sensibles. Quels ne devoient pas être les effets sur ceux d'une famille aussi bien née! Qu'on en juge par la mort de Madame de *Grumbkow*, qui ayant appris la disgrâce de son pere comme elle étoit sur le point d'accoucher, y succomba.

Persuadé que l'intérêt de ce récit affecte encore dans ce moment ceux qui m'écoutent, je ne crois pas le devoir laisser imparfait. Après les premiers transports de la réunion, Mr. de *Danckelmann* le pere raconta à son fils, & à son gendre, que s'étant rendu de *Magdebourg* à la terre de *Freyenfelde* pour y passer les vacances de Noël, il n'y étoit que depuis un jour lorsqu'on lui annonça, la nuit du 10 au 11 Decembre, le Major de *Clermont* du Regiment du vieux Prince d'*Anhalt*. Comme cet Officier étoit connu dans la maison, Mr. de *Danckelmann* se leva pour le recevoir, mais non sans lui témoigner quelque surprise d'une visite si imprévue & à pareille heure. Là-dessus Mr. de *Clermont* lui montra l'ordre du Roi, & lui remontra combien il étoit fâché d'avoir été choisi pour l'exécuter. Il ajouta que les relais étoient commandés sur la route, & qu'il falloit faire mettre incessamment les chevaux au carrosse pour se rendre au premier de ces relais. Mr. de *Danckelmann* ne demanda que le tems de s'habiller & de prendre ce

Zzz 2

dont



dont il avoit le plus de besoin ; après quoi, le scellé ayant été apposé à son cabinet, il partit avec deux officiers dans le carosse & un à cheval qui l'accompagnoient. On avoit pris des précautions fort superflues pour l'arrêter ; toute la cour & les avenues du jardin étoient entourées de soldats qu'on fit retirer dès qu'on vit qu'il n'y avoit pas la moindre ombre de résistance. Les Officiers demandoient souvent sur la route où ils étoient, ce qui fit comprendre à *Mr. de Danckelmann* qu'ils craignoient que dans l'obscurité de la nuit on ne prit la route de la Saxe ; mais il leur dit en riant qu'ils se tranquillifassent, & qu'ils avoient la Saxe derriere eux. L'état de sa conscience lui laissoit la sérénité la plus parfaite, & ne l'obligeoit point à se soustraire aux recherches intentées contre lui.

Arrivé à *Magdebourg*, *Mr. le Lieutenant-Général de Stille*, Commandant de la Ville, le vint voir, & lui permit de passer la nuit dans sa maison sous bonne garde. On rassembla les papiers de son cabinet & de tous ses appartemens, pour les envoyer à *Berlin*. On l'y conduisit ensuite lui-même ; & en changeant de chevaux à *Wustermarch*, il apprit que *Mr. de Kammecke*, Ministre d'Etat, & *Madame de Blaspiel*, venoient d'être conduits à *Spandow*, où il arriva peu après. Il y fut deux jours sans voir personne. Le troisieme, *Mrs. d'Ilgen*, *de Knyphausen*, & *de Katfch*, Ministres d'Etat, se firent annoncer. *Mr. de Danckelmann* ne douta pas que ce ne fût pour l'examiner. Mais *Mr. d'Ilgen* lui dit en entrant qu'ils venoient lui annoncer la liberté, & que le Roi l'ayant trouvé innocent, l'assuroit de ses bonnes grâces ; qu'il étoit le maître de se rendre à *Berlin* où il s'arrêteroit cependant jusqu'à nouvel ordre. *Mr. de Danckelmann*, en témoignant combien il étoit sensible à la justice du Monarque, pria les Ministres de l'instruire, avant qu'il quittât *Spandau*, des raisons pour lesquelles on l'y avoit mené. Ils lui répondirent qu'il les apprendroit à *Berlin*, & qu'il verroit que *S. M.* s'étoit trouvée dans la nécessité de s'assurer de sa personne. En effet, étant rentré dans la Capitale dès le même soir, il scût que c'étoit sur les accusations du malheureux *Clément* qu'on l'avoit arrêté ;



rété ; mais, dès que *Clément* qu'on gardoit depuis quelque tems à Spandau, avoit appris que *Mr. de Danckelmann* y avoit été conduit, il s'étoit formellement dédit, déclarant qu'il avoit voulu en imposer, & qu'il ne favoit rien à la charge de ce Ministre. Un semblable désaveu garantit quelques autres personnes de distinction d'essuyer la même épreuve. *Mr. de Danckelmann* en sortit avec tout l'éclat de l'innocence pour rentrer dans la confiance de son maître dont il a encore jouï longtems, étant mort dans un âge très avancé.

Ici finit le Mémoire original dont j'ai suivi le fil jusqu'à présent ; ce qui me reste à dire, sera puisé dans ceux que la famille a bien voulu me fournir, & qui ne sont pas moins authentiques. Le voyage de *Constantinople* ayant manqué par une suite des conjonctures qu'on vient de rapporter, *Mr. de Danckelmann* en fit d'autres, depuis 1719 jusqu'en 1723, en qualité de Gentil-homme de la Chambre de *GEORGE I.* Roi d'Angleterre ; & il parcourut l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, la Hollande & les Pays bas. Un discernement exquis, joint à des connoissances fort étendues, lui firent retirer de la vue de ces contrées tous les avantages qui peuvent en résulter.

A son retour il fût pourvû en 1724 d'un Decret d'expectance pour le poste de Conseiller Aulique de l'Empire, & désigné successeur de son cousin, le Baron *de Danckelmann*, fils du grand Président, qui se trouvoit alors à *Vienne* revêtu de cette charge.

Comme on ne sauroit avoir entrée au Conseil Aulique sans s'être préalablement qualifié en faisant les fonctions d'Assesseur dans quelque autre College de Justice, *Mr. de Danckelmann* choisit pour cet effet la Cour de Justice de *Marbourg* qui dépend des deux Maisons de Hesse-Cassel & de Hesse-Darmstadt. Il y fut fait Conseiller en 1725, & demeura dans ce poste jusqu'en 1731. Pendant cet espece de tems il se maria d'abord en 1727 avec *Antoinette Elisabeth de Borcke*, fille du Feld-Marêchal & Ministre du Ca-



binet, *Comte de Borcke*, qui au bout d'un an mourut en couche d'une fille, à présent Epouse de *Mr. de Wedel*, ci-devant Major dans les Gardes. *Mr. de Danckelmann* passa en 1730 à de secondes noces avec *Lucie Sophie de Freyberg*, fille du Conseiller privé de ce nom, Dame d'honneur de Madame la Margrave *Albert*, avec laquelle il a fini sa carrière dans la plus douce union, dont il reste cinq fils & deux filles à qui une excellente éducation a transmis l'héritage des vertus qui ont toujours fait la principale illustration de cette respectable famille.

Entre tant d'excellens principes de Gouvernement, qui ont fait la gloire du Regne précédent, & qui ont préparé celle dont nous avons le bonheur d'être témoins, un des plus marqués & des plus importans étoit de ne jamais perdre de vue les sujets d'un mérite distingué, qui par leur naissance appartenoient à l'Etat, & de ne pas permettre qu'ils consacraient leurs talens à d'autres services qu'à celui de leur Souverain. En partant de là, *FRÉDÉRIC GUILLAUME* ne pouvoit négliger *Mr. de Danckelmann*; & en effet en 1731 il le déclara Conseiller privé de Justice, & le nomma pour succéder au défunt Ministre d'Etat *de Broich* dans la qualité de son Ministre plénipotentiaire à la Diète de l'Empire à *Ratisbonne* au College des Electeurs & des Princes. Il étoit naturel de suivre une vocation aussi honorable; & *Mr. de Danckelmann* s'étant aussitôt rendu à *Ratisbonne*, y fit les fonctions de sa charge avec autant d'application que de succès. Mais une maladie véhémente & opiniâtre qui l'accabla pendant les années 1735 & 1736, & le mit à deux doigts de la mort, ne lui permit pas de soutenir le travail: & comme il n'auroit pu attendre sa guérison d'un simple intervalle de relâche, il sollicita sa démission avec des instances réitérées, qui la lui firent enfin accorder, & feu *Mr. de Pollmann* le remplaça.

Rendu à lui-même, *Mr. de Danckelmann* quitta *Ratisbonne* vers la fin de 1736 avec sa famille qui ne consistoit que dans ses trois fils aînés, & fixa son domicile à *Cöthen*, Ville du pays d'Anhalt,





halt, où il se trouvoit le mieux à portée de toute sa parenté. Il y passa deux ans sans en sortir que pour deux affaires d'héritage qui l'appellerent en Westphalie. Il se transporta de *Cöthen*, à une terre voisine nommée *Alt-Jesnitz*, & située dans le Cercle Electoral de Saxe, qui appartenoit à son beau frere le Baron d'*Ende*. Il y demeura une année entiere, pendant laquelle il perdit en Octobre 1739 Mr. son pere, vénérable Nestor, parvenu à la quatre-vint-dixieme année de son âge. Cette mort lui ayant fait échoir la Seigneurie de *Lodersleben* dans la Principauté de *Querfurt*, il alla bientôt après s'y établir, & régler le partage des terres avec ses cohéritiers.

Le Conseiller Aulique de *Danckelmann*, par son decés arrivé l'année d'auparavant, avoit laissé sa charge à la bienveillance de son successeur désigné. Mais celui-ci ne la trouva plus acceptable, & lui préféra les offres qu'il reçut dans le même tems de la part du Prince GUILLAUME, Stadthouder du Landgraviat de *Hesse-Cassel*, qui, en le déclarant son Conseiller privé, le mettoit à la tête de tous les Colleges de sa Comté de *Hanau*, où Mr. de *Danckelmann* se rendit, toujours accompagné de sa famille, au mois de Septembre 1740. Ici ses talens & l'excellence de son caractère se développerent à plein, lui concilierent une estime universelle, & le firent tendrement aimer de tout le país. Il auroit été bien doux pour lui de jouir longtems de ces agrémens, si supérieurs à ceux de la simple décoration auxquels les Grands ont coutume de se borner; mais des soins essentiels au bien de ses affaires domestiques ne lui permirent absolument pas d'y joindre une administration publique. Il s'agissoit également de la régie de ses possessions & de l'éducation de sa famille, deux objets plus que suffisans pour absorber son tems & ses forces. Il quitta donc *Hanau* vers la fin de Mai 1742, regrettant un Etat & un Prince dont il n'étoit pas moins regretté, & retourna sur ses terres à *Lodersleben*, fermement résolu de n'en jamais sortir. Il n'y fût pas oisif un seul moment pendant six années, qui s'écoulerent par conséquent pour lui avec une extreme rapidi-



rapidité, & qui sont celles où le Sage ne se montre par moins admirable dans la vie privée que le Ministre l'a paru dans l'exercice de ses grands Emplois. De ces six années il n'y eut que sept mois en 1745 & 1746, pendant lesquels la guerre qu'essuyoit alors la Saxe l'obligea de demeurer à *Erford*.

La Providence avoit cependant encore des vues sur lui, & il falloit qu'elles s'accomplissent. Si FRÉDÉRIC GUILLAUME avoit connu l'importance des services que Mr. de *Danckelmann* étoit capable de rendre, auroit-elle échappé au plus pénétrant des Monarques, (en désignant ainsi le nôtre, je doute que quelqu'un puisse le méconnoître.) Des amis de Mr. de *Danckelmann* lui écrivirent de Berlin qu'on songeoit à l'appeller au Ministère. Il fit sincèrement tout ce qui dépendoit de lui pour éviter une place qui est si enviée; mais il se vit à la fin obligé de déférer aux volontés aussi gracieuses que pressantes du Roi. Le plus grand avantage personnel qu'il trouvoit dans ce changement d'état, c'étoit d'achever l'éducation & de procurer dans la suite l'établissement d'une nombreuse famille. Le meilleur de tous les pères ne pouvoit être insensible à ce motif.

Il vint donc à *Berlin* comme Ministre d'Etat au commencement de 1739, & succéda d'abord à feu Mr. d'*Arnim*, dans la Présidence du Conseil privé de Justice & du Département des Fiefs & des Colonies Palatines. Mr. de *Brand* étant venu à décéder peu après, le Roi confia à Mr. de *Danckelmann* toutes les affaires dont ce Ministre avoit été chargé. Et feu Mr. de *Cocceji* lui remit aussi dans la suite la fonction de Curateur supreme des Universités.

Ceux en présence de qui j'ai l'honneur de parler, sont présentement instruits du reste de la carrière de Mr. de *Danckelmann*, sans que j'aie besoin d'entrer à cet égard dans aucun détail. Ils ont vu en lui, pendant quinze ans environ, le caractère le plus soutenu, le modele le plus accompli d'un digne Ministre. Les lumières & les vertus, une application infatigable, une droiture exemplaire, cette sagesse assaisonnée de douceur qui constitue la décence, & d'où naît la vraie dignité, toute opposée à celle qu'on place si souvent & si mal à propos





pos dans une vaine représentation, & qu'on ne fait sentir que par la hauteur & par la dureté ; voilà ce qu'on trouvoit tous les jours, à toutes les heures, dans *Mr. de Danckelmann*, parce que ces qualités faisoient, pour ainsi dire, le fond & l'essence de sa grande ame ; disons mieux, parce qu'il les puisoit dans une source d'où il ne peut rien sortir que de pur & de précieux, dans la Religion qu'il connoissoit, qu'il aimoit, qu'il pratiquoit, dans la Religion qui a fait le bonheur de sa vie & de sa mort, qui a rendu également salutaires pour lui toutes les prospérités & toutes les adversités que la Providence lui a dispensées. Tout le monde a pu voir le Ministre, & jusqu'à un certain point le Chrétien ; mais que de bonnes oeuvres faites dans le silence & ensevelies dans l'oubli par cette charité qui ne permet pas à la main gauche de savoir ce que fait la droite ! Quand je ne ferois que rapporter celles qui, malgré toutes les précautions, ont transpiré, je vous pénétrerois de la plus tendre vénération pour le bienheureux défunt ! Mais il me semble que ce seroit offenser son humilité dans le Monument même où il est si vrai de dire qu'il se repose de ses travaux, & que ses oeuvres le suivent. Laissons lui en recueillir le seul fruit auquel il ait aspiré ; & que le voile dont nous n'avons fait que lever un coin, retombe jusqu'au grand jour où il sera pleinement levé.

*Mr. de Danckelmann*, quoique d'une constitution délicate, avoit joui d'une santé assez égale, à la grande maladie près dont nous avons fait mention. Il ne ressentoit gueres que quelques attaques de rhumatisme, lorsqu'il s'étoit exposé au froid. Ce ne fût que vers l'année 1759, c'est à dire, à l'âge de 60 ans, qu'on vit décliner ses forces à peu près épuisées par le nombre & par le genre de ses occupations qui l'assujétissoient à une vie retirée & sédentaire. Une attaque d'apoplexie le mit hors de combat en janvier 1763, & il ne balança pas à résigner une partie de ses charges, essayant de profiter de quelques lueurs de rétablissement pour vaquer à celles qu'il s'étoit réservées. Mais trop consciencieux pour ne remplir qu'imparfaitement quelque devoir que ce fût, il deman-



da son entière démission, & l'obtint en Novembre 1763. On peut bien mettre au nombre des causes qui affoiblirent son tempérament, sa sensibilité aux calamités publiques qui, en prenant sa source dans la bonté de son coeur, ne préjudicoit d'ailleurs en rien à la fermeté de son ame & à sa parfaite résignation. Il eut le sort ordinaire des Justes; il fut visité & affligé par des épreuves accumulées; & dans le tems même qu'il luttoit contre des infirmités qui creusôient le tombeau sous ses pas, il eut des afflictions domestiques qui acheverent de le convaincre qu'il avoit choisi la bonne part, en s'attachant constamment à l'Etre immuable, à la source des biens seuls à l'abri de toutes les atteintes. Pensant, ainsi il sentit moins l'amertume de la séparation qui le priva de sa digne Epouse, qu'il n'anticipa les douceurs d'une prochaine réunion. Cette Dame décéda dans le cours de l'Été dernier, & fut inhumée le jour même où auroit été célébré le 34 anniversaire de son mariage. Mr. de *Danckelmann* ne fit que languir depuis cette perte; il eut de vives souffrances vers la fin; mais le 15 jour de Décembre, en lui ouvrant les portes de l'éternité, ne priva la terre d'un si bel ornement que pour le faire briller de tout son éclat au plus haut de l'Empirée.

